

UC-NRLF



B 3 103 978

1413

Sample. Wm




Carl Schliepke.
1846.



THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID


G r u n d r i ß

der

Nat u r g e s c h i c h t e.

Für Gymnasien und höhere Bürgerschulen

entworfen

von

Dr. Hermann Burmeister,

Professor der Zoologie zu Halle,
vormals Lehrer der Naturgeschichte am Köllnischen Real-Gymnasium
zu Berlin.

Vierte sehr verbesserte Auflage.

Berlin,

bei **G. Reimer.**

1840.

THE SOUTHERN



K-QH 46

B 83

1840

Bibl.

L 15

V o r r e d e

zur vierten Auflage.

In der Voraussetzung, daß die gewählte Form dieses kleinen Lehrbuches den Anforderungen einer zweckdienlichen Methode noch ferner Genüge leisten werde, habe ich bei dieser neuen Auflage nur solche Veränderungen gemacht, welche durch die rastlosen Fortschritte der Wissenschaft bedingt wurden. So viel in meinen Kräften steht, bin ich bemüht gewesen, von diesen Fortschritten, auch wenn sie den engeren Kreis meiner wissenschaftlichen Thätigkeit nicht berühren, Kunde zu nehmen, und die Hauptresultate, so weit sie in ein Lehrbuch, wie das vorliegende gehören, ihm einzu-

verleihen. Dieß gilt zumal von der umfassenden Ausführung, welche die Fructifikationslehre der Pflanzen in diesen Tagen erfahren hat. In der Zoologie wurden die Klassen der Säugethiere und Vögel ganz neu durchgearbeitet und die in den Familien aufgeführten Gattungen schematisch geordnet, wie ich hoffe zum Vortheil des Buches, und im Einklange mit der anerkannten Wahrheit: *qui bene distinguit, bene docet*. Leider ergab sich daraus in den meisten Fällen die Nothwendigkeit, von der früheren Reihenfolge der Gattungen abzuweichen, ein Umstand, der doch eigentlich Nebensache ist. Erheblicher dürfte es sein, daß ich die Angaben der Zähnezahlen bei den Säugethiern theils wieder weggelassen habe weil sie mir bei der sonstigen Haltung dieses Grundrisses zu sehr ins Detail zu führen schienen; theils durch allgemeinere Bezeichnung dem Fassungsvermögen der Schüler zugänglicher zu machen suchte, was gewiß nur lobenswerth ist, wenn es gleich

manche Veränderungen mit sich brachte, welche, als solche, für die neuen Auflagen von Lehrbüchern keinesweges zweckmäßig und wünschenswerth sind. In der Abtheilung der Gliederthiere mußte ich mich bemühen, diesen Grundriß mit meinem Handbuch der Naturgeschichte (Berlin 1836. 8.) und meinem Handbuch der Entomologie (Berlin 1835 — 40. 8.), deren Differenzen aus scharfer Prüfung der bisherigen Systematik hervorgegangen sind, in Einklang zu bringen, was, wenn es gleich diese Auflage von den früheren wesentlich unterscheidet, doch ihr nur zum Vortheil gereichen kann. Auf beide Werke muß ich den Lehrer zur genaueren Kenntnißnahme verweisen, für seine Schüler aber empfehle ich ihm besonders meinen Zoologischen Hand-Atlas, dessen letztes siebentes Heft bald erscheinen wird. Im Verlage derselben Handlung, die den Atlas und diesen Grundriß liefert, sind auch recht brauchbare Umrisse zur Erläuterung des natürlichen Systems

der Pflanzen erschienen, bei deren Anfertigung besonders Nees v. Esenbeck treffliche genera plantarum florum Germanicae benutzt wurden.

Dies ist es, worauf ich die Interessenten bei der neuen Auflage meines Grundrisses hinzuweisen mich veranlaßt finde; möge dieselbe den Zwecken noch ferner entsprechen, denen die drei früheren gedient haben, und das Werk den Nutzen stiften, welchen ich durch treue Benutzung und zweckmäßige Auswahl der zahlreichen Materialien ihm zu geben bemüht war.

Halle, den 20. August 1840.

H. Burmeister.

E i n l e i t u n g.

§. 1. Naturgeschichte nennt man denjenigen Zweig der Naturwissenschaft, welcher die verschiedenen Formen der Naturkörper kennen lehrt, und ihre aus der Form zunächst folgenden Aehnlichkeiten und Unterschiede erörtert. Sie beschreibt daher die Naturkörper und stellt sie nach jenen Beziehungen in größere und kleinere Gruppen (Klassen, Ordnungen, Familien, Gattungen und Arten) zusammen.

§. 2. Ihrer Gestalt und gesammten Einrichtung nach bilden die Naturkörper zuvörderst zwei große Hauptabtheilungen.

Die Einen bestehen äußerlich wie innerlich aus verschiedenen Theilen, von denen jeder eine gewisse, ganz bestimmte Verrichtung hat, vermittelt welcher die Naturkörper sich erhalten. Man nennt diese Theile ihre Werkzeuge oder Organe, und die Naturkörper darnach organische.

Die Andern bestehen entweder gar nicht aus verschiedenen Theilen, oder aber wenn sie aus verschiedenen Bestandtheilen bestehen, so hat doch keiner derselben eine Verrichtung zur Erhaltung des Ganzen; es fehlen ihnen also die Werkzeuge oder Organe, weshalb man sie anorganische Naturkörper genannt hat. Solcher Art sind alle Mineralien, Metalle u. dgl. m.

§. 3. Die organischen Naturkörper theilen sich wieder in zwei Gruppen, nemlich:

a) in solche, unter deren Werkzeugen sich einige finden, welche den Naturkörper ganz oder zum Theil in Bewegung setzen. Naturkörper dieser Art sind die Thiere.

b) in solche, denen die Werkzeuge zur Bewegung, mithin auch die Fähigkeit, sich bewegen zu können, mangeln; diese nennt man Pflanzen.

§. 4. Die Thiere und Pflanzen als organische Naturkörper nennt man auch lebendig, und schreibt also beiden Leben zu.

Was ist aber das Leben?

Das Leben ist Thätigkeit aus eigener Kraft, eine Thätigkeit also, die keinen Grund von außen erhält, sondern die sich selbst antreibt, die lediglich ihrer selbst wegen thätig ist.

Es ist allgemein bekannt, daß man auch für die verschiedenen Veränderungen der leblosen Materie gewisse Kräfte als Ursachen betrachtet, und daß wir die Kräfte, welche die Veränderung oder die Thätigkeit derselben überhaupt veranlassen, nachweisen können als ausgegangen von anderen Materien oder hervorgerufen durch deren Kräfte. Kein lebloser Körper theilt sich von selbst, sondern erst in Folge einer von außen einwirkenden Kraft, kein lebloser Körper bewegt sich wieder, wenn er in Ruhe versetzt worden, aus eigenem Antriebe; keiner ruhet, so lange er noch eine bewegende Kraft hat, wenn ihn nicht eine andere Kraft festhält. — Aber die Lebendigen Körper thun dies alles aus freiem Antriebe; die Pflanze saugt Nahrung ein, eben so das Thier, ohne daß äußere Kräfte dazu auffordern; jene treibt Schößlinge, Zweige aus freiem Antriebe, diese bewegen sich hin und her, ohne von fremden Kräften aus ihrer Ruhe gestört worden zu sein u. s. w. Dieses freie Handeln also ist der wesentliche Unterschied der Lebendigen und Leblosen Körper.

§. 5. Nach der angegebenen Verschiedenheit der Naturkörper zerfallen dieselben in drei große Gruppen, die man Naturreiche nennt, und eben so theilt sich die Naturgeschichte in drei große Abtheilungen, welche sind:

a) Die Naturgeschichte der Thiere, oder die Zoologie, welche vom Thierreich handelt.

b) Die Naturgeschichte der Pflanzen, oder die Botanik, handelt vom Pflanzenreich.

c) Die Naturgeschichte der anorganischen Naturkörper, oder die Mineralogie, handelt vom Mineralreich.

Erster Abschnitt.

Z o o l o g i e.

§. 6. Thiere (animalia) sind organische Naturkörper mit willkürlicher Bewegung.

Willkürlich nennen wir eine Bewegung, die von dem freien Entschluß (Willen) des sich bewegenden Körpers allein abhängt, und keiner anderen Anregung von außen bedarf. Das Vermögen, den Ort, wo sich der Naturkörper befindet, verlassen zu können, oder die Locomotivität, worin man gewöhnlich die willkürliche Bewegung überhaupt ausgedrückt glaubt, kommt nicht allen Thieren zu, es fehlt den festgewachsenen Polypen, Muscheln und manchen Parasiten.

§. 7. Die Thiere bestehen als organische Naturkörper aus mehreren Organen oder Werkzeugen, welche zusammen ihren Leib ausmachen. Dieser Leib hat eine bestimmte, jedem besonderen Thiere eigenthümliche Form, welche Formen aber auf gewisse Einheiten sich zurückführen lassen; sie sind nemlich:

1) Symmetrisch; d. h. durch einen, einzigen Schnitt in zwei gleiche Hälften theilbar. Solche Thiere enthalten alle Organe, die nicht in der Theilungsfläche selbst liegen, paarig; wie z. B. auch der Körper des Menschen.

2) Regulär, d. h. durch mehrere Schnitte in zwei gleiche Hälften theilbar. Diese Thiere enthalten alle Organe, das im Centrum befindliche ausgenommen, so vielmal, als wie viele Theilungsrichtungen es bei ihnen giebt, wie z. B. die Seeigel, Medusen.

3) Irregulär, d. h. gar nicht in zwei gleiche Hälften theilbar, und im Leben beständig veränderlich, wie die wahren Infusioenthiere.

§. 8. Der Leib zerfällt gewöhnlich bei symmetrischen Thieren in drei große Abschnitte, nemlich in den Kopf (ca-

put) den Rumpf (truncus) und die Glieder oder Gliedmaßen (artus).

§. 9. Der Kopf kommt nicht einmal allen symmetrischen Thieren zu, sondern fehlt unter ihnen auch den Muscheln, die Cuvier deshalb Kopflose (Acephala) nannte. Auch den regulären und irregulären Thieren fehlt er ganz.

§. 10. Der Rumpf ist allen Thieren eigen. Einige, wie die regulären und irregulären, haben nichts weiter als den Rumpf, und können zugleich mit den symmetrischen, welchen Kopf und Gliedmaßen fehlen, Bauchthiere (animalia gastrodea oder Gastrozoa) genannt werden, weil der Bauch der Haupttheil des Rumpfes ist.

§. 11. Die Glieder fehlen ebenfalls vielen Thieren, nemlich allen Bauchthieren, aber auch vielen Würmern, z. B. dem Spulwurm, und selbst noch den Schlangen.

§. 12. Jeder dieser drei Abschnitte des Thierleibes enthält gewisse Organe, welche nur an oder in ihm vorkommen. Zugleich enthält aber auch jeder Haupttheil des Leibes andere Organe, die sich in allen dreien wiederfinden, diese sind:

a) Die Nerven (neuri), weiße Fäden, die sich wie die Zweige eines Baumes von einem Hauptstamm aus verbreiten und mit ihren äußersten Enden zu allen andern Organen sich hinbegeben. Ihre Verrichtung ist die Empfindung, welche daher auch überall möglich ist. Sie entspringen endlich alle aus dem Gehirn (cerebrum), das im Kopf liegt, und als die Wurzel der Nerven angesehen werden kann.

b) Die Gefäße (vasa), Röhren, welche sich grade wie die Nerven zweigförmig verbreiten und zu allen andern Organen begeben. Ihre Verrichtung besteht darin, den Nahrungsstoff des Körpers, oder das Blut, aus dem Herzen in alle Organe zu führen, damit diese aus ihm ihre Nahrung schöpfen, und den übrig gebliebenen Rest wieder zum Herzen zurückzuleiten. Die fortleitenden Gefäße heißen Arterien oder Pulsadern, die zurückführenden Venen oder Blutadern; erstere verrathen sich leicht durch ihre Bewegung oder Pulsschlag, daher sie auch Schlagadern genannt werden.

c) Die Muskeln (*musculi*), dicke, runde oder flache, breite, gestreifte Organe, die aus lauter feinen Fasern bestehen, welche alle parallel neben einander, oder auch wohl in mehreren sich kreuzenden Schichten über einander liegen. Ihre Berrichtung besteht darin, die Organe, an welchen sie sich befinden, in Bewegung zu setzen, daher sie als die eigentlichen Bewegungsorgane der Thiere zu betrachten sind.

Zwischen den Muskeln liegt eine aus vielen Faserbündeln und Maschen bestehende Schicht, die man wegen ihrer Bildung Zellgewebe nennt, und in welcher sich das Fett ansammelt. Seine Berrichtung ist, die Muskeln, Gefäße und Nerven einzuhüllen, damit sie von außen geschützt sind. Beide, Muskeln und Zellgewebe mit dem Fett, bilden das Fleisch der Thiere.

d) Endlich bekleidet die Oberfläche aller Thiere die Haut (*cutis*), welche als eine schützende Hülle zu betrachten ist, unter der die Organe, wie unter einem eng anschließenden Schleier, versteckt liegen.

§. 13. Die Organe, welche sich nur in den einzelnen Hauptabschnitten des Leibes befinden, lassen sich am besten nach diesen Hauptabtheilungen betrachten.

§. 14. Der Kopf enthält die Sinneswerkzeuge, oder diejenigen Organe, welche für die Wahrnehmung äußerer Eindrücke ganz bestimmter Art berechnet sind. Es giebt deren vier.

a) Das Auge (*oculus*), oder das Organ, vermittelt welches wir sehen. Es liegt immer an der vorderen Seite des Kopfes, und ist in den meisten Fällen doppelt, sehr selten einfach, nicht selten mehrfach; häufig fehlt es ganz.

b) Das Ohr (*auris*), oder das Organ, vermittelt welches wir den Schall und die Töne, welche andere Körper von sich geben, wahrnehmen, liegt immer an den Seiten des Kopfes, und ist stets, wo es sich auch finden mag, doppelt; sehr vielen Thieren fehlt das Organ des Gehörs vollkommen, andere hören, obwohl das Ohr noch nicht mit Bestimmtheit bei ihnen entdeckt worden ist.

c) Die Nase (*nasus*) als Geruchsorgan nimmt die Eindrücke wahr, welche gewisse flüchtige oder verdampfende Materien erregen; sie findet sich immer am Bordertheile des Kopfes unter den Augen, und besteht in der Regel aus einer doppelten Höhle, in welcher sich eine zarte mit Nerven versehene Haut verbreitet. Sehr vielen Thieren fehlt auch die Nase ganz.

d) Die Zunge (*lingua*) als Geschmacksorgan findet sich im Munde, und besteht aus einem fleischigen, auch wohl von Knochen unterstützten Körper, der von einer weichen mit Nerven versehenen Haut überzogen ist. Das Thier erhält vermittelst des Geschmacks die Eindrücke, welche die auflösblichen Körper auf die Nerven der Zunge machen, daher nicht alle Dinge schmeckbar sind. Die Zunge ist allgemeiner verbreitet als die Nase, aber nicht bei allen Thieren, die eine Zunge haben, dient sie zum Schmecken.

§. 15. Im Rumpfe finden sich die Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane der Thiere.

I. Die Ernährungsorgane haben den Zweck, diejenigen Stoffe, welcher das Thier zu seiner Erhaltung bedarf, ihm zuzuführen und zuzubereiten. Diesen Zweck erreichen sie durch Aufnahme von Nahrungsmitteln und Veränderung derselben in die ernährende Substanz oder das Blut.

Aufgenommen werden die Nahrungsmittel durch den Mund (*os*), der allen Thieren eigen ist, in den Magen (*ventriculus*), woselbst sie in einen Brei verwandelt werden und nun in den Darm übergehen. Aus dem Darm saugen die Gefäße den Nahrungsstoff auf, und führen ihn zum Herzen (*cor*), einem muskulösen Sack, welcher durch Scheidewände in Kammern und Vorhöfe getheilt wird, die mit einander in Verbindung stehen. Von hier aus kommt er in die Lunge (*pulmo*), damit er durch diese, vermittelst der eingeathmeten Luft, eine Veränderung (Reinigung) erleide, die ihn zur Ernährung der Organe geschikt macht. Nun ist der Nahrungsstoff wahres Blut (*sanguis*), das dann entweder zum Herzen zurückkehrt und aus ihm in alle Theile des Körpers vermittelst der Arterien oder Pulsadern geleitet wird, oder sogleich aus dem Athmungsorgan in diese Gefäße übergeht.

Der Theil des Blutes, welchen die Organe übrig gelassen haben, kehrt mit dem neu aus dem Darm aufgesogenen Saft durch die Venen ins Herz zurück. So läuft also das Blut auf einer Kreisbahn im Körper umher, welche Bewegung deshalb Kreislauf genannt wird. —

§. 16. Die Organe, welche wir eben kennen gelernt haben, liegen so im Rumpf, daß die Lunge den obersten Theil desselben ausfüllt. Ihre Verrichtung heißt Athmung oder Respiration. Zwischen der Lunge, die aus 2 Hälften besteht, liegt das Herz. Der Raum, den beide einnehmen, heißt Brustkasten (thorax); bei den Säugethieren ist er durch eine muskulöse Wand, das Zwerchfell, von dem übrigen Theil des Rumpfes getrennt. Gleich unter dem Zwerchfell liegt in der Mitte und links der Magen, rechts neben ihm die Leber (hepar), von welcher die Galle (bilis) abgesondert wird, eine grünlichgelbe bittere Flüssigkeit, die in den Darm fließt, und die Verarbeitung der Nahrungsmittel, welche wir Verdauung (digestio) nennen, mit bewirken hilft. Der ganze Raum unter dem Zwerchfell heißt Bauchhöhle (abdomen oder venter), und enthält nur noch den Darm, der wieder aus dem Dünndarm (ilium) und Dickdarm (colon) besteht, welcher letztere sich in den After mündet. Auch finden sich in dieser Höhle noch die Nieren (renes), zwei Körper, die gegen den Rücken zu liegen, und unbrauchbare Stoffe aus dem Blute absondern, damit dieselben als Harn oder Urin wieder abfließen können.

§. 17. II. Die Fortpflanzungsorgane sind Kanäle oder Säcke, in welchen eigenthümliche flüssige Stoffe, als Grundlage oder Keime für die Brut, abgesondert werden. Beim Weibchen bilden sich in ihnen die Eier (ova), aus denen die jungen Thiere entstehen. Bei den Fischen z. B. heißen die Säcke des Weibchens Rogen, des Männchens Milch. Die allermeisten Thiere entstehen aus Eiern, welche die Weibchen legen; einige, wie die Säugethiere, gebären lebendige Jungen, die von der Mutter ernährt, gesäugt, werden. —

§. 18. Die Gliedmaßen, der dritte Haupttheil des Thierleibes, dienen den Thieren als Bewegungsorgane, daher sie vorzugsweise aus Muskeln bestehen; ihre Anzahl ist immer eine grade, auch sitzen wahre Gliedmaßen stets einander gegenüber, symmetrisch an beiden Seiten des Leibes, und haben paarweis gleiche Gestalt und Größe. Sie kommen daher meistens nur bei symmetrisch gebildeten Thieren vor, fehlen aber selbst diesen zum Theil. Nach ihrer Verrichtung unterscheidet man folgende fünf Arten:

a. Füße (*pedes*), sie dienen bloß zum Gehen oder Kriechen, indem sie nur zum Anstemmen gegen den Boden brauchbar sind.

b. Hände (*manus*), sie dienen zum Ergreifen und Festhalten, sind daher zangenförmig gebildet, und werden besonders zum Klettern benutzt.

c. Flügel (*alae*), dienen zum Rudern in der Luft, und spannen immer große Hautfalten aus.

d. Flossen (*pinnae*), dienen zum Rudern im Wasser und spannen ebenfalls, aber kleinere, Hautfalten.

e. Kiefer (*mandibulae* oder *maxillae*), dienen bloß zum Ergreifen, Festhalten und Zermalmen der Nahrung, und stehen immer in der Nähe des Mundes (§. 15. I.).

In der Regel bestehen die Gliedmaßen aus hinter einander liegenden, für sich beweglichen Abschnitten, Gelenkungen (*articulationes*) oder Glieder genannt.

§. 19. Nach den Verschiedenheiten, welche sich im ganzen thierischen Bau vorfinden, zerfällt das Thierreich in 3 große Gruppen. Diese sind:

1. Bauchthiere, *Gastrozoa*. Irreguläre, reguläre oder symmetrische Thiere deren Leib bloßer Rumpf ist, der freilich oft in mehrern Strahlen ausläuft, aber niemals mit wahren in sich artikulirten Gliedmaßen versehen ist. Den Meisten fehlt der Kopf.

2. Gliederthiere, *Arthrozoa* s. *Articulata*. Symmetrische Thiere, deren Leib aus vielen, hinter einander liegenden, gleichen oder ungleichen Ringen besteht. Die Meisten haben einen Kopf und wahre Gliedmaßen, andern fehlen beide.

3. Rückgratthiere, Osteozoa s. Vertebrata. Symmetrische Thiere, in deren Leibe sich ein Gerüst harter Körper, die man Knochen nennt, findet, an welchem Gerüst oder Skelet alle übrigen Theile befestigt sind. Alle haben einen deutlichen Kopf, und die allermeisten vier mehr oder weniger ausgebildete Gliedmaßen.

Wir wollen mit der Betrachtung der letztern Gruppe, weil sie die bekanntesten und größten Thiere enthält, den Anfang machen.

Erste Hauptgruppe.

R ü c k g r a t t h i e r e .

§. 20. Die wesentlichste Eigenschaft dieser ersten Gruppe des Thierreiches ist die Anwesenheit des Skelets im Innern der hierher gehörigen Thiere, daher wir mit der Betrachtung desselben beginnen.

Das Skelet besteht aus Knochen, die in den Gelenken an einander stoßen, und durch Bänder an einander befestigt sind. Jeder Knochen (os) ist eigentlich ursprünglich ein zelliger, weicher Körper, in dessen Zellen sich phosphorsaure Kalkerde abgesetzt hat. Viele haben im Innern einen hohlen Raum, der mit einer fettigen Materie, dem Mark (medulla), angefüllt ist. An den Enden, da wo die gegen einander beweglichen Knochen sich berühren, sind dieselben mit einer weichen, faserigen, weißen Substanz überzogen, deren Oberfläche sehr glatt ist, und die den Namen Knorpel (cartilago) führt; manche Knochen sind auch durch solche Substanz fest verbunden.

§. 21. Das Skelet zerfällt, wie der ganze Leib, in drei Abschnitte, nemlich in den Kopf, den Rumpf und die Gliedmaßen.

Der Kopf des Skelets ist eine einzige große, von Knochen umgebene Höhle, Schädelhöhle genannt, in welcher das Gehirn liegt, und an welcher die übrigen Knochen befestigt sind. Sie bilden andere Höhlen, die sich am vordern

Theil des Schädels befinden und die Sinnesorgane in sich aufnehmen; es sind: die Augenhöhlen, in welchen die Augen liegen, die Nasenhöhle und die Mundhöhle. Diese letztere umgeben die Kiefer, zwei hufeisensförmige Knochen, deren jeder aus 2 Hälften besteht, die vorn an einander stoßen, und an dem einen Rande häufig mit Zähnen besetzt sind. In der Regel kann nur der Unterkiefer bewegt werden, oft aber auch beide.

§. 22. Der Rumpf des Skelets besteht aus vielen einzelnen Knochen, die sich unter 3 Rubriken bringen lassen, welche sind: Wirbel, Rippen und Becken.

Die Wirbel (vertebrae) sind kleine aus einem fast würfelförmigen Körper und einem von diesem ausgehenden Bogen bestehende Knochen, die durch Knorpelsubstanz so an einander hängen, daß sie einen großen Stamm, die Wirbelsäule oder das Rückgrat, bilden. Die Bogen sind dabei nach außen gegen den Rücken zu gerichtet und bilden einen Kanal, in welchem ein dicker Nerve, der aus dem Gehirn kommt, und Rückenmark genannt wird, hinabläuft. Seitlich entspringen von ihm andere Nerven, die zwischen den Bogen hervorkommen, und am Rumpf, wie zu den Gliedmaßen sich verbreiten. Vom Bogen entspringen noch spitze Knochenfortsätze, einer grade nach außen und oben, der Dornfortsatz, zwei andere nach der Seite hin, einer an jeder Seite, die Querfortsätze. Nach ihrer Lage theilt man die Wirbel in fünf Gruppen. Halswirbel heißen die ersten gleich hinter dem Kopf, die keine Rippen tragen; nach ihnen folgen die mit Rippen versehenen Brustwirbel; dann die ebenfalls rippenlosen, aber unter allen am stärksten gebauten Lendenwirbel; darauf die Beckenwirbel, an welchen das Becken sitzt, und die meistens zu einem Knochen, dem Heiligenbein, verwachsen; endlich die Schwanzwirbel, die kleinsten von allen, welche den Schwanz der geschwänzten Thiere bilden.

Die zweite Hauptform der Knochen des Rumpfes sind die Rippen (costae), dünne, schmale, halbkreisförmige Knochen, welche mit dem einen Ende an je zwei Wirbel stoßen, und hier durch Bänder in einer Gelenkung befestigt sind; das

andere Ende setzt sich vermittelt eines runden Knorpelstücks an einen runden oder flachen, schmalen Knochen, der vorn auf der Brust liegt, und daher Brustbein (sternum) heißt. Dieses mit den Rippen und Rückenwirbeln bildet den Brustkasten, in welchem Lungen und Herz liegen.

Das Becken (pelvis), der dritte Haupttheil der Rumpfknochen, bildet das untere Ende des Rumpfes, und besteht aus mehreren flachen, eine geräumige, aber nur zum Theil geschlossene, Höhle bildenden Knochen. Es hängt mit dem breiten Darmbein jederseits am Heiligenbein, und dient den Knochen der Hintergliedmaßen zum Ansatzpunkt.

Es kommt nicht bei allen Rückgrathieren vor, namentlich fehlt es allen Fischen, den Schlangen, und ist selbst noch bei den Säugethieren mitunter unvollkommen entwickelt. Alle diese Thiere haben dann auch gar keine oder unvollkommene Hintergliedmaßen.

§. 23. Die Knochen der Gliedmaßen bilden mehrere, hinter einander liegende Reihen, und erscheinen als ziemlich enge und feste Röhren, die an beiden Enden keulensförmig verdickt und abgerundet sind. Diese mit Knorpel überzogenen Enden bilden die Gelenke und heißen deshalb Gelenkköpfe. Die Rückgrathiere haben nur vier Gliedmaßen, von welchen das erste Paar am vorderen, das zweite in der Regel am hinteren Ende des Rumpfes befestigt ist. Das vordere Paar, beim Menschen Arm genannt, hängt an einem flachen dreieckigen Knochen, dem Schulterblatt, welcher auf dem Rücken am Anfange des Brustkastens neben dem Rückgrat liegt, und bei denjenigen Thieren, die ihre vordern Gliedmaßen zu angreifenden Geschäften, als Graben, Klettern, Fliegen, Schwimmen gebrauchen, durch einen dünnen S-förmig gekrümmten Knochen, das Schlüsselbein (clavicula), mit dem Brustbein verbunden ist, sonst aber nur durch Muskeln mit dem Brustkasten zusammenhängt. An diesem Schulterblatt hängt der große Oberarmknochen, und an diesem zwei kleinere dünnere, die Speiche und Elle, welche den Unterarm bilden. Wo Oberarm und Unterarm zusammenstoßen, befindet sich die Gelenkung, welche man Ellenbogen nennt. Auf die Knochen des Unterarms folgen mehrere (höch-

stens acht) kleinere Knochen, welche in 2 Reihen liegen, und das Handwurzelgelenk bilden, daher man sie Handwurzelknochen nennt. An diese stoßen so viele Knochen, als die Hand oder der Fuß Zehen hat, also 1, 2, 3, 4 oder 5; alle hängen unter sich durch Muskeln zusammen, und bilden die flache Hand. Nun hat noch jede Zehe oder jeder Finger drei hinter einander liegende Knochen, mit Ausnahme der großen Zehe oder des Daumens, dem ein Glied weniger eigen ist, als den übrigen, so daß also, in der höchsten Zahl, jede Gliedmaße aus acht hinter einander liegenden Knochenreihen zusammengesetzt ist, mithin eigentlich 7 Gelenkungen haben muß.

Bei den Hintergliedmaßen, gewöhnlich Beine oder Hinterbeine genannt, hängt der Knochen der ersten Reihe, der Oberschenkelknochen, im Hüftgelenk am Becken; auf ihn folgen die zwei Knochen der zweiten Reihe, das Schienbein und das Pfeifenbein, welche im Kniegelenk an ihn gränzen. Auf diesem Gelenk liegt noch ein runder Knochen, die Kniescheibe. Fußwurzelknochen, welche die folgenden Reihen bilden, und im Hackengelenk an das Schien- und Pfeifenbein stoßen, giebt es höchstens sieben; dann folgen so viele Knochen, als Zehen am Fuß befindlich sind, welche den Plattfuß bilden und in einer Reihe neben einander liegen; endlich die 3 Reihen der Zehenknochen. —

Von der eben gegebenen Beschreibung der Gliedmaßen weicht ihr Bau bei vielen Rückgratthieren sehr ab. Die Fische haben weder deutliche Zehen, noch deutlich getrennte Knochen mit wahren Gelenken; ihre Zehen sind vielgliedrige, am Ende oft in mehrere Äste zerfallte, und durch Haut zur Flosse verbundene Strahlen. Dies letztere gilt auch von den Wallfischen, denen die Hintergliedmaßen noch dazu beständig fehlen. Die Schlangen haben gar keine Gliedmaßen, und manchen Eidechsen fehlen theils die vorderen, theils die hinteren. Bei den Vögeln bilden die vorderen die Flügel, die hinteren die Beine. An diesen finden sich niemals Fußwurzelknochen, die Plattfußknochen sind in einen, den Lauf (tarsus), verwachsen, und dieser sitzt am Schienbein unmittelbar.

§. 24. Nächst dem Skelet ist es besonders die allgemeine Form, welche die Rückgratthiere von den übrigen unterscheidet. Ihr Kopf ist immer deutlich sichtbar; an ihm nehmen wir in

den allermeisten Fällen die angegebenen 4 Sinnesorgane wahr. Blinde Rückgrathiere finden sich unter den Fischen (der Schleimaal, *Myxine*), den Amphibien (*Caecilia*; der Olm, *Proteus*), nicht unter den Vögeln, aber viele schwach sehende unter den Säugethieren (der Maulwurf, *Talpa*; die Blindmaus, *Spalax* u. a. m.). Das Ohr ist noch sehr versteckt bei den Fischen; den Amphibien fehlt der Gehörgang, daher das Trommelfell frei da liegt; den Vögeln fehlt die äußere Ohrmuschel, welche also nur bei den meisten Säugethieren vorkommt. Die Nase ist bei den Fischen eine bloße Grube jederseits am Oberkiefer, bei den übrigen eine in den Mund führende Höhle. Auch die Zunge dient wohl nur bei den Säugethieren zum Schmecken, bei den andern mehr zum Verschlucken. Die Kiefer haben bei Vögeln niemals Zähne, häufig bei den Fischen (nicht bei den Karpfen) und Amphibien (nicht bei den Schildkröten), in der Regel bei den Säugethieren (nicht bei den ächten Wallfischen und Ameisenfressern). —

Die Form des Rumpfes ist sehr verschieden, bald flacher oder schmaler und höher, wie bei den Fischen; bald länglicher runder, wie bei den Amphibien; bald kleiner und kahnförmig, wie bei den Vögeln; endlich am größten, stärksten und nach allen Richtungen ziemlich gleichmäßig entwickelt, bei den Säugethieren. Unter seinen inneren Organen sind besonders die zur Athmung dienenden am verschiedenartigsten. Die Fische haben Kiemen, d. h. büschel- oder kammsförmige Fortsätze, in welche die Blutgefäße bringen, und nun frei vom Wasser umspült werden; ebenso einige Amphibien (die jungen Frösche). Bei den übrigen ist das Athmungsorgan eine Lunge, d. h. ein häutiger Sack, der inwendig mehrere in Verbindung stehende Zellen hat, an welchen sich die Blutgefäße verbreiten. In diesen Sack gelangt von außen durch die Luftröhre die Luft und umgiebt die Gefäße. So ist das Athmungsorgan bei den meisten Amphibien, allen Vögeln und Säugethieren beschaffen. Das Blut der Rückgrathiere hat immer eine rothe Farbe; bei den Fischen und Amphibien ist es kalt, bei den Vögeln und Säugethieren warm, und hat hier eine Hitze von 28 – 32°. Der Darmkanal zeigt bei den verschiedenen Rück-

gratthieren besonders in der Länge große Verschiedenheit, den kürzesten haben die Fische, einen längern die Amphibien, einen noch längeren die Vögel, den längsten die Säugethiere. Auch nach der Art der Nahrungsmittel richtet sich seine Beschaffenheit. Enger, aber fester, ist er bei den Fleischfressern; länger, weiter, aber dünner in seinen Häuten erscheint er bei den Pflanzensressern. Seine Länge ist oft sehr bedeutend, häufig das Dreifache der Körperlänge, beim Menschen gewöhnlich 60 — 70 Fuß.

§. 25. Was die äußere Oberfläche des Körpers betrifft, so ist diese selten ganz nackt, sondern in der Regel mit haarigen oder knöchernen Gebilden bekleidet. Bei den Fischen und Amphibien sind es Schuppen oder Schilder, bei den Vögeln immer Federn, bei den Säugethiern meistens Haare, seltener Schuppen oder Schilder, aber nie Federn.

§. 26. Man theilt die Rückgratthiere in 4 Gruppen, welche Klassen genannt werden; sie sind allgemein bekannt und unterscheiden sich am leichtesten in folgenden Merkmalen:

1. Rückgratthiere mit warmem Blut.

a) Säugethiere. Sie haben Zehen, welche Milch absondern zur Ernährung der lebendig gebornen Jungen.

b) Vögel. Sie haben Federn, aber keine Zähne und legen Eier.

2. Rückgratthiere mit kaltem Blut.

c) Amphibien. Athmen meistens durch Lungen und haben keine, oder 3 — 5-zehige, meistens fußartige Gliedmaßen.

d) Fische. Athmen immer durch Kiemen und haben allermeist Flossen, welche von zahlreichen Knochenstrahlen ausgespannt werden.

Erste Klasse.

Säugethiere, Mammalia.

§. 27. Außer der bemerkten Eigenthümlichkeit unterscheiden sich die Säugethiere noch in anderen Eigenschaften von den übrigen Ordnungen.

So hat ihr Kopf nur einen beweglichen Unterkiefer, der obere hängt fest mit dem Schädel zusammen. Die Zähne

sind in den Kiefer eingebohrt, eingekleilt wie man's nennt, d. h. sie stecken mit kegelförmigen Wurzeln in darnach geformten Gruben. Auch unterscheidet man nach der Form der Zähne 3 Arten: Schneidezähne, welche vorn im Kiefer sitzen, und eine breite, meißelförmige Gestalt haben; Backzähne oder Mahlzähne, die ganz hinten im Kiefer stecken, mehr viereckig gebauet sind, und oben eine breite oder in Backen auslaufende Fläche darbieten; und Eck- oder Augenzähne, auch Reißzähne genannt, welche zwischen den Schneide- und Backzähnen sitzen, und durch ihre spitze, kegelförmige Gestalt sich auszeichnen. Jeder Zahn zeigt 2 Haupttheile, die Krone, welche aus dem Kiefer hervorragt und von dem weißen, emailartigen Schmelz bekleidet wird, und die Wurzel, welche in der Höhle des Kiefers steckt und keinen Schmelz hat. Bei manchen Zähnen dringt auch der Schmelz ins Innere des Zahnes ein und bildet hier Leisten; solche Zähne werden schmelzfaltige, die übrigen mit Schmelz überzogene Zähne genannt. Viele Säugethiere wechseln die Zähne (schichten) nach einiger Zeit; doch trifft dieser Wechsel nur die vorderen. Der Hals der Säugethiere besteht aus 7 Wirbeln, auch das Aifaulthier hat deren nicht 9, wie früher behauptet wurde, noch die Wallfische weniger. Die Anzahl der übrigen Wirbel ist sehr verschieden. Demnächst bietet besonders die Zahl der Behen und ihrer Knochen Verschiedenheiten dar; einzeigig ist das Pferd, zweizeigig das Rindvieh, dreizeigig das Nashorn, vierzeigig das Schwein, fünfzeigig sind die meisten, z. B. die Fledermäuse, meisten Affen und der Mensch, den wir, wegen der Uebereinstimmung seines Leibes, auch mit zu den Säugethiern rechnen. Steht von den 5 Behen einer den übrigen so gegenüber, daß sich daraus eine Art Zange zum Ergreifen und Festhalten bildet, so nennt man diese Bildung Hand; wo nicht schlechtweg Fuß.

Die Haut der Säugethiere ist selten nackt, wie bei den Wallfischen, meistens mit Haaren bedeckt, nicht selten aber auch mit Schildern, wie beim Armadill, oder Schuppen, wie beim Schuppenthier. Jedes Haar ist ein horniger Faden, der mit einer weichen folsigen Wurzel in der Haut steckt,

und daselbst gleichmäßig fortgebildet wird, so lange es wächst. Bei einigen Säugethieren wachsen die Haare beständig, bei andern fallen sie im Frühjahr und Herbst aus und werden von neuen ersetzt; dies nennt man rauhen. Die Lippen, Nase und Fußsohlen sind häufig von diesem Haarkleide frei. Die Augen haben zwei sie bedeckende Hautfalten, Augenlider genannt, von welchen das obere das größere ist. An den Lippen zeigt sich meistens ein Bart stärkerer Haare, Bartborsten oder Schnurrhaare genannt. Am Ohre ist die Ohrmuschel, welche jedoch den Wallfischen und einigen Seehunden fehlt. —

Die Spitze der Behen ist bei allen Säugethieren mit einer hornigen Platte oder Haken bedeckt, welchen man Nagel (unguis) nennt. Biegt derselbe flach auf der obern Seite der Behe, so heißt er Plattnagel (lamna), biegt er sich über das Ende fort, so nennt man ihn Krallen (falcula), bekleidet er das Ende wie ein Schuh, so heißt er Huf oder Klaue (ungula).

Vom inneren Bau der Säugethiere muß als Eigenthümlichkeit angeführt werden, daß nur bei ihnen Brust und Bauchhöhle durch einen flachen Muskel (das Zwerchfell) vollkommen getrennt sind, bei den übrigen Rückgraththieren aber mehr oder weniger zusammenhängen. Am obern Ende der Luftröhre findet sich ein eigenes Organ, der Kehlkopf, das zur Hervorbringung der Stimme behülflich ist. Sonst finden sich wenige Eigenthümlichkeiten. Daß die Säugethiere durch Lungen athmen, daß das rothe etwa 30° warme Blut aus der Lunge erst wieder ins Herz, welches aus 2 Kammern und 2 Vorhöfen besteht, zurückkehrt, ehe es in den Körper sich verbreitet, und daß sie lebendige Jungen gebären, welche die Weibchen mit Milch ernähren (säugen), muß noch bemerkt werden. Die Organe, welche diese Milch bereiten, und Zitzen oder Euter heißen, liegen bald mehr an der Brust (Affen), bald am untern Ende des Bauches (Rinder).

Man kennt gegenwärtig etwa 1000 verschiedene Arten von Säugethieren, die wieder in mehrere Hauptgruppen sich bringen lassen, zunächst nach der Bildung der Behen in 3, wie folgt:

A. Nagelsäugethiere. Ihre Behen Erste Ordnung.
sind mit Plattnägeln oder Krallen be- Mammalia unguiculata.
waffnet.

a. Mit allen drei Zahnarten

Borderglieder Hände. 1. Fam. Mensch.

Border- und Hinterglieder Hände. 2. — Affen.

Borderfüße und Behen durch eine Flug-
haut verbunden. 3. — Fledermäuse.

Border- und Hinterglieder Füße.

Ohne einen Sack um die Zigen. 4. — Raubthiere.

Mit einem Sack um die Zigen. 5. — Beuteltiere.

b. Die Reiß- oder Augenzähne fehlen. 6. — Nagethiere.

c. Schneide- und Eckzähne oder alle fehlen 7. — Zahnlose S.

B. Hufsäugethiere. Ihre Behen- Zweite Ordnung.
spitzen sind von Hufen bekleidet. Mammalia ungulata.

a. Eine Zehe an jedem Fuß. 8. Fam. Pferde.

b. Zwei Behen an jedem Fuß. 9. — Wiederkäuer.

c. Mehr Behen an jedem Fuß. 10. — Dickhäuter.

C. Flossensäugethiere. Ihre Be- Dritte Ordnung.
hen sind durch eine Schwimmhaut Mammalia pinnata.
verwachsen.

a. Mit 4 flossenförmigen Füßen. 11. Fam. Seehunde.

b. Mit 2 flossenförmigen Füßen. 12. — Walfische.

Erste Familie. Zweihänder, Bimana.

§. 28. Alle Gliedmaßen mit 5 Behen, die vorderen Hände,
die hinteren Füße. Alle Behen mit Plattnägeln. Schnz. 4.
Eckz. $\frac{1}{1}$ - $\frac{1}{1}$. Backz. $\frac{3}{3}$ - $\frac{3}{3}$ *).

Hierher die einzige Gattung des Menschen (Homo), welche
von Linne mit dem Zunamen des Weisen (H. sapiens) sehr chara-
kteristisch bezeichnet wurde, denn die Vernunft ist es, welche den
Menschen von allen Thieren vollständig unterscheidet, während sein
Körper mit dem der Thiere vielfach übereinstimmt. —

Der Mensch wird sehr unbeholfen geboren, erhält am Ende
des ersten Jahres die Zähne, lernt um diese Zeit gehen, vertauscht
im achten Jahre seine Zähne mit neuen (schichtet) und erhält im
achtzehnten bis zwanzigsten Jahre seine letzten 4 Backzähne (Weis-
heitszähne). Im 24sten Jahre ist er erwachsen und hat nun die

*) Durch diese Formel bezeichnet man im Kurzen die Zahl der Zähne jedes Kiefers; sie
lautet umschrieben so: Schneidezähne vier in jedem Kiefer, Eckzähne jeder-
seits einer in jedem Kiefer, Backzähne jederseits fünf in jedem Kiefer.

Höhe von 5' und 3—7"; kleinere und größere Menschen sind ungewöhnlich. Er geht allein von allen Geschöpfen aufrecht, bedient sich allein der Sprache und hat allein eine vernünftige Seele. Er gedeiht in allen Zonen, und zerfällt nach seiner angebohrnen Verschiedenheit in 5 Hauptstämme.

1. Der Kaukasische St. Farbe weiß, Wangen röther; Stirn hoch, sanft gewölbt; Nase ziemlich senkrecht, mäßig, spitzer; Rinn zurückgezogen; Haare weich, gelockt; Bart stark. — Bewohnt Süd- und West-Asien, Nord-Afrika, ganz Europa und alle von dort aus bevölkerten Gegenden der Erde.

2. Der Mongolische St. Farbe gelb; Augen schwarzbraun, klein, schief nach oben gezogen; Wangen hervorragend; Nase klein, stumpf, breit; Haare schwarz, zottig; Bart schwach; Kiefer zurückgezogen; Rinn vorstehend. — Bewohnt Mittel- und Ost-Asien bis gegen Nord-Amerika hin.

3. Der Amerikanische St. Farbe rothbraun; Gesichtszüge stark hervortretend; Stirn niedrig; Haar schwarz, straff; Bart schwach. — Bewohnte früher ganz Amerika, jetzt nur noch die inneren unkultivirten Gegenden.

4. Der Malayische St. Farbe braun, bald heller, bald dunkler; Haar großlockig, schwarz; Nase breit am Grunde; Stirn hervortretend; Lippen aufgeworfen. Bewohnt die Malayischen Inseln und Australien.

5. Der Aethiopische St. Farbe schwarz; Haar schwarz, kraus, wollig; Stirn flach, geneigt; Nase klein, stumpf; Lippen stark aufgeworfen; der Kopf nach dem Scheitel wie zusammengedrückt; Kiefer hervorragend. — Bewohnt Mittel- und Süd-Afrika, Neu-Holland und Neu-Guinea.

Man nimmt an, daß 1000 Millionen Menschen auf der Erde wohnen, und daß alle 33 Jahre eine Generation aussterbe, während etwa $\frac{1}{4}$ mehr geboren werden. Dies giebt für jede Minute 63 Todesfälle und 70 Geburten. Die Nahrung des Menschen ist gemischt theils aus dem Pflanzen-, theils aus dem Thierreich. Küstenbewohner und Nordländer essen mehr Fleisch; die Bewohner der heißen Zone mehr Pflanzenstoffe, besonders Früchte. --

Zweite Familie. Vierhänder, Quadrumana.

§. 29. Die Vorder- und Hintergliedmaßen sind Hände, beide meistens fünfzehig und mit Plattnägeln, bei einigen mit Krallen; Zehen an der Brust. Augen nach vorn gerichtet. Sie leben auf Bäumen, und nähren sich fast alle von Früchten.

Die Affen, welche in diese Familie gehören, sind in ihrem Körperbau dem Menschen am ähnlichsten, doch unter-

scheiden sich die meisten schon durch den langen Schwanz, und alle durch die Behaarung des Körpers. Sie leben nur in der heißen Zone beider Welttheile und zeichnen sich durch ihr kluges und listiges Betragen, ihr nachahmungsfüchtiges Naturell, aber auch durch ihre Tücke und Hinterlist aus. Die größeren Arten haben außerordentliche Stärke, und werden einzelnen Menschen gefährlich; sie vertheidigen sich durch Werfen mit harten Früchten, Schlagen mit Knütteln, und viele auch durch Beißen. Besonders thun dies die durch ein großes Gebiß ausgezeichneten Paviane. Viele Affen der alten Welt haben ein nacktes Gesicht und Taschen an der innern Seite der Wangen (Backentaschen), beides findet sich bei denen der neuen Welt nicht.

A. Bloß mit Plattnägeln.

a. Affen der alten Welt. Backzähne $\frac{2}{2}$ - $\frac{2}{2}$. Nasenscheidewand schmal.

α. Ohne Backentaschen und Schwanz.

Der *Drangutang* (*Simia satyrus*) hat keine Gefäßschwielen; sein Gesicht ist nicht behaart, und die Haare am Vorderarm stehen rückwärts. Er lebt auf Borneo, wird bis 5' hoch und hat eine kastanienbraune Farbe; jung besitzt er ein leichtes, dem des Menschen nicht unähnliches Gebiß, das aber nach der Schichtung sich bedeutend vergrößert und paviansartig wird. Der alte Affe heißt dann *Pong*.

Der *Gibbon* (*Hylobates lar*) hat kleine Gefäßschwielen und sehr lange Vordergliedmaßen. Er ist ganz schwarz, mit weißem Bart rings um das Gesicht und findet sich in Ostindien. Wie der Vorige eine Seltenheit in Sammlungen.

β. Mit Backentaschen.

Der gemeine *Pavian* oder *Mandriil* (*Cynocephalus Mai-mon*) hat einen nur sehr kurzen Schwanz, große breite Gefäßschwielen, und ein stark entwickeltes Gebiß mit großen Eckzähnen. Seine Farbe ist grünbraun, mit weißlichem Kinnbart, seine Wangen sind gefurcht und blau, seine Nase roth. Er wird bis 3½ Fuß hoch, lebt in Guinea und kommt in Sammlungen häufig vor; er ist wild und unhandig.

Der türkische Affe (*Inuus sylvanus*). Ohne Schwanz, mit Backentaschen, Gefäßschwielen und vorstehender Schnauze; Farbe gelbgrau, Bauch weißlich; Größe des Fuchses. Stammt aus Nord-Afrika; wird gemeiniglich von Bärenführern gehalten und zu allerlei Kunststücken abgerichtet.

Die gemeine *Meerkatze* oder der *Mohrenaffe* (*Cercopithecus fuliginosus*) hat Backentaschen, Gefäßschwielen und einen ziem-

lich langen Schwanz, so wie eine rußbranne Farbe, die am Bauch heller ist; über dem Auge auf dem oberen Liede ein hellfleischrother Fleck. Er wird so groß wie eine starke Kage, lebt heerdenweis in Afrika und kommt in den herumziehenden Menagerien am häufigsten vor.

b. Zu den Affen der neuen Welt, die immer geschwänzt sind und $\frac{2}{3}$ Backzähne, wie auch eine breite Nasenscheidewand haben, gehören:

Der Brüllaffe (*Mycetes Beelzebul*). Er hat einen sehr breiten Untertiefer, eine knöcherne Pauke am Zungenbein, und einen kurzbehaarten, am Ende unten nackten Schwanz (Greiffschwanz). Seine Farbe ist schwarz, Pfoten und Schwanzende rothbraun. GröÙe einer Kage, aber schlanker. Brasilien.

Der Kapuzineraffe (*Cebus capucinus*). Mit langem, überall kurzbehaartem Schwanz, der sich um Zweige wickelt, und an welchem sich der Affe aufhängt (Wickelschwanz), rundlichem Kopf und zurückgezogener Nase. Farbe unten gelbgrau, oben braungelb; der Scheitel mit einem dunkelbraunen Dreieck geziert. Guyana, häufig in herumziehenden Menagerien.

B. Mit Krallen an gewissen Fingern, doch nie am Daumen der hinteren Hände.

a. Krallen an allen übrigen Fingern.

Der Seidenaffe oder Jacchus (*Hapale Jacchus*). Hat einen Backzahn weniger als die Affen der neuen Welt, nemlich 5 an jeder Seite. Seine Farbe ist schwarzgrau, an jedem Ohre ein großer weißer Haarbüschel, sein Schwanz weiß geringelt. So groß wie ein Eichkätzchen. Sehr häufig in Brasilien.

b. Krallen bloß am Zeige- oder auch am Mittelfinger der Hinterhände.

Diese Gruppe nennt man Halbaffen (*Prosimiae*) oder *Ma-ti*s. Sie unterscheiden sich durch eine spige hervorstehende Schnauze, verschiedene Zahlen der Schneidezähne und spizackige Backz. von den eigentlichen Affen und bewohnen bloß die alte Welt.

Der Rakenmati (*Lemur catta*), so groß wie eine Kage, röthlichgrau, mit weißem Bauch und weiß und schwarz geringeltem Schwanz. Auf Madagaskar.

Dritte Familie. Flatterer, Chiroptera.

§. 30. Zwischen den Vorder- und Hintergliedmaßen ist eine große Flughaut ausgespannt; Rippen an der Brust; Gebiß dem der Raubthiere ähnlich. Es sind Nachtthiere, die

von Insekten und kleineren Rückgratthieren, auch Früchten, sich nähren.

A. Der fliegende *Maki* (*Galeopithecus rufus*) hat Zehen von gewöhnlicher Länge, die alle mit in der Flughaut sitzen, $\frac{1}{2}$ Schz., die untern gekerbt, und $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ Bäckz. Er hat die Größe eines Kaninchens, eine rothbraune Farbe, und lebt auf den Molucken.

B. Bei den ächten Fledermäusen *) sind die Zehen der Vordergliedmaßen sehr verlängert, und stecken, mit Ausnahme des Daumens, mit in der Flughaut, die sie spannen; Zehen der Hinterglieder frei. Zähne in verschiedenen Zahlenverhältnissen.

a. Ohne Nasenaufsätze.

α. Bäckzähne stumpfzackig. Fressen Früchte.

Der fliegende Hund oder Vampyr (*Pteropus edulis*), ohne Schwanz, mit einem Nagel am Zeigefinger der Vordergliedmaßen, $\frac{1}{2}$ Schz. und $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ Bäckzähnen. Er wird so groß wie ein kleiner Dachshund, hat eine braune Farbe, und lebt auf den ostindischen Inseln. Daß er Schlafenden das Blut aussauge, ist eine Fabel, dies thun die Blattnasen.

β. Bäckzähne (4—6) spitzzackig. Fressen gewöhnlich Insekten.

Die gemeinen Fledermäuse (*Vespertiliones*) haben $\frac{1}{2}$ Schndz., nicht sehr große getrennte Ohren und einen ziemlich langen Schwanz mit in der Flughaut. Man kennt in Deutschland gegen ein Duzend Arten, unter welchen *V. murinus*: mit Ohren von der Länge des Kopfes und 9 Quersalten darin, $\frac{1}{2}$ Bäckz. und oben rauchbrauner, unten weißlicher Körperfarbe, eine der gemeinsten ist; sie hat über 2 Zoll Länge und spannt mit den Flügeln 14 Zoll. Die Fledermäuse verfallen den Winter hindurch in einen Schlaf (*Esthargie*), und verbergen sich dann, wie auch am Tage, in alten Gebäuden, Mauerspalten, hohlen Bäumen etc.

Die langohrigen Fledermäuse (*Plecotus*) haben auch $\frac{1}{2}$ Schndz., aber sehr große am Grunde verwachsene Ohren und einen Schwanz in der Flughaut. Die Europäische Art: *Pl. auritus*, ist graubraun, unten heller, wird über 1½ Zoll lang, spannt 9 Zoll und hat weit über 1 Zoll lange Ohren. —

b. Mit Nasenaufsätzen.

Die Blattnase (*Phyllostoma hastatum*), mit einem kurzen Schwanz in der Flughaut, $\frac{1}{2}$ oder $\frac{1}{2}$ Schndz., stacheliger Zunge und einfachem blattartigen Aufsatz auf der Nase. So groß wie eine kleine Ratte, bräunlich; lebt in Brasilien, saugt Schlafenden Blut ab.

*) Man vergleiche über die einheimischen Arten die genauern Untersuchungen von Blasius und Reysersing in Wiegmann's Archiv der Naturgesch. 1839. Bd. 1. S. 233 u. folg.

Die Hufeisennase (*Rhinolophus ferrum equinum*) hat einen hufeisenförmigen Rand vorn auf der Nasenkante, 2 Aufsätze hinter den Nasenlöchern, und einen Schwanz in der Flughaut. So groß wie eine Maus, grau. In Deutschland.

Vierte Familie. Raubthiere. Ferae.

§. 31. Vorder- und Hinterfüße gleichgebildet, mit gleichen, Krallen tragenden Zehen in verschiedener Zahl. Augenzähne allermeist groß, hakig; Backzähne theils einreihig spitzhöckerig (Eückenzähne), theils mit stumpferen Höckern in 2 parallelen Reihen (Kauzähne); jene die vorderen, diese die hinteren. Zehen am Bauch, frei. Fressen thierische Nahrung, die kleineren Insekten, einige auch Früchte.

A. Die fleischfressenden Raubthiere (*Ferae carnivorae*) haben stets 2 Schneidezähne, starke Eckzähne, keine Schlüsselbeine und einen größeren Körper. Sie bilden 6 Unterfamilien.

a. Zwei derselben haben oben mehr Backzähne als unten, nehmen dort einen kleinen quergestellten Kaninzahn.

1) Die Katzen (*Felis*) haben 2 Backzähne, vorn 5, hinten 4 Zehen mit beweglichen Krallen, eine raue Zunge und meistens eine senkrechte Pupille; nur die großen Arten, wie der Löwe (*F. leo*), Tiger (*F. tigris*), Jaguar (*F. onca*), Kuguar (*F. concolor*) und Leopard (*F. pardus*), haben eine runde. Unsere Hauskatze stammt aus Asien, und ist von der einheimischen wilden Katze (*F. catus ferus*) wohl verschieden. Kurzschwänzige Katzen mit Ohrbüscheln sind die nordischen Luchse (z. B. *F. lynx*).

2) Die Hyänen (*Hyaena*) haben 2 Backzähne, überall 4 Zehen, keine beweglichen Krallen, aber eine raue Zunge. Man kennt 2 Arten, die gestreifte (*H. striata*) in Nord-Afrika und die gefleckte (*H. crocuta*) in Süd-Afrika; beide graugelb mit schwarzbraunen Zeichnungen, Pfoten und Ohren. —

b. Die anderen vier Unterfamilien haben unten mehr Backzähne als oben, oder gleich viele in beiden Kiefern.

aa. Zwei oder noch mehr kleine quer-gestellte Kaninzähne im Oberkiefer haben.

3) Die Hunde (*Canis*), mit 2 Backzähnen, vorn 5 hinten 4 Zehen, unbeweglichen Krallen, einer glatten Zunge und gewöhnlich runder Pupille; so namentlich beim Wolf (*C. lupus*) dessen Schwanz hängt, aber nur bis zum Hacken reicht, während die Stirn nicht gewölbt ist; und beim Haushund (*C. familiaris*) dessen Schwanz aufgebogen und dessen Stirn mehr gewölbt ist. Die hängenden Oh-

ren sind, wie alle die zahlreichen Spielarten, als allmälige Ausartungen des Grundtypus zu betrachten. — Eine elliptische aufrechte Pupille und einen bis zur Erde reichenden buschigen Schwanz besitzen die Füchse, unter denen sich der einheimische (*C. vulpes*) durch seine rothgelbbraune Farbe bei schwarzen Pfoten und schwärzlicher Schwanzspitze auszeichnet.

4) Die *Viverren* haben $\frac{4}{5}$ Backzähne, vorn und hinten gleichviel (4 oder 5) Behen, einen langen aber nicht so buschigen Schwanz und Drüsen neben dem After. Zu ihnen gehört: die *Zibethkäse* (*Viverra Zibetha*) mit spizigen Ohren, ausgestrecktem gleichmäßig behaartem Schwanz, 5 Behen an allen Füßen, beweglichen Krallen und rauher Zunge. Sie ist grau mit schwarzen Streifen, mit dem Schwanz gegen 3' lang und bewohnt Süd-Asien. Aus einer großen, unter dem After angebrachten Drüsentasche gewinnt man den *Zibeth*. — Das *Ichneumon* (*Herpestes Ichneumon*) hat kurze abgerundete Ohren, ausgestreckten zugespizten Schwanz, 5 Behen an allen Füßen, aber unbewegliche Krallen und keine Drüsentasche. Das kleine, einem Iltis ähnliche Thierchen ist gelblich grau, mit weißen Haarspizen, bewohnt Aegypten und stellt den Krokodileiern nach. —

bb. Nur einen größten oder sehr großen queren Kauhahn im Oberkiefer haben.

5) Die *Wieselartigen Raubthiere*, welche außerdem durch einen schlanken Körperbau, kurze Ohren, fünf Behen an allen Füßen und langen oder mäßig langen buschigen Schwanz sich auszeichnen. Dahin:

Das *Stinkthier* (*Mephitis putorius*) hat $\frac{4}{5}$ Backzähne, Drüsen neben dem After, aus welchen es eine sehr stinkende Feuchtigkeit bei der Verfolgung ausspricht, und zwei zurückgezogene, untere Schneidezähne. Es lebt, wie alle *Mephitis*, in Amerika und ist schwarzbraun, mit weißen Rückenstreifen.

Die *Marder* (*Mustela*) haben $\frac{5}{5}$ Backzähne, kleine Drüsen neben dem After und stark buschigen Schwanz. Dahin der *Baummarder* (*M. martes*) dunkelbraun mit gelber Kehle; der *Steinmarder* (*M. ioina*) hellbraun mit weißer Kehle; der *Sobel* (*M. zibellina*), ganz gelblich rothbraun, mit sehr langen grauen Haaren u. a. m.

Die *Iltisse* (*Putorius*) haben $\frac{4}{5}$ Backzähne und kürzer behaarte schlankere Schwänze; dahin der *gemeine Iltis* (*P. vulgaris*) schwarzbraun mit weißem Strich über der Schnauze; das *Frettchen*, (*P. furo*) ganz rothgelb mit rothen Augen; der *Hermelin* (*P. erminea*) hell rothbraun mit weißem Bauch, im Winter ganz weiß mit schwarzer Schwanzspitze; das *Wiesel* (*P. vulgaris*) hell rothbraun mit weißem Bauch, im Winter ganz weiß; halb so groß wie jener.

Die *Fischottern* (*Lutra*), mit $\frac{4}{5}$ Backz., breitem Kopf, Schwimmhäuten zwischen den Behen, kürzeren Beinen und zugespiztem Schwanz.

Die gemeine Fischotter (*L. vulgaris*) ist größer als ein Kater, röthlichbraun und lebt an Fischeichen. —

Der Bielfraß (*Gulo borealis*) hat fast das Gebiß der Marder, nemlich $\frac{1}{2}$ Backzähne, und gleicht dem Dachs in der Statur wegen der kurzen Beine und breiten nackten Sohlen; aber der Kopf ist kürzer, stumpfer und der Schwanz länger buschiger; neben dem After 2 schmierlose Hautfalten. Er ist größer als der Dachs, rothbraun, mit hellem Rücken und bewohnt den Norden Europas.

Der Dachs (*Meles vulgaris*) hat ziemlich das Gebiß des Marders, also $\frac{1}{2}$ Backzähne, nur ist der Kauzahn noch viel größer; seine langen zottigen Haare verdecken die kurzen Beine fast ganz und der Schwanz hat nur geringe Länge, über dem After eine Drüsentasche. Da auch seine Sohle breiter nackt ist, so hat man ihn zu den Bären gerechnet, was aber sein Gebiß nicht zuläßt. Er ist grau mit weißem Kopf und einem schwarzen Strich vom Ohr durch das Auge zur Nase, lebt in Erdböchern und wird lethargisch.

cc. Drei ziemlich gleiche viereckige oder längliche, nie quergestellte Kauzähne im Oberkiefer haben:

6) Die Bärenartigen Raubthiere, auch dadurch von den übrigen verschieden, daß sie mit der ganzen nackten Sohle auftreten; weshalb man sie Plattfußgänger (*plantigrada*) genannt hat. Sie besitzen vorn und hinten 5 Zehen und meistens $\frac{1}{2}$ Backzähne.

Die eigentlichen Bären (*Ursus*) haben $\frac{1}{2}$ Backzähne, von denen aber die 2 — 3 vordersten sehr klein sind und leicht ausfallen, einen runden Kopf mit spiziger Schnauze, kurze Ohren, keine Drüsentaschen, einen sehr kurzen Schwanz und ziemlich hohe plumpe Beine. — Der braune B. (*U. arctos*) schwarzbraun; im Norden der alten Welt; frist gern Honig. Der weiße B. (*U. marinus*, Eisbär) ganz milchweiß mit schwarzer Nase. Ebenda, aber nur an den Küsten.

Die Waschbären (*Procyon*) haben $\frac{1}{2}$ Backzähne, eine kleinere Statur, einen bis fast zum Hacken reichenden Schwanz und spize hervorragende Ohren. Die Arten, so groß wie Schäferhunde, bewohnen Amerika, sind braungrau mit weißlichem Kopf und schwarzem Querstreif durch beide Augen. Sie waschen ihre Nahrung.

B. Die Insekten fressenden Raubthiere (*Ferae insectivorae*) sind klein, fein gebaut, mit spizer hervorragender Schnauze, schwankender Zahl der Schneidezähne, kleinen undeutlichen Eckzähnen und spitzackigen Backzähnen in sehr verschiedener Zahl. Schlüsselbeine vorhanden. Leben von Insekten und Würmern, höchstens kleinen Mäusen.

Der Igel (*Erinaceus europaeus*) hat $\frac{1}{2}$ Schnz., kurze Ohren

und Schwanz, eine gekerbte Nase und viele durch einander gesteckte Stacheln. Er kann sich kugeln. 1' lang; frisst Mäuse.

Die Spitzmäuse (*Sorex*) haben $\frac{3}{4}$ Schnz., sehr kurze Ohren, eine rüffelförmig verlängerte Schnauze und einen längeren leicht behaarten Schwanz. Die Wasserspitzmaus (*S. fodiens*) ist $\frac{3}{4}$ lang, schwarz, unten weiß. An Ufern. Die Zwergspitzmaus (*S. pygmaeus*) ist $\frac{1}{2}$ lang, graubraun; das kleinste Säugethier.

Der Maulwurf (*Talpa europaea*) hat $\frac{1}{2}$ Schnz., eine spitze, aber kürzere Nase, keine Ohrmuscheln, sehr kleine versteckte Augen, und zum Graben taugliche Vorderfüße. 3—4" lang, schwarz, wühlt in der Erde. Frisst Regenwürmer.

Fünfte Familie. Beutelhierre, Marsupialia.

§. 32. Vorder- und Hintergliedmaßen nicht selten in Form und Zehenzahl verschieden. Gebiß dem der Raubthiere ähnlich; mitunter jedoch fehlen die Eckzähne. Die Zitzen am Bauch von einer Tasche oder Hautfalte umgeben, welche die saugenden Jungen umschließt und schützt. Dahin:

Die Beutelratte, das Opossum (*Didelphys virginiana*), so groß wie eine Ratte, gelblich weiß, mit $\frac{1}{2}$ Schnz., großen Eckz., überall 7 Backz., spitzer Schnauze und fast nacktem langem Schwanz. Hinterfüße handartig mit nagellosem Daumen. Frisst Vögel und deren Eier. Trägt die jungen im Beutel. Brasilien.

Das Känguruh (*Malmaturus giganteus*) hat $\frac{1}{2}$ Schnz., keine Eckzähne, überall 4 Backz., kleine 5zehige Vorderfüße und lange 4zehige Hinterfüße, deren beide inneren sehr zarten Zehen verwachsen sind. Schwanz lang, dick und behaart. Zitzen in einem großen Beutel. Wird 4' hoch, ist aschgrau, frisst nur Kräuter und lebt in Neuholland.

Sechste Familie. Nagethiere, Glires.

§. 33. Zwei, selten oben vier, Eckz. in jedem Kiefer, keine Eckzähne, aber 2 bis 6, gewöhnlich 4, schmelzfaltige Backzähne. Gliedmaßen häufig mit verschiedener Zehenzahl, die hinteren meistens länger, Zitzen am Bauch. Fressen Pflanzennahrung. Werfen viele nackte Jungen.

A. Mit vollkommenen Schlüsselbeinen.

a. Ohren und Schwanz dicht behaart. Eichhörnchen.

Das Eichhörnchen (*Sciurus vulgaris*). 5zehige Füße, Daumen der vorderen mit Nagel; Schwanz langhaarig, Haare zweizeilig. Rothbraun, im Winter grau, mit Haarbüscheln an den Ohren.

Der Siebenschläfer (*Myoxus glis*). Wie voriges, aber oh-

ne Nagel am Daumen der Vorderfüße. Schwanz dicht, Ohren leicht behaart. Grau, mit braunem Augenkranz, Größe der Ratte. In Wäldern. Das Murmelthier (*Arctomys marmotta*), mit kurzen, abgerundeten Ohren, kurzem, behaartem Schwanz, und gelblichgrauem, schwarzgemischtem Haarkleide. So groß wie eine Ratte, lebt in Erdlöchern, klettert, und fällt in einen Winterschlaf. Auf den Alpen, besonders in Savoyen.

b. Ohren, Pfoten und Schwanz ziemlich nackt.

a. Ohne Schwimmhäute. Mäuse.

Der Hamster (*Cricetus vulgaris*), mit kurzen, nackten Ohren, kurzem, leichtbehaartem Schwanz, 3 von Schmelz bekleideten Backz. und Backentaschen. Größe der Ratte, gelbbraun, Kehle und Brust schwarz, gelb eingefärbt. Thüringen, in Erdlöchern, fällt in Winterschlaf.

Die Mäusegattung (*Mus*) hat kurze, nackte Ohren, lange, leichtbehaarte, schuppige Schwänze, 3 ebensolche Backz., aber keine Backentaschen. Die Wanderratte (*M. decumanus*), gelbgrau, die größte, in Häusern. Die Hausratte (*M. rattus*), tief schwarz, Füße fleischfarben, nackt, kleiner; ebenda, aber von jener fast verdrängt. Die Hausmaus (*M. musculus*), mäusegrau, kaum 2" lang; gemein in Häusern. Die Brandmaus (*M. agrarius*), gelblich, mit schwarzem Rückenstreif; Größe der vorigen; in Gärten. Die Waldmaus (*M. sylvaticus*); gelbgrau, ohne Rückenstreif; in Wäldern. Alle gemein.

Die Wühlmäuse (*Hypudaei*) haben einen dickeren Kopf, 3 schmelzfaltige Backz., sehr kleine Ohren und einen kürzeren Schwanz. Die Feldmaus (*H. arvalis*) ist graugelblich und so groß wie eine Maus; gräbt Gänge und Löcher auf Feldern. Die Wasserratte (*H. amphibius*); halbe Größe und Farbe der Wanderratte; in Uferlöchern. Der Lemming (*H. lemmus*) hat einen sehr kurzen Schwanz, größere Krallen; Farbe braun, gelb gefleckt; in Sibirien; macht schnurgerade Wanderungen.

β. Mit Schwimmhäuten. Biber.

Der gemeine Biber (*Castor fiber*) hat 4 schmelzfaltige Backzähne, Schwimmhäute zwischen den Hinterzehen und einen breiten, mit Schuppen bedeckten Schwanz. Farbe gelbbraun, Länge über 2'. Am Ufer der Flüsse, wo er Wohnungen baut, besonders in Nordamerika, aber auch noch an der Elbe im Dessauischen.

B. Mit unvollkommenen Schlüsselbeinen.

a. Mit kurzen runden Ohren und 2 Schneidezähnen im Oberkiefer.

Das Stachelschwein (*Hystrix cristata*) hat 4 schmelzfaltige Backz., eine raue Zunge, viele lange drehrunde Stacheln und vierzehige Vorderfüße, am Hals eine Mähne. Farbe braun, Stacheln weiß geringelt. Süd-Europa, Nord-Afrika.

Das Meerschweinchen (*Cavia cobaya*) hat 4 aus 2 dreieckigen Platten gebildete Backz., nackte Ohren, kurzen Schwanz und kurze mit stumpfen Nägeln besetzte Zehen. Farbe weiß, mit gelb und schwarzen Flecken. Aus Brasilien, wo man's schon gezähmt fand.

b. Mit längeren Ohren und 4 Schndz. im Oberkiefer, je 2 hinter einander.

Die Hasen (*Lepores*) haben allein von allen Nagethieren die doppelten Schndz. und die größte Zahl der Backz. nemlich unten 5, aber oben 6. Schwanz kurz. Hinterbeine verlängert. Der gemeine Haase (*L. timidus*), Ohren länger als der Kopf, Farbe gelblich-braun-grau, Schwanz oben auf schwarz. Das Kaninchen (*L. cuniculus*), hellgrau, Ohren kürzer als der Kopf. In Erdlöchern, hier und da nicht selten.

Siebente Familie. Zahnlose, Edentata.

§. 34. Schneidezähne fehlen, häufig auch die Eckzähne, bisweilen selbst die Backzähne. Zähne einsörmig, zylindrisch oder kegelförmig, bisweilen faserig. Zehen verwachsen, ungleich; Krallen meistens sehr groß. —

A. Kiefer nicht schnabelförmig verlängert.

a. Mit Zähnen in beiden Kiefern.

α. Kopf kurz, kugelig, Ohren versteckt, Haar lang und dicht.

Das Faulthier (*Bradypus*), mit tief ausgeschnittenen, zylindrischen Backzähnen, keinen Schneidezähnen, 2 Bigen an der Brust und langen stark zusammengedrückten Krallen. 2 Arten sind bekannt: der Ai (*B. tridactylus*) mit 3 Krallen an allen Füßen, ohne Eckzähne mit $\frac{1}{2}$ Backz.; und der Ana (*B. didactylus*), mit starken Eckzähnen, $\frac{1}{2}$ Backz. und zweikralligen Vorderfüßen. Beide langsame Thiere, die auf Bäumen leben, und bloß Süd-Amerika bewohnen.

β. Kopf lang gezogen. Ohren groß, hervorragend.

Das Gürtelthier, Armadill (*Dasypus*), mit vielen (8 — 25) kegelförmigen oben zugespitzten Backzähnen, aber ohne Eck- und Schneidezähne. Leib von einem Hornpanzer bedeckt, hinten 5, vorn 4 — 5 Zehen. Leben in Süd-Amerika und fressen bloß Insekten. 3. B. der Tatu (*D. tricinctus*), mit kurzem Schwanz, und wenigen breiten Gürteln.

b. Ohne Alle Zähne. Ohrmuscheln versteckt; eine lange wurmförmige Zunge.

Das Schuppenthier, formosanisches Teufelchen (*Manis*), hat keine Zähne, aber breite, den ganzen Leib oben bedeckende Schuppen. Man kennt 2 Arten; eine (*M. brachyura*) mit kurzem Schwanz und 5 Zehen an allen Füßen, die andere (*M. macrura*) mit langem Schwanz und vorn 4 Zehen; jene in Ostindien, diese in Senegambien.

Der Ameisenfresser (*Myrmecophaga*) hat keine Zähne, ein kleines Maul, und dicke Haare. Der Ameisenbär (*M. jubata*) wird über 4' lang, hat ein langes braunes, an den Seiten helleres Haar, einen buschigen Schwanz und wohnt in Süd-Amerika. Frisst Ameisen und Termiten.

B. Kiefer schnabelförmig verlängert, bloß von nackter Haut bedeckt, keine Ohrmuscheln.

Das Schnabelthier (*Ornithorhynchus paradoxus*) hat einen breiten Entenschnabel, überall zwei faserige Backzähne und Schwimmhäute zwischen den Zehen. Es wird 1 - 1' lang, ist braun, und lebt in den Flüssen und Seen Neuhollands. Nach Einigen soll es Eier legen, doch fehlen ihm die Eizellen nicht. Eine zweite Gattung: *Echidna*, hat keine Backzähne und Schwimmhäute, aber große Krallen und Stacheln auf dem Rücken.

Achte Familie. Einhufer. *Solidungula*.

§. 35. Im Kiefer alle Zahnarten, nemlich $\frac{1}{2}$ Schnz., $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ Eckz. und $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ Backz., aber zwischen jeder eine weite Lücke, Eckzähne fehlen mitunter. Füße einzeigig, mit großen Hufen.

Hierher die einzige Gattung des Pferdes (*Equus*), wovon 6 Arten bekannt sind, nemlich das gemeine (*E. caballus*), der Esel (*E. asinus*), der Halbesel oder Dschiggetai (*E. hemionius*), das Zebra (*E. Zebra*), das Quagga (*E. quagga*) und der Onagga (*E. Burchellii*), alle leben ursprünglich in der alten Welt, die drei letzteren allein in Afrika.

Neunte Familie. Zweihufer, *Bisulca*, oder Wiederkäuer, *Ruminantia*.

§. 36. Keine Schneidezähne im Oberkiefer, aber 6 oder 8 im Unterkiefer, allermeistens keine oder kleine Eckzähne und $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{2}$ Backzähne. Zwei große von Hufen bekleidete Zehen und meistens 2 kleinere nicht auftretende Hufe dahinter (Asterklauen). Die hierher gehörigen Thiere fressen, wie die vorigen, nur Pflanzennahrung, die sie ungekaut verschlucken, daher dieselbe aus dem Magen wieder heraufsteigt, um zum zweiten Male gekaut zu werden. Deshalb besteht ihr Magen aus vier getrennten Säcken, dem Wanst oder Wansen (*rumen*), dem Netzmagen oder der Haube (*reticulum*), dem Psalter oder Buch (*omasum*) und dem Labmagen (*abomasum*).

A. Ohne Ackerklauen.

Das Kameel (*Camelus bactrianus*). Mit Eckzähnen in beiden Kiefern, $\frac{2}{3}$ Schnd., $\frac{2}{3}$ - $\frac{4}{5}$ Backz. und kleinen Hufen. Rücken mit zwei Höckern. Das Dromedar (*C. dromedarius*) hat nur einen Höcker. Beide nicht mehr wild, aber in Vorder-Asien und Nord-Afrika die gebräuchlichsten Hausthiere.

Das Lama (*Auchenia lama*). Mit eben denselben Zähnen, aber $\frac{2}{3}$ - $\frac{4}{5}$ Backz. und deutlicher getrennten, großhufigen Behen. Keine Höcker auf dem Rücken. So groß wie ein Hirsch, rothbraun, langhaarig. Peru.

Die Giraffe (*Camelopardalis girassa*). Ohne Eckzähne, aber mit kurzen von der Haut bekleideten Stirnhörnern; Hals lang, Vorderbeine länger als die hinteren. Farbe gelblich, rothbraun gefleckt. Afrika.

B. Mit Ackerklauen.

a. Mit ästigem Geweih, aber gewöhnlich bloß beim Männchen.

Die Hirschgattung (*Cervus*) hat bisweilen Eckz. im Oberkiefer, und zeichnet sich durch das hohe ästige Geweih der Männchen, das alle Jahr erneuert wird, aus. Vor dem Auge eine längliche Vertiefung (Thranengrube). Der Edelhirsch (*C. elaphus*), rothbraun, Männchen mit großem, vielzackigem Geweih. Das Reh (*C. capreolus*), graubraun, Männchen mit kleinerem, stark höckerigem Geweih. Das Rennthier (*C. tarandus*), dessen Weibchen allein auch ein Geweih besitzt. Der Dammhirsch (*C. dorcas*) und das Elenthier (*C. alces*) gehören auch hierher.

b. Mit Hörnern, wenigstens beim Männchen, aber ohne Eckzähne. —

Die Antilopen (*Antilope*) haben meistens die schlanke Gestalt der Hirsche, aber die von Horn überzogenen, nicht ästigen Geweihe der Rinder, wiewohl sie zarter und feiner sind. In Europa nur eine Art, die Gemse (*A. rupicapra*), schwarzbraun mit weißem Kopf, dunklem Backenstreif, und hakigen Hörnern. Schweiz, Tyrol.

Die Ziegengattung (*Capra*) hat eine tiefgespaltene Oberlippe, kantige Hörner und einen Bart am Kinn; dahin: die gem. Ziege (*C. hircus*) mit kurzen, sanftgebogenen Hörnern; der Steinbock (*C. ibex*) mit großen, starken, knotigen Hörnern, u. v. a.

Die Schaafgattung (*Ovis*) hat nach außen gerichtete, knotige Hörner, aber keinen Bart. Das gem. Schaaf (*O. aries*) hat einen kurzen Schwanz und ein weiches krauses Wollhaar; es findet sich nicht mehr wild.

Die Rindergattung (*Bos*) hat runde, meistens doppelt gebogene, beiden Geschlechtern eigene Hörner, eine breite nicht behaarte Schnauze, kurze Haare, aber einen Haarbüschel am Schwanz. Dahin: der gemeine Ochse (*B. taurus*), mit flacher Stirn, großer Mamme und einer Leiste zwischen den Hörnern; der Auerochse (*B. urus*), mit einem wolligen Haarkleide und Bart am Kinn;

Der Büffel (*B. bubalus*) mit kurzen steifen dünnen Haaren, etwas gewölbter Stirn und kurzen dicken Hörnern. Ostindien; auch in Ungarn und Italien gezähmt.

Zehnte Familie. Vielhufer, Multungula, oder
Dickhäuter, Pachydermata.

§. 37. Mehr als zwei auftretende Zehen mit kleineren Hufen an allen Füßen, doch schwankt ihre Zahl zwischen 3 und 5. Zähne verschieden, häufig alle drei Arten, aber durch Lücken getrennt; Einigen fehlen die Eckzähne, selbst die Schneidezähne in beiden, oder bloß im Unterkiefer, aber die des Oberkiefers dann sehr groß.

A. Mit Eckzähnen.

Die Schweingattung (*Sus*). Vier Zehen an allen Füßen, die äußeren kleiner, nach hinten gerichtet und erhaben. Alle Zahnarten, Eckzähne groß und gebogen, Backzähne in verschiedener Zahl, meist 7-7; Leib mit steifen Borsten bedeckt. Das gem. Schwein (*S. scrofa*) hat verhältnißmäßig kleine Eckzähne, kurze Füße und ein dichtes Haarkleid; wild in unseren Wäldungen. Der Babilussa oder Hirscheber (*S. babirusa*) hat sehr große hakenförmige Eckzähne, von welchem selbst die des Oberkiefers aufrecht stehen. Sumatra und Java.

Das Flusspferd (*Hippopotamus amphibius*) hat 4 gleiche Zehen an allen Füßen, und alle Zahnarten, aber oben mehr Backzähne als unten ($\frac{3}{2}$). Haut nackt. Nächst dem Elephanten das größte Landthier. Aegypten und Afrika überhaupt, in Flüssen. Frisst Pflanzengstoffe, besonders saftige Wurzeln.

Der Tapir (*Tapirus americanus*) hat vorn vier, hinten drei Zehen, alle Zahnarten, oben mehr Backz. als unten ($\frac{3}{2}$), eine rüßelförmige Nase, und eine dünnbehaarte Haut. So groß wie ein tüchtiges Schein, braun. Das größte amerikanische Thier dieser Gruppe.

B. Ohne Eckzähne.

Die Nashornattung (*Rhinoceros*) hat 3 Zehen an allen Füßen, 2 ob. 4 mitunter fehlende Schndz. und 7 Backz., eine dicke schwieliche nackte Haut, und ein oder 2 gebogene Hörner auf der Nase. Das afrikan. R. (*Rh. africanus*) hat im Alter keine Schneidezähne und 2 Nasenhörner, das von Sumatra (*Rh. sumatrensis*) ebenfalls, aber $\frac{3}{2}$ Schneidezähne; die anderen beiden ostindischen Arten haben nur ein Nasenhorn und $\frac{1}{2}$ Schndz.

Die Elephantengattung (*Elephas*) hat große Schneidezähne im Oberkiefer (Stoßzähne), und 1 bis 2 große Backzähne oben wie unten. Nase in einen langen Rüssel verlängert, Haut der Alten

nackt, 5 Behen an allen Füßen. Der ostindische G. (*E. indicus*) hat kleinere Ohren, vorn 5 hinten 4 Hufe, Backzähne mit parallelen Schmelzleisten; der afrikanische (*E. africanus*) größere Ohren bloß 4 Hufe und Zähne mit rautenförmigen Schmelzleisten. —

Elfte Familie. Flossenfüßer, Pinnipeda.

§. 38. Fünf Behen an allen Füßen, aber durch eine derbe Haut zur Flosse verwachsen. Nägel vorhanden, krallenartig. Alle Zahnarten. Leib behaart.

Die Seehunde (*Phocae*) haben ganz das Gebiß der Raubthiere; $\frac{1}{2}$ bis $\frac{3}{4}$ Schnäz., starke Eckzähne, die aber nicht aus dem Munde hervorragen und 5—6 hakige Backzähne. — Der gemeine S. (*Ph. vitulina*) ist gelbgrau, auf dem Rücken bräunlich und hat keine Ohrmuscheln. Ost- und Nordsee, frisst Fische. Der Seelöwe (*Ph. jubata*) hat eine lange Mähne um den Hals und kleine Ohrmuscheln. Farbe gelbbraun. Südsee.

Das Walroß (*Trichechus rosmarus*) hat keine Ohrmuscheln, große hervorstechende Eckzähne im Oberkiefer, im Alter keine Schneidezähne, und dann gewöhnlich überall 3 Backzähne. Es wird 18—20' lang, ist gelbbraun, lebt im Eismeer heerdenweis und frisst besonders Miesmuscheln (*Mytilus*).

Zwölfte Familie. Walfische, Cetacea.

§. 39. Körper fischförmig, mit flossenartigen Vordergliedmaßen und gar keinen hinteren. Ohrmuschel fehlt. Leib nackt, haarlos. Alle leben im Meere.

A. Die Cinen, welche man Sirenen nennt, haben nach vorn gerichtete Nasenlöcher, Zigen an der Brust, Zähne wie die Dicksäuter und Nägel an den Flossen. Fressen Kräuter. Dahin:

Die Seejungfer (*Halicore Dugong*), mit 2 großen Schneidezähnen und flachem, halbmondsförmigen Schwanz. 7—8' lang. Südsee. Dieß Thier scheint zu der Fabel von den Seejungfern oder Sirenen Veranlassung zu haben.

B. Die Anderen oder Delphine, haben oben auf dem Kopf befindliche Nasenlöcher, Zigen am Bauch, keine Nägel an den Flossen, aber Zähne im Kiefer.

Der eigentliche Delphin (*Delphinus delphis*) hat viele kegelförmige Zähne in beiden Kiefern, ist grau, mit weißem Bauch, wird 8—10' lang und lebt an europäischen Küsten.

Der Pottfisch (*Physeter macrocephalus*) hat nur im Unterkiefer Zähne, und Gruben im Oberkiefer, welche die Zähne aufnehmen. Sein Kopf ist groß, sein Leib 50' lang. Eismeer.

Der Narwal oder Einhornfisch (*Monodon monocerus*) hat nur zwei grade gewundene Stoßzähne im Oberkiefer, von welchen einer immer ausfällt. Leib gelblich, grau gefleckt. 18—20' lang, Nordmeer.

C. Die Dritten oder achten Walfische haben die Kennzeichen der vorigen, aber keine Zähne, sondern am Rande gefaserte Hornplatten, welche am innern Rande des Oberkiefers feststehen (Warten, Fischbein). Fressen, wie die vorigen, thierische Nahrung.

Der grönländische Walfisch (*Balaena mysticetus*) hat einen sehr großen Kopf, einen glatten Leib und keine Rückenflosse. Gegen 50' lang.

Der Finnfisch (*Balaenoptera boops*) hat einen schwächtern, am Bauch gefurchten Leib, einen spigen Kopf und eine dreieckige Rückenflosse. Beide im Eismeer.

Zweite Klasse.

V ö g e l , A v e s .

§. 40. Keine Zähne in den nackten, von Hornsubstanz bekleideten Kiefern (Schnabel). Leib mit Federn bedeckt, ebenso die zu Flügeln umgestalteten Vordergliedmaßen.

Unerwartete Eigenthümlichkeiten der Vögel sind: die Pneumatizität der Knochen, d. h. sie sind hohl, leer, und ihre Höhlungen stehen durch Kanäle in Verbindung; in diese dringt die Luft von der Lunge aus. Das Brustbein hat einen Kamm, der nur dem Strauß und Kasuar fehlt; das Becken ist vorn offen, die Rippen haben einen Hakensfortsatz; die Flügel sind dreizehig, die Füße 2—4-zehig, jede Zehe des Fußes und der Daumen des Flügels mit einem Nagel.

Die Federn sind hornige Gewächse, welche so lange sie wachsen, durch Blutgefäße ernährt werden. Jede besteht aus dem Schaft und der an beiden Seiten desselben angefügten Fahne, das untere hohle Ende des Schaftes heißt Spule, und die darin befindliche aus Zellen bestehende faltige Haut nennt man Seele. In dieser steigen die Blutgefäße hinauf. Alle Wasservögel, doch auch viele andere Gruppen, nur nicht die Singvögel, haben 2 Arten von Federn; Deckfedern, welche derber, fester gebildet sind und die äußerste Oberfläche bilden, und Flaumenfedern oder Daunnen, zartere, weichere, wollige Federn, die den untern Raum zwischen den Deck-

federn ausfüllen, bei den andern Vögeln ist bloß der untere Theil jeder Feder daunenartig. Die großen Federn, welche an den Zehen der Vordergliedmaßen sitzen, nennt man Schwungfedern (*remiges*), die darüber auf der Oberfläche des Flügels befindlichen heißen ganz besonders Deckfedern (*tectrices*), die großen Federn des Schwanzes nennt man Schwanz- oder Steuerfedern (*rectrices*). Die Federn sind stets fettig und lassen kein Wasser durch. Das Fett wird von einer Drüse abgesondert, die oben auf dem Schwanz liegt, und Bürzeldrüse heißt. Mit diesem Fett schmieren die Vögel ihre Federn ein. —

Der Schnabel und die Füße sind die einzigen nackten Theile des Vogels. Jenen bekleidet vorn eine hornige Scheide, hinten eine weiche Haut, Wachshaut (*ceroma*), in welcher die Nasenlöcher liegen. Die Füße sind von einer mit hornigen Schuppen oder Schildern bekleideten Haut überzogen, welche bei den Wasservögeln nicht bloß die Zehen, sondern auch die Fußwurzel (*tarsus*) und einen Theil des Schienbeines umgiebt; bei den andern die Zehen und Fußwurzel allein. Jene Bildung der Füße bezeichnet man mit Wadbeinen (*pades vadentes*), oder, wenn die Beine sehr lang sind, mit Stelzenfuß (*pes grallarius*); fehlt solchen Füßen die Hinterzehe, so pflegt man sie Lauffüße (*pedes cursorii*) zu nennen. Sind alle Zehen mit Hautlappen versehen, oder durch Haut verbunden, so heißt der Fuß Schwimmfuß (*pes natatorius*); haben die Zehen starke gebogene Krallen und ein gedrungenes Ansehn, so heißt er Raubfuß (*p. raptorius*); ist der Fuß kleiner, zarter und die Krallen stumpf, so heißt er Gangfuß (*pes ambulatorius*); sind bei diesen Füßen die beiden äußersten Zehen verwachsen, so nennt man sie Schreitfüße (*pedes gressorii*); stehen 2 Zehen nach vorn, 2 nach hinten, so nennt man ihn Kletterfuß (*pes scansorius*); ist die äußerste Zehe beweglich, so daß sie bald nach vorn, bald nach hinten gerichtet werden kann, so heißt sie Wendezehe (*digitus versatilis*).

Von den inneren Organen ist nur hinsichtlich des Magens anzuführen, daß er bei allen Körner fressenden Vögeln mit 2

dicke halbflugelförmigen Muskeln versehen, bei den übrigen häutig ist. Vor dem Magen findet sich ein Kropf.

Alle Vögel legen bekanntlich hartschaalige Eier, welche vom Weibchen, oder auch Männchen und Weibchen abwechselnd, bebrütet werden, bis die Jungen austriechen. Das ausgebrütete Junge bleibt dann im Nest, und wird von den Eltern ernährt (Nesthocker), oder es verläßt sogleich nach der Geburt das Nest und sucht sich selbst seine Nahrung (Nestflüchter).

Die Vögel wechseln, wie die Säugethiere, ihr Federnkleid (mausern), und zwar entweder einmal im Herbst (Herbstmauser), oder zweimal, im Frühjahr und Herbst. In diesem Fall ist ihr Kleid häufig verschieden gezeichnet, das zwischen Frühjahr und Herbst nennt man Sommer- oder Hochzeitskleid, das zwischen Herbst und Frühjahr heißt Winterkleid. —

Die meisten Vögel unserer Gegend sind Zugvögel, d. h. sie verwechseln zu gewissen Jahreszeiten ihren Aufenthaltsort mit einem andern: dies geschieht im Herbst nach der Mauser und im Frühjahr vor der Mauser. Nur diejenigen Vögel sind einheimische, welche bei uns Nester bauen und brüten.

Man kennt gegen 5000 verschiedene Vogelarten, welche in 3 Ordnungen und 8 Familien eingetheilt werden, wie folgt:

I. die Jungen sind Nesthocker.

1. Ordn. Luftvögel (*Aves aëreae*) fliegen geschickt mit an die Brust angezogenen Beinen. Füße sind bis über den Hacken befiedert.

1. Raubvögel. 2. Singvögel. 3. Spechte. 4. Tauben.

II. Die Jungen sind Nestflüchter.

2. Ordn. Erdvögel (*Aves terrestres*) fliegen schlecht, doch mit angezogenen Beinen, oder gar nicht, und haben plumpe bis zum Hacken befiederte Füße.

5. Hühner. 6. Strauße und Kasuare.

3. Ordn. Wasservögel (*Aves aquaticae*) fliegen mit nach hinten ausgestreckten Beinen, deren Befiederung den Hacken nicht ganz erreicht.

a. Mit langen Beinen, meist ohne Schwimmbhaut.

7. Sumpfvögel (Kraniche, Störche, Reiher, Schnepfen).

b. Mit kurzen Beinen und Schwimmbhäuten.

8. Schwimmvögel (Möven, Enten, Gänse, Taucher).

Erste Familie. Raubvögel, Accipitrinae.

§. 41. Schnabel dick und stark, aber kürzer als der Kopf, mit horniger, übergebogener, hakiger Spitze und breiter Wachshaut. Füße kurz, stark, mit großen, spitzen, gebogenen Krallen. Fressen Fleisch.

Die Geier (Vultures) haben nackten Kopf und Hals, längere in der Mitte zusammengeschnürte Schnäbel und kurze, dicke Krallen. Der gelbe G. (*V. fulvus*) in röthlichbraun mit weißlichem von Daunen bekleidetem Kopf, gelber Halskrause und spaltenförmigen, fast senkrechten Nasenlöchern. Süd-Europa. — Der Geierkönig (*Cathartes papa*) hat wagrechte durchgehende Nasenlöcher und beim Männchen einen Hautkamm auf dem Schnabel; Gefieder oben rothgelb, unten weiß, Schwingen und Schwanz schwarz, Halskrause grau. Süd-Amerika. — Die Geier fressen nur Aas.

Die Falken (Falcones) haben befiederten Kopf und Hals, seitwärts stehende Augen, starke Krallen, und niemals befiederte Zehen. Sehr viele Arten sind bekannt, z. B. der Königsadler (*F. imperialis*), rothbraun mit hellerem Nacken und befiederten Läufen. Der Seeadler (*F. albicilla*), braun mit weißlichem Kopf und Schwanz, und unbefiederten Läufen. Der Habicht (*F. palumbarius*), oben graubraun, unten weiß, mit vielen feinen, schwarzen Querwellenlinien, 14' hoch. — Der Sperber (*F. nisus*), ebenso, aber nur 4' hoch. Beide mit gelben Beinen und Wachshaut, aber blauem Schnabel. — Der Thurmfalk (*F. tinnunculus*), Schnabel mit einem Ausschnitt hinter der Spitze, Farbe rothbraun mit schwarzen Längsstrichen, Schwanz mit schwarzer Binde von der Spitze. Größe des Sperbers. — Der Edelfalk (*F. islandicus* s. *F. Gyrfalco*), Schnabel des Vorigen, Zehen sehr lang, Läufe kurz; Gefieder weißlich oder oben grau, mit vielen schwarzen Querbinden und Längsflecken, die im Alter abnehmen. Norden Europas.

Die Eulen (Striges) haben nach vorn gerichtete Augen, die von einem Federkranz (Schleier) umgeben sind; Schnabel und Füße kleiner, letztere bis auf die Zehen befiedert. Der Uhu (*Strix bubo*) hat Ohrbüschel, ist braun mit schwarzen Kreuzflecken und wird 2' hoch. Die Schleiereule (*St. flammea*) hat einen sehr großen Schleier, keine Ohrbüschel; unten gelb, auf dem Rücken rothbraun, mit vielen Längslinien abwechselnd weißer und schwarzer Punkte, 1" hoch. Gemein. — Die Eulen gehen nur bei Nacht auf den Raub aus und halten sich am Tage versteckt.

Zweite Familie. Singvögel, Passerinae.

§. 42. Schnabel allermeistens klein; oft kürzer als der Kopf, grade, kegel- oder pfriemensförmig; nur Gangfüße; deren Lauf hinten in der Regel von 2 langen Schienen bedeckt ist, eine am Zipfel nackte Bürzeldrüse und 12 Schwanzfedern. Alle haben eine laute Stimme, die durch einen eigenen Apparat am unteren Ende der Luftröhre (unterem Kehlkopf) verstärkt wird; viele singen melodisch. Alle bauen künstliche Nester und füttern ihre Jungen.

A. Nasengruben besiedert, Nasenlöcher unter Federn versteckt.

a. Eine Kerbe neben der hakigen Schnabelspitze.

Der Seidenschwanz (*Bombycilla garrula*) hat ein röthlich graubraunes Gefieder und eine Federnhülle auf dem Kopfe; Schnabelgrund, Schwingen und eine Binde vor der gelben Schwanzspitze schwarz; Handschwingen gelb gerandet, Armschwingen und die Schwanzfedern mit rothen Hornblättchen an der Spitze. In Nadelwäldern, bei uns bloß im Winter.

b. Keine Kerbe neben der Schnabelspitze.

aa. Keine steifen Borstenspitzen an den Federn des Mundrandes.

Die Rabengattung (*Corvus*), mit großem, starkem, kegelförmigem, gradem Schnabel, und stufigen ersten Handschwingen. Der Rabe (*C. corax*), der größte, ganz schwarz. Die Krähe (*C. cornix*), grau, mit schwarzem Kopf, Flügeln und Schwanz. Die Dohle (*C. monedula*), schwarz, mit dickem graulichem Kopf u. a. m.

bb. Mit steifen Borstenspitzen an den Federn des Mundrandes.

a. Lauf hinten mit doppelter Schilderreihe.

Die Lerchen (*Alaudae*) haben einen etwas kürzeren, zarteren, kegelförmigen Schnabel und einen sehr langen Sporn an der Hinterzehe; Farbe gelbgrau, mit braunen Flecken. Die Haubenlerche (*A. cristata*) hat auf dem Kopf einen langen, spizen Federnbusch.

β. Lauf hinten geschient.

Die Meisengattung (*Parus*) hat einen sehr kleinen, kurzen, mitunter ziemlich dicken, mehr kegelförmigen Schnabel und eine mit mehreren Hornspitzen versehene Zunge; bekannt ist: die Kohlmeise (*P. major*) Kopf schwarz, Rumpf gelbgrün, Wangen weiß; und die Beutelmeise (*P. pendulinus*), rostroth, Bauch gelblich, Stirn und Schläfen schwarz; baut ein beutelförmiges, an Zweigen hängendes Nest. —

Das Goldhähnchen (*Regulus cristatus*) hat einen feinen, vorn zusammengedrückten, aber graden Schnabel, kurze Flügel, und eine kleine Federnhülle auf dem Scheitel; Gefieder olivensarben, Scheitel gelb, mit schwarzem Seitenstreif. Der kleinste deutsche Vogel.

Der **Blauspecht** (*Sitta europaea*) hat einen längeren, flacheren, graden, am Ende abgerundeten Schnabel, große Krallen und einen kürzeren, breiten, runden Schwanz; Farbe oben blaugrau, unten fleischroth. Hüpfet an Baumstämmen nach Insekten.

B. Nasengruben nicht besiedert, das Nasenloch frei sichtbar.

a. Keine steifen Vorstensspitzen an den Federn des Mundrandes.

aa. Schnabel lang, dünn, leicht gebogen.

Der **Baumläufer** (*Certhia familiaris*) hat lange Krallen und steife, spitze Schwanzfedern zum Anstemmen beim Klettern; Farbe oben braungrün, weiß gesprenkelt. Zeitig im Frühjahr in Gärten, an Baumstämmen hüpfend, zutraulich.

Die **Honigsänger** (*Nectarineae*) haben eine lange, röhrige, zum Honigsaugen taugliche Zunge und keinen steifen Schwanz zum Anstemmen. Viele Arten, alle prächtig gold- oder erzfarben, meist aus Afrika; gelten für Kolibri's.

bb. Schnabel grade, stärker, dicker.

Der **Staar** (*Sturnus vulgaris*), mit vorn abgerundetem, flachem Schnabel, dessen Mundwinkel sehr stark nach unten gezogen ist; Gefieder blauschwarz, weiß gesprenkelt. Auf Viehweiden.

b. Mit steifen Vorstensspitzen an den Federn des Mundrandes.

aa. Schnabel kurz, dick, kegelförmig, ohne Kerbe neben der Spitze; Nasenloch dicht am Grunde.

Die **Finken** (*Fringillae*) haben die stärksten, dicksten, härtesten, aber dabei nicht längsten Schnäbel unter allen Singvögeln. Auch fressen sie nur Samereien, die Sänger und ihre Verwandten dagegen Insekten. Der **Sperling** (*F. domestica*), grau, Rücken braun und schwarz gefleckt, Kehle des Männchens schwarz. Der **Buchfink** (*Fr. coelebs*), Männchen mit blaugrauem Scheitel, braunem Rücken und rostrother Kehle wie Brust; Weibchen oben grünlich, unten grau. Flügel gestreift. Der **Kanarienvogel** (*Fr. canaria*), ganz schwefelgelb. Jetzt nicht mehr wild.

Die **Ammern** (*Emberizae*). Schnabel der Finken, aber der Oberkiefer ausgebogen und der Unterkiefer mit einer hervorspringenden Ecke am Mundwinkel, Gaumen mit einem Höcker. Die **Goldammer** (*E. citrinella*), Kopf und Brust schwefelgelb, wie der graue Rücken braun gefleckt.

bb. Schnabel mit einer Kerbe neben der mehr hakigen Spitze; Nasenloch der Mitte genähert, unter einer Schuppe.

a. Flügel stets kürzer als die mittleren Schwanzfedern.

Die **Bürgergattung** (*Lanius*), mit kurzem, dickem, gebogenem, von den Seiten zusammengedrücktem, und mit einem Seitenzahn vor der Spitze versehenem Schnabel. Manche Arten fressen junge Vögel. Der **Keuntödter** (*L. collurio*) ist oben zimmetbraun, unten und am Kopf grau. Schlafen schwarz. Spießt Käfer an Dornen.

Die Drosseln (*Turdus*) haben einen feineren, graden, mehr drehunden Schnabel und eine sehr kleine erste Schwinge. — Die Schwarzdrossel oder Amsel (*T. Merula*) ist ganz schwarz mit gelbem Schnabel. Der Krametsvogel (*T. pilaris*), oben aschgrau, Rücken bräunlich, Kehle und Brust rostgelb, schwarzbraun gefleckt. Die Singdrossel (*T. musicus*), oben olivenfarben, unten gelblich mit dreieckigen dunkelbraunen Flecken.

Die Sängergattung (*Sylvia*) hat ganz die Form und das Ansehn kleiner Drosseln, ihr Schnabel ist sehr zart, die erste Schwungfeder sehr klein. Die Nachtigall (*S. luscinia*), rothbraun, am Bauch heller. Das Rothkehlchen (*S. rubecula*), oberhalb olivenfarben, Kehle rostroth; u. v. a.

Die Bachstelze (*Motacilla*) hat einen etwas längeren Schnabel und einen viel längeren Schwanz, die erste kleine Schwinge fehlt. Die weiße B. (*M. alba*), oben grau, Stirn, Bauch und die äußeren Schwanzfedern weiß. Die gelbe B. Gelbgänsechen (*M. flava*), oben schmutzig grün, unten gelb, Kopf aschgrau.

Der Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*), hat den Schnabel der Borigen, doch ist er sanft gebogen; Flügel kurz, abgerundet und der Schwanz sehr kurz. Gefieder braun, schwarz gewellt.

β. Flügel länger als die mittleren Schwanzfedern.

Die Schwalben (*Hirundines*) haben sehr kleine, flache, spitze, übergebogene Schnäbel und kleine zarte Füße. Die Hauschwalbe (*H. urtica*) oben stahlblau, unten weiß, Behen befiedert. Bauet in Häuser. Die Rauchschwalbe (*H. rustica*), ebenso, Stirn und Kehle rothfarben, Behen unbefiedert. Bauet außen an Häuser.

Dritte Familie. Spechtvögel, *Picariae*.

§. 43. Mit großen den Kopf an Länge übertreffender Schnäbeln, größeren, stärkeren, meistens zu Schreit- oder Kletterfüßen umgebildeten Beinen, deren Lauf hinten nie von Schienen, sondern nur von Warzen bekleidet ist, und einer am Zipfel häufig befiederten Bürzeldrüse. Allen fehlen die Singmuskeln und die melodische Stimme. Die wenigsten Glieder dieser inhaltsreichen Gruppe sind in Europa zu Hause, die meisten leben zwischen den Wendekreisen. Merkwürdig sind besonders folgende:

a. Mit Gang- oder Schreitfüßen.

α. Schnabel klein, kürzer als der Kopf.

Der Mauersegler (*Cypselus apus*) hat ganz das Ansehn einer Schwalbe, einen breiten und flachen, aber kleinen Schnabel, und Füße mit gleich langen Behen, die äußeren am Grunde verwachsen, die innere eine Bendezehe. Flügel lang, wie beim Kolibri. Farbe braun.

schwarz, Kehle weißlich. Nistet auf Kirchthürmen, fliegt schaarweise mit lautem Geschrei durch die Straßen.

Die Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*) hat ganz das Ansehn des Vorigen, ist aber größer, wie eine Drossel, hat einen sehr breiten, aber kurzen Schnabel, der bis hinter das Auge gespalten ist, und durch Haut verbundene Zehen. Nagel der Mittelzehe am inneren Rande gekämmt; Gefieder düster, braungrau mit dunklen Flecken. Frisst Abendfalter und andere Insekten, die er im Zwielicht fängt.

β. Schnabel länger als der Kopf, meistens groß und dick.

Die Kolibrigattung (*Trochilus*), welche die kleinsten aller Vögel enthält, ausgezeichnet durch lange, dünne, grade Schnäbel, eine lange, runde gespaltene Zunge, welche ihnen zum Einsaugen des Blüthenhonigs dient, und ziemlich lange, bisweilen vorn hornige Schwungfedern. Sie leben nur in Amerika und haben ein schönes glänzendes Gefieder; manche Arten wiegen nur einige Gran; die Eier wie Erbsen, aber länglich.

Der Weidenhopf (*Upupa epops*), mit einem langen, dünnen, sanft gebogenen Schnabel, und einer aus einer doppelten Reihe von Federn bestehenden Hölle auf dem Kopf, die er auf- und niederschlagen kann. Gefieder hellgelbbraun, Federnhölle am Rande schwarz, Flügel schwarz, mit weißen Querverbinden. In Weidengebüsch.

Der Eisvogel (*Halcedo ispida*) hat einen großen, graden, starken, rothen Schnabel, dessen Mittellinie einen Kiel bildet, und rothe Schreitfüße. So groß wie ein Dompfaff, oben blaugrün, Kehle weißlich, Brust und Bauch rothbraun. Lebt an den Ufern von Seen, Flüssen, Teichen, wo er auch nistet.

Die Nashornvögel oder Kalas (Buceros) haben große, starke, gebogene, meistens mit einem rückwärts gekrümmten Kuss auf dem Oberkiefer versehene Schnäbel, und dicke klotzige Schreitfüße. Sie sind meistens große Vögel, mit schwarzem, dunklem Gefieder, welche die heißen Gegenden der alten Welt, besonders Afrika's bewohnen, und von Früchten, Insekten oder kleinen Vögeln leben.

Die Mandelkrähe oder Blauracke (*Coracias garrula*) hat ganz das Ansehn eines krähenartigen Vogels, einen graden an der Spitze übergebogenen, schwarzen Schnabel, und gelbe ziemlich zarte Füße. Gefieder des Rückens mandelbraun, Bauch, Brust, Kopf und Hals spangrün, Schwungfedern azurblau. Lebt einzeln in Gebüsch, wird so groß wie eine Dohle, und ist wohl der schönste aller deutschen Vögel. Frisst Insekten.

b. Mit Kletterfüßen.

Der Kukuk (*Cuculus canorus*) hat die Größe der Dohle, einen leicht gebogenen Schnabel mit ganz rundem Nasenloch, und gelbe Kletterfüße. Der Schwanz, besonders mancher ausländischen Arten

ist lang, das Gefieder grau oder braun, mit dunklen Querlinien. Dieser Vogel hat die Eigenthümlichkeit, daß er seine Eier nicht selbst ausbrütet, sondern kleinen Vögeln, die von Insekten leben, besonders Grassmäcken, ins Nest legt.

Der Wendehals (*Lynx torquilla*), ein kleiner Vogel, von der Größe einer Lerche, mit kleinem, gradem Schnabel, langer, weit ausstreckbarer Zunge, und grauem, dicht mit kleinen schwarzen Dreiecken bestreutem Gefieder. Lebt paarweis und nistet auf alten Baumstämmen.

Die Gattung der Spechte (*Picus*) zeichnet sich aus durch einen großen, graden, sehr starken Schnabel mit länglichen Nasenlöchern; durch eine lange, runde, weit ausstreckbare Zunge; und durch einen spizen, steifen Schwanz zum Anstemmen. Die Spechte leben in den Wäldern, und klopfen an die Baumstämme, um Insekten aus den Ritzen und Spalten derselben hervorzutreiben. Der Schwarzspecht (*P. martius*) ist so groß wie eine Krähe, schwarz mit rothem Scheitel. Der Grünspecht (*P. viridis*) ist schmutzig grün, mit schwarz und weiß gestreiften Schwungfedern und rothem Scheitel.

Die Pfefferfresser oder Tukans (*Rhamphastus*) haben die größten Schnäbel von allen, die wohl 3 — 4mal so lang sind als der Kopf, dick, breit, sanft gebogen, gegen das Ende zusammengedrückt, inwendig aber zellig und voll Luft, daher leicht; Zunge federförmig, hornig. Sie leben in Brasilien und fressen saftige Früchte, Vogeleier und junge Vögel. Gefieder schwarz; theilweis gelb, weiß oder roth.

Die Papageien (*Psittaci*) endlich haben kürzere aber sehr dicke, stark gewölbte Schnäbel, eine dicke, fleischige Zunge, und bloß warzige Kletterfüße. Sie fressen auch fleischige Früchte. Die Kakadus haben befiederte Wangen und eine große Federnhülle auf dem Kopf, die sie aufrichten und niederlegen können, z. B. *Ps. sulphureus*; sie leben in Asien. Die Aras haben nackte Wangen und einen langen zugespigten Schwanz; sie leben in Südamerika. Die eigentlichen Papageien oder Perroquets haben einen stumpfen, breiten Schwanz, und bald nackte, wie der graue P. (*Ps. erithacus*) mit rothem Schwanz aus Afrika; bald befiederte Wangen, wie der grüne P. (*Ps. ochrocephalus*) mit blauer Stirn, gelbem Gesicht und rothem Fleck am Flügel und Schwanz; aus Brasilien.

Vierte Familie. Tauben, Columbinae.

§. 44. Kleine, vorn hornige, hinten häutige Schnäbel mit länglicher Nasenöffnung, die von einer bauchig aufgetriebenen Schuppe bedeckt ist. Kleine, kurze Gangfüße mit kleinen abgestuften Nägeln. Bauen auf Bäumen ein kunstloses Nest und füttern ihre Jungen. Fressen Körner.

Die Gattung der Tauben (*Columba*) ist über die ganze Erde verbreitet, besonders aber in den wärmeren Klimaten zu Hause. Bei uns giebt es drei Arten: die große Ringeltaube (*C. palumbus*), blaugrau, mit röthlicher Brust und weißem Fleck an beiden Seiten des Nackens. Die Holztaube (*C. oenas*), Größe der Haustaube, oben blaugrau, Bauch weiß, Brust röthlich, Nacken broncefarben. Die Turteltaube (*C. turtur*), fleischfarben, Scheitel und Hinterrücken grau, Schwungfedern braun, Deckfedern in der Mitte schwärzlich, im Nacken ein schwarz und weißer Halbring. Leben in Gebüsch und nisten auf Bäumen. Die Haustaube stammt von einer Art (*C. livia*), die noch wild in Süd-Europa und Nord-Afrika vorkommt: sie ist bleigrau, auf den Flügeln mit zwei schwarzen Binden und schwarzen Schwungfedern. Kropf-, Pfauen- und Tümmeler-Tauben sind Ausartungen ursprünglich verschiedener, offindischer Arten.

Fünfte Familie. Hühner, Gallinaceae.

§. 45. Schnabel kleiner, dicker, übergebogen, bloß hornig. Nasenlöcher versteckt. Füße der Vorigen, aber stärker, besonders länger im Lauf, mit dickeren, stärkeren Krallen. Nisten fast immer auf der Erde und füttern ihre Jungen nicht. Fressen Körner.

Der Auerhahn (*Tetrao urogallus*) hat einen nackten, warzigen Streif über dem Auge, befiederte Läufe, aber keinen Sporn; Größe der Gans, Farbe schwarzblau, Deckfedern der Flügel braun; Weibchen röthlichbraun, am Bauch graulich, überall schwarz gefleckt. In Gebirgswaldungen. Der Wirtshahn (*T. tetrix*) ist kleiner, das Männchen schwarz mit weißem Bauch, weißer Binde über die Flügel und gabeligem Schwanz; das Weibchen heller rostroth mit gelblichen Federrändern und tief ausgebuchtetem Schwanz. Auch in Deutschland.

Das Rebhuhn (*Perdix cinerea*) hat einen überall befiederten Kopf, aber nackte Läufe; erste Schwungfeder kürzer. Seine Farbe ist graubraun, auf dem Rücken gesprenkelt, Kehle des Männchens rostgelb, der Bauch braun. Gemein in Deutschland. Die Wachstel (*P. coturnix*) ist kleiner, heller graugelb, mit dunklerem, hell geflecktem Rücken. Erste Schwungfeder den übrigen gleich. Häufig im Sommer auf Kornfeldern.

Das Perlhuhn (*Numida meleagris*), Kopf nackt, mit helmartigem Aufsatz, Hautlappen am Unterkiefer. Farbe hellgrau, mit weißen, schwarz gesäumten Punkten in Reihen. Männchen ohne Sporn. Nord-Afrika.

Die Hühnergattung (*Gallus*) hat einen nackten Hautkamm auf dem Kopf, Hautlappen an der Kehle und die Männchen sind

bespornt, Schwanz aufrecht. Das *Haushuhn* stammt von einer Art (*G. Bankiva*), die sich noch in Ostindien wild findet, wie die kastanienbraunen mit goldgelben Halsfedern versehenen Hähne, und wie die graubraune mit schwärzlichen Querzeichnungen und gelberänderten Halsfedern versehene Henne gezeichnet ist.

Die *Fasane* (*Phasiani*) haben nur einen nackten Ring ums Auge, einen langen spizen Schwanz, und das Männchen hat kurze Sporen. Der gemeine F. (*Ph. colchicus*), rostfarben mit schwärzlichen Quersflecken, Kopf metallisch grün; Henne grau, braun gefleckt. Stammt aus dem westlichen Asien.

Der *Pfau* (*Pavo cristatus*) hat nur nackte Wangen und einen Federnbusch auf dem Kopf. Kopf und Hals metallisch grün, die Bürgelfedern beim Männchen sehr groß, bronzefarbig, jede am Ende mit einem Augenfleck. Wild in Ostindien.

Der *Truthahn* (*Meleagris gallopavo*) oder *Puter* hat einen nackten mit vielen Warzen und einem Zipfel auf der Stirn versehenen Kopf und Vorderhals, so wie einen radförmig aufrichtbaren Schwanz. Gefieder braun, jede Feder vor dem Ende mit schwarzem Querstrich. Männchen mit einem Haarbüschel an der Brust. Stammt aus Nordamerika.

Sechste Familie. Laufvögel, *Currentes*.

§. 46. Keine zum Fliegen taugliche Flügel, Hals verlängert; Schnabel flach, so lang als der Kopf; Beine sehr lang, besonders die Läufe, höchstens 3 Zehen. Brustbein ohne Kamm; Becken vorn geschlossen. Jungen werden nicht gefüttert. Diese Vögel, laufen schnell und schlagen dabei mit den Flügeln. Dahin:

Der *Kassuar* (*Casuarus galeatus*), mit nacktem Kopf und einem hornigen Helm auf dem Scheitel. Füße dreizehig. Schwarz, Kopf und Oberhals blan und roth, nackt. Auf Sumatra, Java.

Der amerikanische Strauß oder *Randu* (*Rhea americana*) ist grau, Männchen mit schwarzem Streif an der Brust. Kopf, Hals und Schenkel befiedert. Füße dreizehig. Südamerika.

Der eigentliche Strauß (*Struthio camelus*) hat nackten Kopf, Hals und Schnabel; Gefieder schwarz, einzelne Flügel- und Schwanzfedern weiß. 3 wei Zehen. Afrika. Eier wie ein Kinderkopf, von mehreren Weibchen in ein Nest gelegt, worauf sie abwechselnd brüten.

Siebente Familie. Sumpfvögel, *Grallae*.

§. 47. Lange Beine, mit halb befiedertem Schienbein und meistens freien Zehen. Hals ebenfalls lang, der Länge der Beine entsprechend; Schnabel bald kürzer, dicker, bald län-

ger und dünner. Leben in der Nähe des Wassers und fressen vorzugsweise thierische Nahrung. Füttern die Jungen nicht.

I. Zügelgegend ganz oder in der Mitte nackt.

A. Mit ganzen Schwimmhäuten und lamellirten Schnabelrändern.

Der Flamingo (*Phoenicopterus ruber*) hat einen breiten, kurzen, winkelförmig abwärts gebogenen Schnabel, den längsten Hals und die längsten Beine. Zehen kurz, die drei vordern durch Schwimmhaut verbunden. Gefieder feuer- oder bläuroth, Schwungfedern schwarz. Süd-Europa. Nord-Afrika.

B. Keine ganzen Schwimmhäute und ohne Lamellen am Schnabel.

a. Nasenlöcher hinten am Schnabelgrunde.

a. Lauf warzig. Krallen kurz, dick, der mittlere am Innenrande nicht gekerbt. Störche.

Der Löffelreier (*Platalea leucorodia*) hat die Gestalt des Reiher, aber einen nach dem Ende zu breit gedrückten, löffelförmig erweiterten Schnabel, nackte Augenringe, und nackte Kehle. Am Grunde der vorderen Zehen eine breite Hautfalte. Gefieder weiß, Schnabel gelblich, am Rande, wie die Füße, schwarz. Lauert am Ufer auf Fische und Würmer. Süd-Europa.

Die Störche (*Ciconiae*) haben dicke, hohe, grade Schnäbel, längere Beine mit kurzen Zehen und stumpfen Krallen. Augenring, bisweilen sogar der ganze Kopf, nackt. Der weiße St. (*C. alba*) hat rothen Schnabel und Füße, einen schwarzen Strich um das Auge und schwarze Schwungfedern. Der schwarze St. (*C. nigra*) hat ein metallisch glänzendes Gefieder, weißen Bauch und rothen Schnabel und Füße. Beide fressen Amphibien, besonders Frösche.

Der heilige Ibis (*Ibis religiosa*) gehört auch hierher. Er hat einen langen, gebogenen Schnabel, einen nackten, schwarzen Kopf, ein weißes Gefieder mit schwarzen buschigen Wurzelfedern und nicht sehr lange, schwarze Beine. Körper wie ein Huhn. Lebt in Aegypten und ward von den alten Aegyptiern als göttlich verehrt. —

b. Lauf geschient, vorn mit Gürteln. Krallen lang, dünn, der mittlere am Innenrande gekerbt.

Die Reihergattung (*Ardea*) zeichnet sich aus durch einen langen, graden, spitzeren, feineren Schnabel, kürzere Läufe, aber längere, mit starken Krallen bewaffnete Zehen; Hinterzehe ganz auftretend. Zwei Arten sind bei uns besonders bekannt, der graue R. (*A. cinerea*), Rücken aschgrau, die längeren Federn des Hinterhauptes und Flecken am Vorderhalse schwarz. Lauert am Ufer auf Fische. Der Storchdommel (*A. stellaris*), gelb, überall mit schwarzbraunen Kreuzflecken. Scheitel und Fleck am Mundwinkel schwarz. Hals dick

befiedert. Lauert in Sümpfen und stößt von Zeit zu Zeit einen dumpfen Ton aus.

β. Nasenlöcher der Mitte des Schnabels genähert; Bügelgegend mit borstigen Federn zerstreut besetzt.

Der Kranich (*Grus cinerea*) hat einen kegelförmigen, ziemlich starken, hinter der Mitte etwas zusammengeschnürten Schnabel, langen Hals und lange, vierzehige Beine, deren Hinterzehe nur mit der Spitze den Boden berührt. Farbe aschgrau, Kopf schwärzlich, mit weißem Streif am Halse und nacktem, schieligem Hinterhaupt; Bügelfedern verlängert. Größer und höher als der Storch. Lebt schaa-renweis, wandert wie der Storch, frisst besonders Körner, aber auch Insekten und Würmer.

II. Bügelgegend ganz und dicht befiedert.

A. Hinterzehe klein oder fehlt ganz. Schnepfen.

a. Füße drei-zehig.

Die Trappe (*Otis tarda*) hat einen kurzen, ziemlich breiten Schnabel, einen dicken Hals und dreizehige Lauffüße. Gefieder auf dem Rücken gelbbraun mit schwarzen Querstreifen, im übrigen weiß-grau, Männchen mit Bartfedern am Mundwinkel. Frisst Körner. Größe der Gans und drüber.

b. Füße vier-zehig.

Der Kiebitz (*Vanellus cristatus*) hat einen kleinen Schnabel mit langer Nasengrube und vierzehige Füße, deren Hinterzehe sehr klein ist. Gefieder schwarz, erzfarben schillernd, im Nacken ein Schopf längerer Federn. Hinterhals, Brust, Bauch weiß. Beine roth. Auf sumpfigen Wiesen; frisst Insekten und Würmer.

Der Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*) hat einen langen, feinen, spizen, aufwärtsgebogenen Schnabel und Schwimmhäute zwischen den Vorderzehen. Gefieder weiß, Kopf, Nacken, ein Längsfleck auf jedem Flügel, Schwungfedern, Schnabel und Beine schwarz. Küsten der Nordländer.

Der Kampfhahn (*Tringa pugnax*) gehört zur großen Gattung der Strandläufer (*Tringa*), welche an dem graden, feinen, aber etwas stumpfen, nicht sehr langen, weichen, in der Mitte biegsamen Schnabel, und den langen vierzehigen Beinen kenntlich ist. Er unterscheidet sich durch sein buntes, bräunlichgraues, dunkler geflecktes Gefieder, und das Männchen besonders durch eine große Halskrause und viele kleine Warzen vor den Augen. Küsten der Ostsee.

Die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) hat einen sehr langen, starken, graden Schnabel, große nach hinten gerichtete Augen, kurzen Hals und kurze Beine. Gefieder braun, schwarz in die Quere gestreift, auf dem Rücken gefleckt; Größe einer kleinen Taube. Frisst Insekten und Würmer. Bei uns nur auf dem Zuge.

B. Hinterzehe sehr groß, ganz auftretend. Rohrhühner.

Den Sumpfvögeln nahe verwandt, obwohl mit der Fähigkeit des Schwimmens begabt, ist das Wasserhuhn (*Fulica atra*), kenntlich an dem kurzen, seitlich zusammengedrückten, spizen Schnabel, von welchem aus sich eine schwielige Haut auf die Stirn hin fortsetzt; an den kurzen Läufen, und den langen, jederseits mit mehreren abgerundeten, gefranzten Lappen versehenen Behen. Farbe schwarzgrau. Größe des Huhns. Schaarenweis auf Seen im Binnenlande.

Achte Familie. Schwimmvögel, Natatores.

§. 48. Durch kürzere breitere Schnäbel, einen kürzeren Hals und kürzere Beine, deren Behen durch Schwimmhäute verbunden, oder mit breiten, seitlichen Hautlappen versehen sind; unterscheiden sich diese Vögel von den vorigen. Sie lieben, wie jene, das Wasser, können alle gut schwimmen, die meisten auch tauchen, füttern ihre Jungen nicht, bauen kunstlose oder gar keine Nester und fressen theils thierische, theils pflanzliche Nahrung. —

I. Flügel vollkommen, mit wahren Schwingen.**A. Ganze Schwimmhäute zwischen den Behen.****a. Schnabelränder ohne Zähne und Lamellen.****α. Nur 3 Behen durch Schwimmhaut verbunden.**

Die Mövengattung (*Larus*) hat einen stark zusammengedrückten, hohen Schnabel, dessen Rinnwinkel am Unterkiefer merklich hervortritt, und meistens vierzehige Füße, die drei vorderen durch Schwimmhaut verbunden. Sie fressen Fische. Die *Lachmöve* (*L. ridibundus*) ist weiß, Rücken und Deckfedern der Flügel hellgrau, Kopf braun, Schnabel und Füße roth. Die Jungen grau gesprenkelt. Größe der Krähe.

Das *Albatros* (*Diomedea exulans*) mit großem, hakenförmigem Schnabel und röhrenförmig hervortretenden Nasenlöchern. Behen durch Schwimmhaut verbunden, die hintere fehlt. Gefieder weiß, Rücken und Flügeldecken schwarz gefleckt. Schnabel und Füße gelb. Größe des Schwans; Hals viel kürzer. Am Cap.

β. Alle 4 Behen durch Schwimmhaut verbunden.

Der Fregattvogel (*Tachypetes aquila*) hat einen schmäleren, starken, hakigen Schnabel, nackte Kehle und Augenrand, halbe Schwimmhäute zwischen allen vier Behen, befiederte Läufe, einen gabelförmigen Schwanz und sehr lange Schwungfedern. Gefieder schwarzbraun. Etwas größer als eine Ente, Flügel viel länger; fliegt anhaltend. Zwischen den Wendekreisen.

Der Seerabe (*Carbo cormoranus*) oder die Scharbe, hat

die Kennzeichen des Vorigen, aber kürzere Schwingen, einen abgerundeten Schwanz, nackte Läufe und ganze Schwimmhäute zwischen allen vier Zehen. Gefieder stahlblauschwarz, Kehle und ein Fleck an der Hüfte weiß. Nordische Küsten, im Winter auch an deutschen, frist besonders Aale.

Der Pelikan (*Pelecanus onocrotalus*), oder die Kropfgans, hat einen langen, breiten Schnabel, an dessen Unterkiefer ein weiter häutiger Sack hängt; Spitze mit einem Haken bewehrt. Alle vier Zehen durch ganze Schwimmhäute verbunden. Gefieder fleischroth, Schwingen schwarz. Küsten des Mittelmeeres.

b. Schnabelränder gezähnt, mit davon ausgehenden hornigen Blättern.

Die Gattung der Gänse (*Anser*) zeichnet sich aus durch einen am Grunde hohen, an der Spitze mit einer breiten Hornschuppe besetzten Schnabel; Füße vierzehig, die drei vorderen durch Schwimhaut verbunden. Die zahme Gans stammt von der, wie eine ganz graue zahme gefärbten, wilden Gans (*A. cinereus*), die überall in Deutschland auf Seen und an den Küsten angetroffen wird.

Die Schwäne (*Cygni*) haben einen längeren Hals, breitere, flache Schnäbel mit kleinerer Hornschuppe an der Spitze und nackte Zügel. Der stumme Sch. (*C. olor*) hat einen rothen, hinten schwarzen und mit einem Höcker versehenen Schnabel. Der Sing schwan (*C. musicus*) hat keinen Höcker und einen schwarzen, hinten gelben Schnabel. Gefieder bei beiden weiß, in der Jugend grau.

Die Entengattung (*Anas*) unterscheidet sich von den Schwänen, bei gleichem Bau des Schnabels und der Beine, durch kürzeren Hals und vollkommen befiederte Zügel. Fressen, wie Gänse und Schwäne, am liebsten Pflanzennahrung, aber auch Würm, Insekten, manche selbst kleine Fische. Die Haus-Ente findet sich wild überall in Deutschland (*A. boschas*); von den wilden haben die Männchen (Entliche) ganz die Größe und Farbe der zahmen mit bronzefarbenem Kopf, brauner Brust, grauem Rücken und weißlichem Bauch; die Weibchen dagegen sind wie die grau, braun und schwarz gesprenkelten mit erzfarbenem Spiegel gezeichneten zahmen Weibchen gefärbt.

B. Mit breitem Hautsaum an den Zehen.

Der Haubensteiſfuß (*Podiceps cristatus*) hat einen graden, spizen, etwas zusammengedrückten Schnabel, und vierzehige, mit flachen Nägeln am Ende bekleidete, gelappte, stark nach hinten gestellte Füße. Gefieder auf dem Rücken braungrau, Unterseite weiß, um den Kopf eine rostbraune, schwarzgesäumte Federkrause. Größe der Ente und drüber, Hals und Beine länger. Auf inländischen Gewässern. Fressen Insekten und Fische.

II. Flügel unvollkommen, mit kleinen schuppenförmigen Federn.

Der Pinguin (*Aptenodytes*) ist dadurch vor allen anderen Vögeln merkwürdig, daß seine Flügel nicht zum Fliegen taugen, sondern bloß zum Rudern im Wasser benutzt werden. Schnabel ziemlich grade, spitzig, etwas zusammengedrückt; Füße ganz hinten, vierzehig, mit kurzen breiten Läufen und ganzer Schwimmhaut zwischen den vorderen Zehen. Man kennt mehrere Arten dieser Gattung, die alle an der Südspitze der Kontinente vorkommen. Sie gehen aufrecht und schwimmen mit dem ganzen Leibe im Wasser. *A. patagonicus* ist der größte, wird 3' hoch, ist oben schwarz, unten weiß, am Halse mit einem gelben Längsstreif.

Dritte Klasse.

Amphibien, Amphibia.

§. 49. Rückgratthiere mit kaltem Blut, einer nackten oder von Schildern und Schuppen bedeckten Haut und wahren Füßen oder gar keinen Bewegungsorganen. Sie athmen meistens, wenigstens im Alter, durch Lungen.

Der Bau der Amphibien ist so verschieden, daß sich wenig Allgemeines darüber sagen läßt. Das Skelet betreffend, so fehlt allen fußlosen zugleich das Becken; einigen, wie den Fröschen, auch die Rippen. Die Schildkröten haben keine Zähne, die übrigen spitze, hakige Zähne, nicht bloß im Kiefer, sondern oft auch am Boden des Mundes (Gaumenzähne). Die Zahl der Zehen schwankt zwischen 2 und 5, doch ist die letztere Zahl vorherrschend; die im Wasser lebenden haben Schwimmhäute zwischen den Zehen. Den Fröschen fehlen die Nägel, den anderen kommen Krallenägel zu. — Die äußere Bedeckung ist bei den Schildkröten und Krokodilen aus Schildern gebildet, bei den übrigen Eidechsen und Schlangen finden sich Schilder nur auf dem Kopf, sonst Schuppen, besonders große, halbringsförmige am Bauch. Die Frösche, Molche und Salamander sind nackt und von Schleim bedeckt, welchen viele Hautdrüsen absondern.

Von den inneren Organen ist besonders das Athmungsorgan verschiedenartig gebildet. Bei den meisten (Schildkröten, Eidechsen, Schlangen) ist es eine Lunge, die aber bloß aus zweien großen, häutigen Säcken besteht, welche noch

dazu bei den Schlangen an Größe sehr ungleich sind. Die nackthäutigen Amphibien athmen in der Jugend, so lange sie im Wasser leben, alle durch Kiemen, die am Halse sitzen; einige behalten dieselben immer, andere, wie die Frösche, verlieren sie, wenn sie das Wasser verlassen. Demnächst ist das Gefäßsystem eigenthümlich. Das Herz hat eine halbgeschiedene Kammer und zwei Vorhöfe *), in welche das aus dem Körper und den Lungen zurückkehrende Blut gelangt und dann in die Kammer übergeht, von wo aus es wieder im Körper verbreitet wird. Die Verdauungsorgane zeigen keine bedeutenden Abweichungen, doch sind sie kleiner und besonders ist der Darm kürzer, als bei den Vögeln. Dies bezieht sich auf die Nahrung, welche bei allen, einige Schildkröten ausgenommen, thierisch ist. —

Die Amphibien pflanzen sich durch Eier fort, die theils auf dem Lande, theils im Wasser gelegt werden. Diese sind ohne Schale. Die Jungen ernähren sich selbst. Man kennt wohl nicht mehr als 900 Amphibien-Arten, von welchen $\frac{2}{3}$ zwischen den Wendekreisen zu Hause sind. Die meisten sind unschädliche, nur wenige, wie die Giftschlangen, gefährliche Thiere. Man theilt sie in folgende vier Gruppen:

I. Leib mit Schildern und Schuppen bedeckt.

a. Kiefer zahnlos. 1. Schildkröten.

b. Kiefer mit Zähnen.

Mit Augenlidern, Brustbein und vorn ver-
wachsenen Unterkieferbogen 2. Eidechsen.

Ohne Augenlider und Brustbein, Unterkie-
ferbogen vorn getrennt 3. Schlangen.

II. Leib nackt, mit schleimiger Haut. 4. Nackthäuter.

Erste Familie. Schildkröten, Testudinata.

§. 50. Das Skelet des Rumpfes ist äußerlich, d. h. die Rippen sind mit den Wirbeln, dem Brustbein, dem Becken und den auf oder zum Theil neben ihnen liegenden Hautknochen zu einem Panzer verwachsen, in welchem alle Eingeweide, ja selbst die großen Knochen der Beine stecken, und der äußerlich nur von hornigen Schildern bedeckt wird. Füße

*) Bei allen, auch bei den Fröschen. Siehe M. Weber's Zeit. zur Anatomie und Physiol. Bonn 1832. 8.

fünfzehig, stets vorhanden. Die Landschildkröten fressen besonders Kräuter, die Wasserschildkröten mehr Thiere.

Die Midas, oder Seeschildkröte (*Chelonia Midas*) hat einen breiten, ziemlich flachen Panzer, in welchen sich Kopf und Füße nicht zurückziehen können; Zehen der letzteren durch Schwimmhaut verbunden, flossenartig. Rückenschild mit 3 Reihen großer Hornplatten und kleineren am Umfange, jede Seitenreihe mit 4 Platten; Farbe braun und olivengrün gewellt; Fleisch grünlich. Atlantischer Ocean; wird über 2' lang.

Die europäische Sumpfschildkr. (*Emys europaea*) hat ebenfalls einen flachen Panzer, der am Rande nur wenig hervortritt und die Gliedmaßen nicht vollständig verdecken kann. Vorn 5, hinten 4 Zehen mit Nägeln, aber durch Schwimmhaut verbunden; Schwanz lang. Brustschild hinten ohne bewegliche Klappe. Farbe schwarz, überall gelb punktiert. In Waldsümpfen, hie und da in Deutschland, auch bei Berlin.

Die griechische oder Landschildkröte (*Testudo graeca*) hat einen hohen, stark gewölbten Panzer, unter welchem sich der Kopf und alle Glieder ganz verstecken können. Zehen bis auf die Nägel verwachsen, Brustschild hinten ohne bewegliche Platte. Größe einer tüchtigen Mannsf Faust, Farbe gelblich, jedes Schild in der Mitte braun. Süd-Europa und Küstenländer des Mittelmeeres, in Gebüschen.

Zweite Familie. Eidechsen, Sauria.

§ 51. Die meisten Eidechsen unterscheiden sich von den Schlangen, denen sie nahe verwandt sind, schon dadurch, daß sie Füße besitzen, die allen Schlangen, aber auch einigen Eidechsen, fehlen. Untrügliche Kennzeichen liefert die Bildung des Kopfes, indem theils der Oberkiefer fester am Schädel sitzt, theils die beiden Bogen des Unterkiefers vorn verwachsen sind. Die meisten Eidechsen haben Augenlider, die Schlangen nie. Die allermeisten Eidechsen besitzen ein Brustbein, die Schlangen nie. Die Eidechsen sind unschädliche Thiere, welche von Insekten und kleinen Thieren leben, niemals aber mit Giftdrüsen und Giftzähnen versehen sind.

A. Panzereidechsen, *S. loricata*.

Sie haben statt der Schuppen hornige, mit einem erhabenen Kiel versehene Schilder auf dem Rücken, und eine doppelte Reihe derselben auf dem Schwanz.

Die Gattung der Krokodile (*Crocodylus*) hat eine breite, mit der Kehle verwachsene Zunge, eingekielte Zähne, eine spaltenförmige Ohröffnung hinter dem Auge, und vorn mit fünf freien, hinten mit vier durch Schwimmhaut verbundenen Zehen versehene Füße, deren drei innere Zehen allein Nägel tragen. Der Leib ist oben von knöchernen, mit einer erhabenen Leiste versehenen, Schildern bedeckt. Der Nilkrokodil (*Cr. vulgaris*) hat einen Ausschnitt am Oberkiefer zur Aufnahme des vierten Unterkieferzahns, 4 Nacken- und 6 Halschilder. Farbe braun, Bauch gelblich. Gegen 20' lang. Im Nil. Der Kaiman oder Alligator (*Cr. lucius*) hat eine Grube im Oberkiefer, zur Aufnahme desselben Zahnes, halbe Schwimmhäute der Hinterfüße, und vier im Quadrat gestellte Halschilder. 14' lang. Nord-Amerika. Der Gavial (*Cr. gangeticus*) hat eine sehr lange, schnabelförmige, vorn erweiterte Schnauze. Findet sich im Ganges.

B. Schuppeneidechsen, *S. squamata*.

Sie haben Schuppen oder eine bloß warzige Haut.

Die gemeine Eidechse (*Lacerta agilis*) hat eine ziemlich lange, tief gespaltene Zunge, Schilder auf dem Kopf, einen Halbring breiterer Schuppen an der Kehle (Halsband), breitere, viereckige Schuppen am Bauch, eine Reihe von Drüsen am Innenrande der Hinterschinkel und ringförmig gestellte, gekielte Schuppen (Wirtelschuppen) auf der Oberflache des langen Schwanzes. Farbe des Rückens braun, mit Augenflecken; am Bauch gelblich oder grau, ungefleckt. Gemein in Gebüsch.

Bei dem Chamäleon (*Chamaeleon africanus*) ist die Zunge ein langer, drehrunder, fleischiger, vorn kolbiger breiter Fortsatz, und kann nach Belieben des Thieres ausgestreckt und zurückgezogen werden. Dies Thier hat große Augen, die von den Augenlidern so weit bedeckt sind, daß nur die Pupille frei bleibt; und auf dem Scheitel einen dreiseitigen, pyramidalen Fortsatz. Füße fünfzehig, zangenförmig, vorn mit zwei, hinten mit drei Zehen nach außen. Schwanz lang, wickelt. Leib ohne Schuppen, warzig. Farbe wechselt zwischen gelb, grünlich, bläulich und braun. Süd-Afrika.

Der fliegende Drache (*Draco volans*) hat eine kurze, dicke, runde Zunge; einen schmalen, vor beiden Seiten zusammengedrückten Leib, an welchem jederseits ein breiter Fallschirm, der von den hinteren Rippen unterstützt wird. Zehen und Schwanz lang, dünn. Er lebt auf Bäumen und flattert. Größe der gemeinen Eidechse. Java.

Der Leguan (*Iguana tuberculata*), ebenfalls mit seitlich zusammengedrücktem Körper, einem Kamm spitzer Hornfortsätze auf dem Rücken und einer hängenden Wamme an der Kehle; Zunge kurz, dick, abgerundet. An den Seiten des Halses höckerartige Schuppen. Farbe bläulich grau; über 2' lang. Lebt in Guyana und wird von den Eingebornen gegessen.

Die Stachelschwanz-eidechse oder Haddun (*Stellio vulgaris*) hat einen von oben nach unten zusammengedrückten Leib, kurzen Schwanz und kurze Zehen. Leib mit kleinen Schuppen auf dem Rücken, zwischen welchen größere pyramidale Schuppen stehen. Schwanz rund, von spitzigen Wirtelschuppen bekleidet. Ueber 1' lang; braun. Nord-Afrika. Lebt auf der Erde unter Steinen.

Der breitgehige Gecko (*Platydictylus fascicularis*) hat große Augen mit kleinen Augenlidern, einen rundlichen Körper mit kleinen Schuppen und ganz breit gedrückte, auf der Sohle mit Hautfalten versehene Zehen. Auf dem Rücken mehrere Reihen zu drei gestellter Schuppen, deren mittlere pyramidal gestaltet ist. Schwarz rund, ohne Franzen. Küstenländer des Mittelmeeres, klettert an Wänden in Häusern, um Fliegen zu fangen; soll eine laute Stimme haben (?)

Der Scheltopustil (*Pseudopus serpentinus*) hat keine Füße, eine tiefe Furche an beiden Seiten des Bauches, an deren Ende ein Fortsatz, der die Hinterbeine andeutet. Zunge klein, flach, nach vorn verengt. 3' lang, braun, Schuppen breit, unten glatt, oben gekielt, schief rautenförmig. Süd-Rußland.

Der Skink (*Scincus officinalis*), mit flacher, etwas hervor-
stehender Schnauze und 4 Füßen mit breiten, gefranzten Zehen zum Graben. Zunge klein, am Ende ausgeschnitten. Schuppen klein, flach, glatt. Farbe gelblich braun; Größe der gemeinen Eidechse, aber dicker und der Schwanz kürzer. Aegypten; ward als Heilmittel gebraucht.

Die Blindschleiche (*Anguis fragilis*), mit gleicher Zunge und Schuppenbildung, ohne Bauchringe (welche den Schlangen eigen sind) und ohne Füße, mit langem, schlangenförmigem Körper, aber deutlichen Augenlidern. Kupferfarben mit dunklerem Rückenstreif. Gemein bei uns in Gebüsch auf Wiesen.

C. Ringeleidechsen, *S. annulata*.

Sie haben schmale, ringelförmige Gürtel statt der Schuppen, die durch feine Rinnen in lauter viereckige Felder getheilt sind. —

Die Handeidechse (*Chirotes canaliculatus*) hat vierzehige Vorderfüße, keine hinteren, aber eine Seitenfurche am Bauch. Augen unter der Körperhaut, Leib geringelt, jeder Ring durch Querslinien in viereckige Felder getheilt. Farbe braun, Bauch weiß. Mexiko.

Die rußbraune Doppelschleiche (*Amphisbaena fuliginosa*) hat keine Füße und keine Furche, sonst die Bildung der Vorigen. Farbe bräunlich, weiß gefleckt. Lebt in Ameisenhaufen. Süd-Amerika.

Dritte Familie. Schlangen, Ophidia.

§. 52. Sie haben keine Gliedmaßen, einen langen drehbaren Leib, der auf dem Kopf mit Schildern, auf dem übrigen Leibe mit Schuppen, am Bauch meistens mit Halbringen bedeckt ist. Die beiden Hälften des Unterkiefers sind vorn nicht verwachsen, sondern nur durch ein sehniges Band verbunden; daher entsteht bei geschlossenem Maule an der Kehle eine Furche, Kinnfurche, die in der Regel an jeder Seite mit zwei großen Schildern (Ninnenschildern) begränzt ist. Durch die Anwesenheit dieser Furche oder deren Schilder, und durch den Mangel der Augenlider, unterscheiden sich die Schlangen sicher von den fußlosen Eidechsen. Die meisten Schlangen sind unschädlich, einige haben Giftzähne und Giftdrüsen. —

A. Mit großer, weiter Mundöffnung (Eurystoma).

a. Ohne Giftzähne, mit schmalem Kopf.

Die Riesenschlange (*Boa constrictor*) hat keine Giftzähne, einen nicht mit Schildern, sondern mit Schuppen bedeckten Kopf, keine Ninnenschilder, aber einen Sporn neben dem After. Farbe röthlich grau, mit einem Streif über den Kopf und einer gezackten Rückenbinde, auf welcher gelbe Flecken. Bis 30' lang. Brasilien.

Die Ringelnatter (*Coluber natrix*) hat Schilder auf dem Kopf und neben der Kinnfurche, und paarige Schilder unter dem Schwanz. Auf dem Rücken gekielte Schuppen. Farbe dunkel schwarzgrau, Bauchringe mit weißem Seitenfleck, auf dem Rücken schwarze Punkte, jederseits am Hinterhaupt ein heller Mondfleck. Gemein in Gebüschen, auf Wiesen.

b. Mit Giftzähnen und einem nach hinten breiten, dreiseitigen Kopf.

Die Klapperschlange (*Crotalus horridus*), mit breitem Kopf, und einer von kleinen Schildern eingefassten Grube am Zügel, zwischen Nasenloch und Augen; unter dem Schwanz unpaarige Halbringe. Im Maule am Oberkiefer mehrere gebogene, starke, durchbohrte Zähne (Giftzähne), aus welchen beim Biß das Gift hervorquillt; an der Schwanzspitze die Klapper. Farbe braun, mit dunkleren heller gesäumten Rückenflecken. Süd-Amerika.

Die gemeine Viper (*Vipera berus*) hat Schuppen auf dem Kopf und vorn einige Schilder, eine längliche, senkrechte Pupille und paarige Schilder unter dem Schwanz. Farbe braun, auf dem Rücken mit doppelter, schwarzer Zickzackbinde. In Gebüschen, besonders des mittleren Deutschlands. Gebiert lebendige Jungen. 2' lang.

Die Brillenschlange (*Naja tripudians*) hat einen kleinen mit Schildern bedeckten Kopf, eine runde Pupille, und eine breite, flache, runde Erweiterung des Halses, auf welcher die Zeichnung einer Brille steht. Farbe gelbbraun, 3—4' lang. Ostindien.

Die Wasserschlange (*Pelamys bicolor*) hat Schilder auf dem Kopf, aber keine Halbringe am Bauch; Schwanz seitlich zusammengedrückt, abgerundet, wie eine Flosse. Farbe oben braun, am Bauch weiß. Lebt in der Südsee, ist 1½' lang, und wird z. B. auf Otaheite gegessen.

B. Mit kleiner Mundöffnung (*Stenostoma*) und kleinem Kopf, der nicht breiter ist, als der Hals. Immer ohne Giftzähne. Kinnsfurche und Rinnenschilder kleiner, undeutlicher.

Das Blödauge (*Typhlops lumbricalis*) hat eine stumpfe Schnauze, schwache, durch die Haut scheinende Augen, keine Halbringe am Bauch, und einen kurzen abgestuften Schwanz. Größe der Blindschleiche, bräunlich. Süd-Amerika.

Die Korallen-Natter (*Ilysia scytale*) hat vorn am Kopf breite Schilder und größere Schuppen am Bauch; Farbe korallroth mit schwarzen Binden. Größe wie Blindschleiche. Süd-Amerika.

Vierte Familie. Froschamphibien, *Batrachia*.

§ 53. Sie haben eine nackte von Schleim bedeckte Haut, deren Schleim von vielen Hautdrüsen abgesondert wird. Ihre Eier sind ohne Schale und werden ins Wasser gelegt, wo auch die Jungen die erste Zeit ihres Lebens wohnen. So lange athmen sie durch Kiemen, hernach meistens durch Lungen; in der Jugend haben sie keine Füße, aber einen breiten Fischschwanz.

A. Ungeschwänzte Froschamphibien (*B. anura*). Sie haben im Alter keinen Schwanz, und vorn 4, hinten 5 Zehen. Die Jungen sind die kurzen, dicken, mit einem breiten Schwanz versehenen Kaulquappen; sie bekommen die Hinterfüße zuerst. Fast alle haben eine laute Stimme.

Der Gartenfrosch (*Rana temporaria*) hat einen glatten Leib, keine Ohrdrüsen, spitze Zehen mit Schwimmhäuten zwischen den hinteren. Farbe braun, am Bauch gelblich. Gemein.

Der Laubfrosch (*Hyla arborea*) hat die Bildung des Vorigen, aber scheibenförmig erweiterte Zehenspitzen. Farbe grasgrün, Bauch weiß.

Die Kröte (*Bufo cinereus*) hat eine warzige Haut, große Ohr-

drüsen und halbe Schwimmhäute zwischen den Hinterzehen. Farbe graubraun. Hat keine laute Stimme.

Die Pipafröte (*Pipa verrucosa*) hat einen flachen, dreiseitigen Kopf, und Vorderzehen, die in 4 Spitzen auslaufen; hintere mit ganzer Schwimmhaut. Das Weibchen trägt die Zungen auf dem Rücken. Surinam.

B. Geschwänzte Froschamphibien. (*B. urodela*). Sie haben auch im Alter einen langen Schwanz. Die Jungen bekommen zuerst die Vorderfüße. Manche leben beständig im Wasser und behalten die Kiemen zeitlebens.

Der Feuer-Salamander (*Salamandra maculata*) hat Ohrdrüsen und einen runden Schwanz. Farbe schwarz, gelb gefleckt. Größe der gemeinen Eidechse. In Gebirgsthälern häufig.

Der Kamm-Molch (*Triton cristatus*) hat keine Ohrdrüsen und einen zusammengedrückten Schwanz. Farbe grauschwarz, am Bauch orange; Männchen mit hohem, gezähntem Kamm auf dem Rücken. In Teichen und auf feuchten Wiesen.

Der Dlm (*Proteus anguinus*) hat keine Augen, beständig bleibende Kiemen am Halse, und vorn 3, hinten 2 Beine. Farbe hellröthlich. Lebt in unterirdischen Gewässern, besonders in der Adelsberger Grotte in Krain.

C. Die schlangenartigen Froschamphibien (*B. anguinea*) haben keine Füße.

Die Blindwühle (*Caecilia lumbricoides*) wird gegen 2' lang, fingersdick, hat ein unter der Haut verstecktes Auge, und nur in der Jugend Kiemen. Farbe rußbraun. Lebt in Sümpfen Amerikas. —

Vierte Klasse.

Fische, Pisces.

§ 54. Sie athmen durch Kiemen, haben einen nackten oder von Schuppen und Schildern bedeckten Leib, und keine oder flossenförmige Gliedmaßen.

Der Leib der Fische hat eine bald von oben nach unten (Rochen), bald von beiden Seiten (Karpfen) zusammengedrückte, bald runde (Aal) Form. Der Kopf ist verhältnißmäßig groß und unmittelbar mit dem Rumpf verwachsen, so daß der Hals fehlt. Der Oberkiefer ist beweglich und meistens, wie der Unterkiefer und Gaumen, mit spitzen Zähnen bewachsen. Die Nasenlöcher sind bloße Gruben. Die Augen haben keine Augenlider. Die Kiemen liegen am hinteren Theile des

Kopfes, bestehen bei den Einen aus kammförmig aneinander gereiheten Blättchen, bei den Andern aus Büscheln von Fäden, die an dem Kiemenbogen feststehen, noch andere haben zugleich an der äußern Haut festgewachsene Kiemen. Bei jenen werden die Kiemen von einem großen, knöchernen, aus 4 Stücken bestehenden Kiemendeckel verdeckt; bei diesen bildet die äußere Haut die Decke, und zwischen den einzelnen Kiemen sind Spalten, die in die Kiemenhöhle führen. Die Fische athmen nun auf die Art, daß sie das Wasser verschlucken, und bei geschlossenem Munde aus den zwischen den Kiemen befindlichen weiten Oeffnungen, wobei zugleich der Kiemendeckel geöffnet wird, hervortreiben. Das Herz liegt hinten und unten zwischen den Kiemen, fast an der Kehle, und besteht aus einer Kammer und einem Vorhof, in welchen alles Blut, das aus dem Körper zurückkommt, sich ergießt, dann in die Kammer fließt, von dieser in die Kiemen getrieben wird, aus welchen es in ein großes über den Kiemen gelegenes Gefäß, die Aorta, gelangt, welche das Blut in alle Theile des Körpers leitet. Die Fische haben also nur einen Kreislauf, die warmblütigen Rückgrathiere zwei, indem bei ihnen das Blut aus dem Respirationsorgan wieder ins Herz zurückkehrt.

Die Flossen der Fische bestehen aus vielen theils einfachen stacheligen (Stachelflossen), theils am Ende gespaltenen und gegliederten (Weichflossen) Strahlen, zwischen welchen eine weiche Haut ausgespannt ist; die unteren Enden der Strahlen sind an im Körper versteckten Knochen befestigt, die durch Muskeln bewegt werden und dadurch die Flosse in Bewegung setzen. Einige Flossen sitzen an der Rücken- und Bauchseite des Leibes (unpaare Flossen), die anderen doppelten Flossen (paarige Fl.) sitzen neben dem Kopf und am Bauch. Sie entsprechen den Gliedmaßen der früher betrachteten Thiere.

Im Innern vieler Fische bemerkt man eine längliche, bisweilen zweitheilige, Blase voll Luft (Schwimmbase), welche das Steigen und Fallen der Fische im Wasser bewirkt. Der Darm der Fische ist kurz, die Leber groß. Die Eiersäcke der Weibchen (Rogen) enthalten sehr viele Eier (oft ge-

gen 30,000), und münden neben dem After, der am Ende der Bauchhöhle befindlich ist.

Die Fische leben nur im Wasser und sterben, wenn sie längere Zeit außerhalb des Wassers gehalten werden. Sie fressen fast allein thierische Nahrung, die sie ungekaut verschlucken. Man theilt sie in folgende Familien:

I. Fische mit querer Mundöffnung (Plagiostomi)

- | | |
|--|------------------------|
| A. Mit knorpeligem Skelet. | 1. Fam. Knorpelfische. |
| B. Mit knöchernem Skelet (Ostacanthi). | |
| a. Oberkiefer mit dem Zwischentkiefer verwachsen. | 2. — Haistkiefer. |
| b. Oberkiefer für sich beweglich. | |
| * Kiemen büschelförmig. | 3. — Quastentiemer. |
| ** Kiemen kammförmig. | |
| Mit gegliederten zerschlossenen Strahlen aller Flossen. | 4. — Weichflosser. |
| Mit stacheligen Strahlen der Rücken- oder aller Flossen. | 5. — Stachelflosser |
| II. Fische mit rundem Maul zum Saugen. | 6. — Rundmäuler. |

Erste Familie. Knorpelfische. Chondracanthi.

§. 55. Sie haben ein weiches, knorpeliges Skelet, und eine nackte, oder von kleineren oder größeren einzeln stehenden Knochenschildern theilweis bedeckte Haut. Maulöffnung auf der unteren Seite des Kopfes, hinter der hervorragenden Schnauze. Brust- und Bauchflossen fehlen nie. Hierher:

Die Haifischgattung (*Squalus*), ausgezeichnet durch einen rundlichen Leib; einen dicken, runden Schwanz; fünf Kiemenlöcher an beiden Seiten des Halses, und große dreieckige Zähne reihenweis in jedem Kiefer. Der Menschenfresser (*Sq. carcharias*) wird gegen 25' lang, hat 2 Rückenflossen, eine raue nicht von Schildern bedeckte Haut und eine grauliche Farbe. Lebt in allen Meeren. Der Sägesfisch (*Sq. pristis*) hat einen langen, Schwerdtförmigen Fortsatz an der Schnauze, der jederseits mit starken Zähnen besetzt ist. 15' lang. Mittelmeer. Der Hammerfisch (*Sq. Zygaena*) hat einen nach beiden Seiten in einen Fortsatz, an welchem die Augen sitzen, ausgehenden Kopf; er wird gegen 12' lang und lebt im Mittelmeere.

Die Rochengattung (*Raja*) hat einen flachen, scheibenförmigen Leib, mit welchem die großen, flügelartigen Brustflossen verwachsen sind; der Schwanz ist lang, dünn, meist ohne Flossen.

Fünf Kiemenlöcher an der untern Seite hinter und neben dem Maule, auf der oberen die Augen. Die gemeine Roche (*R. batis*) viereckig, rhombisch, mit langem, dünnem Schwanz ohne Flossen, 2' breit, 1½' lang. Nordsee, wird gegessen. Die Bitterroche (*R. torpedo*) hat einen runden, kreisförmigen Leib, einen dickeren, kürzeren Schwanz mit Flossen. Farbe rothbraun, oben mit Augenflecken. Mittelmeer, äußert Elektrizität.

Die Störgattung (*Acipenser*) hat einen runden Leib, eine spitze Schnauze, freie kleinere Flossen, keine Zähne im Maul, und einen großen Kiemendeckel mit freien Kiemen. — Der Stör (*A. sturio*) hat fünf Reihen großer, flacher Knochenschuppen, und kleinere dazwischen auf dem Rücken. 12—16' lang. Nord- und Ostsee, geht von da in die großen Flüsse. Der Hausen (*A. huso*) hat auf dem Rücken viele kleine sternförmige Knochenschilder zwischen den großen. In der Wolga, Don, schwarzem Meere. Aus der Schwimmblase verfertigt man die Hausenblase, der Roggen ist Kaviar.

Zweite Familie. Haftkieser, Pectognathi.

§ 56. Ihr Skelet ist knöchern, und der Oberkieser unbeweglich mit dem Zwischenkieser verwachsen; der von Schmelz bekleidete Rand bildet, so wie am Unterkieser, die Zähne, deren Zahl nicht bedeutend. Leib kurz, nackt, oder mit Stacheln oder Schildern bedeckt. Bauchflossen fehlen. Kiemendeckel zum Theil an der Körperhaut festgewachsen, daher nur eine kleine, längliche Kiemenöffnung vor der Brustflosse. Besonders in südlchen Gewässern.

Der Klump oder Moudfisch, schwimmende Kopf (*Orthorogoriscus mola*), Kieferrand bildet in jedem Kiefer einen einzigen Zahn, der von den fleischigen Lippen nicht bedeckt wird. Leib schuppenlos, hoch, scheibenförmig, ohne Schwanz, mit hoher Rücken- und Aftersflosse. Mittelmeer. Gegen 3' lang, 2' hoch.

Der Kofferfisch (*Ostracion cornutus*) hat mehrere kegelförmige, zahnartige Fortsätze am Rande jedes Kiefers, und einen von großen, sechseckigen Schildern dicht bedeckten, dreieckigen Leib, der an der Stirn und hinter dem After mit 2 Stacheln bewehrt ist; kaum ¾' lang, röthlichbraun. Indischer Ocean.

Dritte Familie. Quastenthiemer, Lophobranchiali.

§ 57. Skelet knöchern, Leib von Schildern dicht bedeckt, kantig. Kiemenöffnung groß, Kiemendeckel frei, Kiemen in

Muscheln am Kiemenbogen; Kopf schnabelförmig verlängert. Leben nur im Meere.

Die Meernadel (*Syngnathus acus*) hat einen langen, dünnen, nach hinten verjüngten, fünfeckigen Leib, sehr kleine Brustflossen, aber keine Bauchflossen, und eine rundliche Schwanzflosse; bräunlich; $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ lang. Ostsee.

Das Seepferdchen (*Hippocampus brevisrostris*) hat einen kürzeren, dickeren, S-förmig gebogenen Leib, Brust- und Bauchflossen, aber keine Schwanzflossen. 3'' lang. Mittelmeer.

Der Drachenfisch (*Pegasus draco*) hat einen würfelförmigen Leib, große sächerförmige Brustflossen, keine Bauchflossen, und einen kurzen, kegelförmigen Schwanz mit einer Rücken- und Endflosse. Indischer Ocean.

Vierte Familie. Weichflosser, Malacopterygii.

§. 58. Sie haben die vollkommenste Fischgestalt, ein knöchernes Skelet, großen, freien Kiemendeckel, kaminförmige Kiemen, und weiche, gegliederte, am Ende zerschliffene Strahlen. Nach der Stellung und dem Mangel der Bauchflossen lassen sie sich wieder einteilen:

A. Bauchflossen am Ende des Bauches neben dem After. Bauchflosser, M. abdominales. Hierher gehören:

Die Welsgattung (*Silurus*), ausgezeichnet durch eine nackte oder von großen Schildern bedeckte Haut und Bartfäden am Munde. Leben meist in Flüssen. Der gemeine Wels (*S. glanis*) hat eine kleine Rücken-, aber sehr große Afterflosse, nackte Haut, und 2 lange Bartfäden am Ober-, 4 kurze am Unterkiefer. In Flüssen häufig, wird 10' lang. Der elektrische Wels (*S. electricus*) hat keine Rückenflosse, aber eine häutige Fettflosse auf der Kante des Schwanzes. 4 Bartfäden. Im Nil, gibt elektrische Schläge.

Die Karpfengattung (*Cyprinus*) hat eine Rückenflosse über dem After, ziemlich große Schuppen, meistens Bartfäden und keine Zähne. Der gemeine Karpfen (*C. carpio*) hat 4 Bartfäden und eine große Rückenflosse, deren zweiter und dritter Strahl ein einfacher, gezählter Stachel ist. Farbe braun, Bauch gelblich. In Flüssen. In unsern Flüssen leben gegen 20 Arten dieser Gattung.

Die Hechtgattung (*Esox*) hat eine kleine Rückenflosse, die hinten auf der Schwanzkante über der Afterflosse steht, einen länglichen, mehr rundlichen Körper und viele spitze Zähne. Der gemeine Hecht (*E. lucius*) hat einen breitgedrückten, abgerundeten Kopf und einige große Zähne im Unterkiefer. Farbe grüngrau,

gelb gefleckt, Bauch weißlich; bisweilen gegen 4' lang, in der Regel nur 2'; der gefräßigste Flußfisch.

Die Heringsgattung (*Clupea*) hat ebenfalls nur eine kleine Rückenflosse, die über den Bauchflossen steht; große Schuppen, die sehr leicht abgehen, eine aus sägesförmigen Schuppen gebildete Bauchfalte, und einen breiten, stark nach unten gezogenen Oberkiefer, über welchen der Unterkiefer hinausragt. Der gemeine Hering (*Cl. harengus*) hat einen schmalen, stark zusammengedrückten Leib, der am Bauch mit hervorragenden, großen Schuppen besetzt ist. Wird 1' lang, ist silberfarben mit blaugrünem Rücken. Eismeer, kommt gegen den Herbst an deutsche Küsten; ist äußerst zahlreich.

Die Lachs-gattung (*Salmo*) hat die Form und den Bau der Heringe, unterscheidet sich aber durch eine kleine, strahlenlose Fettflosse auf der Gärte des Schwanzes. Der Hakenlachs (*S. salar*) wird 3—4' lang, ist silberfarben, mit bläulichem Rücken und einzelnen schwarzen Flecken. Er lebt im Meere, geht aber zur Laichzeit (Frühling) in die Flüsse, besonders Rhein und Elbe.

B. Bauchflossen vor den Brustflossen, bei manchen an der Kehle. Kehlflösser, *M. jugulares*. Dahin:

Die Dorsch-gattung (*Gadus*) hat kleine, längliche Brustflossen und noch kleinere Bauchflossen; 2 bis 3 gleiche, kleinere, oder eine große Rückenflosse und einen langgestreckten, mehr runden Körper. Der gemeine Dorsch (*G. callarias*) hat 3 Rückenflossen, wovon die mittlere die größte, und zwei Aftersflossen. Leib bräunlich, mit dunkleren Punkten. Kopf zugespitzt mit Bartfäden am Unterkiefer. Der Schellfisch, getrocknet Stockfisch, gesalzen und getrocknet Klippfisch (*G. aeglefinus*), hat auch drei Rückenflossen, aber die erste kleinste steht der zweiten sehr nahe. Kopf stumpfer. Bartfäden kurz. Leib einfarbig gelbbraun. Nordsee. Die Walquappe (*G. lota*) hat eine kleine und eine sehr große Rückenflosse, einen stumpfen Kopf, länglichen Leib, der braun marmorirt ist. In Flüssen und Landseen.

Die Schollengattung (*Pleuronectes*) zeichnet sich dadurch vor allen Rückgratthieren aus, daß ihr Leib unsymmetrisch ist. Es stehen nehmlich beide Augen auf der einen Seite, und das Maul ist schief von oben nach unten gezogen. Die Schollen haben die Bauchflossen unmittelbar an der Kehle, dicht neben einander, kleine Brustflossen und eine, den ganzen Rücken einnehmende, Rückenflosse. Aftersflosse an der ganzen Unterseite des Schwanzes. Sie leben nur im Meere, liegen meistens auf dem Grunde und schwimmen schief. Die eigentliche Sch. oder Steinbutte (*P. platessa*) hat die Augen an der rechten Seite, einen fast runden Leib mit harten Stacheln und röthlichen Flecken. 1' lang. Ober-

seite braun, Bauchseite weiß; so bei allen. Die Flunder (*P. flossus*), länglicher, kürzer, fast glatt, mit Stachelschuppen neben der Seitenlinie. Nord- und Ostsee.

Der Schiffshalter (*Echeneis remora*) hat einen länglichen, symmetrischen Leib, sehr kleine Schuppen in der dicken Haut, und auf dem Kopf eine große, in Felder getheilte Saugscheibe, mit welcher er sich festsaugen kann. $1\frac{1}{2}$ ' lang, bräunlich. Im atlantischen Ocean.

C. Bauchflossen fehlen, Leib lang, dünn, rundlich. Kahlbäuche; *M. apodes*. Dahin:

Die Aalgattung (*Muraena*), mit einem spitzen Kopf, vielen kleinen Zähnen in jedem Kiefer, und einer kleinen Kiemenpalte vor den Brustflossen. Der gemeine Aal (*M. anguilla*) hat eine große Rückenflosse, die mit der Schwanzflosse und durch diese mit der Aterflosse zusammenhängt; Bauch silberweiß, Rücken schwarzgrau. Der Bitteraal (*Gymnotus electricus*) hat einen rundlichen Kopf und keine Rückenflosse. In Flüssen und Seen Süd-Amerika's. Bräunlich. 3' lang.

Fünfte Familie. Stachelflosser, *Acanthopterygii*.

§ 59. Sie haben ganz die Gestalt und Bildung der Vorigen, aber die Strahlen der Rücken- und Aterflosse, bisweilen nur die vorderen, bestehen aus einfachen ungegliederten Stacheln. Die Bauchflossen stehen meistens in der Nähe der Brustflossen, theils dicht dahinter, fast darunter (Brustflosser, *A. thoracici*), theils davor, mehr nach der Kehle zu (Kehlflosser, *A. jugulares*). Diese Gruppe ist die zahlreichste von allen Fischfamilien, sie enthält:

Die Gruppe der Thunfische (*Scomberoides*), ausgezeichnet durch einen mit sehr kleinen Schuppen bedeckten, oft scheidenförmigen flachen, oder cylindrischen Leib. Eine große oder 2 kleinere Rückenflossen, meistens vorn mit sehr langen Strahlen, die hinteren Strahlen oft frei, ohne Haut. Der eigentliche Th. (*Scomber thynnus*) hat zwei genäherte Rückenflossen, die hintere in viele freie Strahlen aufgelöst, und an den Seiten des Schwanzes ein Hornblättchen. Er wird gegen 12' lang, ist stahlblau gefärbt und lebt im Mittelmeer. Die Makrele (*Sc. scomber*) wird kaum 2' lang, hat zwei fern stehende Rückenflossen und sonst die Kennzeichen des Vorigen. Nordsee. — Der Schwerdtfisch (*Xiphias gladius*) unterscheidet sich auffallend durch den schwerdtförmig verlängerten Oberkiefer und den Mangel der Bauchflossen. Er wird gegen 5'

lang, hat nur eine, große, vorn hohe Rückenflosse, und einen runden Leib. Farbe weißgrau, Rücken dunkler. Ostsee, Nordsee, Mittelmeer.

Die Gattung der Klippfische (*Chaetodon*), mit rundlichem, dünnem Leib, dessen eine große und oft hohe Rückenflosse am Grunde mit Schuppen besetzt ist; z. B. *Ch. faber* wird 1' lang, ist silberglänzend bis bleigrau, mit blauen Querbinden. Atlantischer Ocean. Auch die übrigen Arten dieser Gruppe leben nur in der See, besonders zwischen den Wendekreisen.

Die Gruppe der Barsche (*Percoides*) hat einen am Rande mit Zähnen und Stacheln versehenen Kiemendeckel, viele kleine Zähne im Munde und große Schuppen. Meistens 2 Rückenflossen, von denen nur die vordere stachelig ist. — Der gemeine B. oder Flußbarsch (*Perca fluviatilis*) wird bis 1' lang, ist grünlich auf dem Rücken mit schwärzlichen Querbinden, am Bauch weiß; Flossen roth, doch nicht die beiden des Rückens, welche gerade sich berühren. Der Sander (*P. lucioperca*) hat einzelne, größere Zähne, einen länglicheren Leib, und die beiden Rückenflossen entfernter. Farbe grau, auf dem Rücken schwärzlich. Der Kaulbarsch (*P. cernua*) ist kaum $\frac{1}{2}$ ' lang, gelbbraun, dunkel punktiert. Rückenflossen verwachsen. Alle 3 in unsern Gewässern.

Das Petermännchen (*Trachinus draco*) hat eine kleine vordere Rückenflosse, einen starken Stachel am Kiemendeckel, und ein aufwärts gezogenes Maul; Leib länglich, röthlichgrau, schwarz gefleckt, kaum 1' lang. An europäischen Küsten. — Der Sternseher (*Uranoscopus scaber*) hat einen dicken Kopf, dessen Augen auf dem Scheitel stehen; Mundöffnung nach oben gerichtet. 1' lang, bräunlich. Mittelmeer.

Der Stichling (*Gasterosteus pungitius*) hat freie Stacheln vor der Rückenflosse und eben solche statt der Bauchflosse. Leib klein, nackt, mit seitlichen großen Schildern. In Bächen, gemein, $1\frac{1}{2}$ " lang.

Die Kalmutter (*Blennius viviparus*) hat sehr kleine Bauchflossen an der Kehle, eine große Rücken- und Aftersflosse, die mit der spizen Schwanzflosse zusammenhängt. Schuppen klein, in der Haut. Farbe bräunlich, mit dunkleren Flecken. Nord- und Ostsee. Gebiert lebendige Jungen.

Sechste Familie. Rundmäuler, Cyclostomi.

§ 60. Sie haben ein rundes, zum Saugen eingerichtetes Maul, das an dem breiten, abgestuften, meist trichterförmig vertieften Vorderende sich befindet, und darüber einen in den Rachen mündenden Wasserkanal. Leib nackt, rund, ohne

Schuppen, keine paarige Flossen, keine Kiemenspalte, sondern Kiemenlöcher an der Seite des Körpers. Skelet knorpelig, sehr weich, keine Rippen. Dahin:

Die Lampretengattung (*Petromyzon*), Mund trichterförmig erweitert, mit hakigen Zähnen in Kreisen besetzt. Augen vorhanden, viele (7) Kiemenlöcher an jeder Seite. Rückenflosse vorhanden. Die eigentliche L. (*P. marinus*) wird gegen 3' lang und 1½" dick, Farbe gelblich, Rücken graugrün mit braunen Flecken; 2 Rückenflossen. Nordsee, geht in die Elbe, selbst in die Saale und Havel. Das Neunauge (*P. fluviatilis*), kleiner, 1' lang, gelbbraun, auf dem Rücken dunkler. In Flüssen, der Oder, Elbe u. a. m.

Der Schleimaal (*Gastrobranchus coecus*) hat keine Augen, Franzen um die Sauggrube am Kopf, an deren oberem Rande die Sprühöffnung; ein Kiemenloch jederseits am Bauch. Er sondert viel Schleim ab, daher der Name. Nordsee.

Zweite Hauptgruppe.

G l i e d e r t h i e r e.

§ 61. Das charakteristische Merkmal der Gliedertiere liegt in der allgemeinen Gestalt des Körpers. Dieser ist nemlich in mehrere hinter einander liegende, gleiche oder ungleiche Ringe getheilt, und trägt in den allermeisten Fällen an einigen oder allen dieser Ringe deutliche, wiederum gegliederte Füße, oft aber noch anderweitige Bewegungsorgane.

Die Gestalt des Körpers wird dadurch eine sehr bestimmte, daß die äußere Haut in den meisten Fällen zu einer festen, hornigen oder kalkigen Hülle verhärtet, welche Hülle zugleich das Gerüst bildet, an dem die übrigen Organe, besonders die Muskeln, sich befestigen. So haben alle diese Thiere ihr Skelet gleichsam äußerlich, und es ist also das Verhältniß zwischen Skelet und den übrigen Körpertheilen, in Bezug auf die Bildung der Rückgraththiere, umgekehrt; nur im Bau des Schildkröten-Panzers findet sich eine ähnliche Anordnung. Es ist merkwürdig, daß in der Anzahl der Leibringe sowohl, als auch der Glieder der Füße, ein bestimmtes Gesetz befolgt zu sein scheint, indem sich diese Anzahl meistens durch die Zahlen 3 oder 5 ohne Rest dividiren läßt. Letztere Zahl findet sich bloß im Brustkasten, die Zahl 3 in den andern Kör-

pertheilen. So besteht bei den Insekten der Leib aus 3 Abtheilungen, Kopf, Brust und Bauch, von welchen die zweite scheinbar aus 3, richtiger aus 5, die dritte meistens aus 6 oder 9 Ringen zusammengesetzt ist. Auch finden sich häufig 3 Fußpaare, und jeder Fuß hat 6 oder 9, niemals mehr, doch wohl weniger, Gelenke.

Unter den drei Abschnitten des Leibes ist der Kopf am wenigsten entwickelt. Freilich bemerkt man an ihm in der Regel Augen, und zwar zusammengesetzte, d. h. aus vielen kleinen Augelnchen, deren Zahl sich bis auf 60,000 belaufen kann, gebildete; allein deutliche Ohren fehlen den Gliederthieren, mit Ausnahme der Krebse, immer. Dasselbe gilt von der Nase und der Zunge, als schmeckendem Organ. Nichts desto weniger hören und riechen viele Gliederthiere, besonders Insekten, sehr gut. Eigenthümliche Organe des Kopfes sind die Fühlhörner (*antennae*), bald lange, bald kurze gegliederte Fortsätze, die meistens auf der Stirn zwischen den Augen stehen, und vielleicht die Stelle des Gehörorgans vertreten; zum Fühlen und Tasten dienen sie eigentlich nicht. Manchen, wie den Spinnen, fehlen sie. Der Mund der Gliederthiere hat in der Regel Kiefer, deren Anzahl aber sehr verschieden ist. Die Insekten haben nur zwei, welche aber, wie bei allen Gliederthieren, in der Mitte getrennt, also hakenförmig gebildet sind, und sich nicht, wie bei den Rückgratthieren, von oben nach unten, sondern von links nach rechts zangenartig gegen einander bewegen. An diesen hakigen Kiefern hängen an der Außenkante gegliederte Fortsätze, die zum Tasten dienen, und daher Taster oder Freßspitzen (*palpi*) genannt werden. Bei sehr vielen Gliederthieren sind aber auch die Kiefer zu einem Saugrüssel umgestaltet, so z. B. bei den Fliegen, Bienen, Schmetterlingen und Wanzen.

Der zweite Abschnitt des Leibes, der Brustkasten (*thorax*), ist häufig mit dem Kopfe verwachsen. Er trägt die Beine, deren Anzahl, Form und Gelenkung sehr verschieden ist. In der Regel jedoch kann man drei Hauptglieder, den Schenkel (*semur*), das Schienbein (*tibia*) und den Fuß (*tarsus*) unterscheiden; aber in den meisten Fällen ist

jeder wieder gegliedert. — Einige Gliederthiere, wie die Insekten, haben, außer den Beinen, noch häutige Flügel, die an der Rückenseite befestigt sind, während die Beine bei allen Gliederthieren an der Bauchseite sitzen.

Der dritte Abschnitt des Leibes, der Hinterleib oder Bauch (abdomen), ist bald mehr, bald weniger, bald gar nicht vom zweiten getrennt, aber von allen dreien immer am deutlichsten geringelt. Dieser Hinterleib enthält die Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane; auch sitzen an ihm nicht selten noch Füße oder fußartige Anhänge.

Von den Ernährungsorganen ist der Darm stets sehr deutlich, meistens nur so lang als der Körper, bisweilen dreimal so lang und drüber. In den meisten Fällen hat er eine Afteröffnung, in anderen fehlt sie, und dann ist der gabelförmige Darm wohl mit vielen blinden Fortsätzen versehen.

Die Gefäße fehlen sehr oft, und das meistens weiße, selten rothe (bei den Rothwürmern oder Anneliden) Blut fließt dann frei im Körper umher, doch ist immer ein Herz da, von welchem die Blutbewegung ausgeht. Die im Wasser lebenden Gliederthiere athmen meistens durch Kiemen, welche theils am ganzen Körper, theils bloß am Hinterleibe, theils am Brustkasten, oft an oder neben den Beinen, angebracht sind. Die in der Luft lebenden athmen theils durch Lungen (Spinnen), theils durch viele feine Luftröhren oder Tracheen, welche sich im ganzen Körper baumartig verbreiten (Insekten).

Was die Fortpflanzung der Gliederthiere betrifft, so legen bei weitem die meisten Eier, und die auskriechenden Jungen sind den Keltern in der Gestalt oft unähnlich. Durch mehrmaliges Abstreifen der Haut (häuten), dem alle Gliederthiere unterworfen sind, verändern sie ihre Gestalt, bis sie den Keltern ähneln. Dies nennt man eine Verwandlung oder Metamorphose.

Von den übrigen innern Organen liefern noch die Nerven ein gutes Kennzeichen. Sie entspringen nemlich von einem Strange, der an der Bauchseite des Körpers liegt und in jedem Gliede zu einem Knoten anschwillt. Ein solches

knotiges Nervensystem ist nur den Gliederthieren eigen. Die Nerven der Fühler, Augen, Taster und Beine entspringen von den ihnen nahegelegenen Knoten. —

Die Eintheilung der Gliederthiere ist folgende:

A. Mit Luftröhren oder Lufsfäden.

- a) Insekten. Der Leib ist in drei Hauptabschnitte getheilt, am mittleren 3 Fußpaare und meistens Flügel.
- b) Arachnoden. Der Leib ist in zwei ungleiche Abschnitte oder viele gleiche Ringe getheilt, und hat bloß Füße.

B. Mit Kiemen oder ohne Respirationsorgane.

- a) Krustaceen. Der meistens gepanzerte Leib ist in ungleiche Ringe getheilt, wovon nur eine gewisse Anzahl Füße tragen, die anderen Flossen.
- b) Würmer. Der weiche, bloß von Haut bekleidete Leib besteht aus gleichen Ringen und trägt nie gegliederte Füße.

Fünfte Klasse.

Insekten oder Kerfe, Insecta.

§ 62. Die Eintheilung des Leibes in drei große Abschnitte, den Kopf, den Brustkasten und den Hinterleib, so wie die auf sechs beschränkte Anzahl der Beine, sind die wesentlichsten Kennzeichen der Insekten.

Am Kopfe sitzen nur zwei gegliederte Fühler, deren Gestalt sehr verschieden ist. Die Augen sind groß und zusammengesetzt, doch kommen außer diesen Hauptaugen noch zwei oder drei kleine, einfache, auf der Stirn oder dem Scheitel befindliche Nebenaugen (ocelli) vor. Am Munde bemerkt man eine Oberlippe (labrum) und zwei hakige Oberkiefer (mandibulae), beide ohne Taster, dann zwei mit Tastern versehene Unterkiefer (maxillae) und eine gleichfalls Taster tragende Unterlippe (labium). Bisweilen sind diese Organe zu einem saugenden Rüssel umgebildet.

Am Brustkasten, der aus drei bald mehr bald weniger verwachsenen Ringen besteht, sitzen die Beine. Von den drei Hauptgliedern besteht der Schenkel aus drei, das Schienbein aus einem und der Fuß aus einem bis fünf Gli-

dern. Außerdem kommen noch häutige Flügel vor, die seitlich am zweiten und dritten Ringe sitzen; in der Haut derselben verbreiten sich hornige Adern. Bisweilen sind die vorderen ganz hornig, und heißen dann Flügeldecken oder Deck-schilder (elytra).

Der Hinterleib besteht aus sechs oder neun Ringen, deren jeder in 2 Hälften getheilt ist. Er trägt keine Füße, wohl aber am Ende Borsten, oder einen Stachel, welcher nur den Weibchen eigen ist, und theils beim Legen der Eier, theils als Waffe gebraucht wird.

Die Insekten athmen alle durch Luftröhren, welche von den zwischen je zwei Ringen in der Verbindungshaut gelegenen Luftlöchern (stigmata) entspringen. Sie haben keine Blutgefäße, aber ein langes, mehrkammeriges, am Rücken gelegenes Herz.

Die aus den Eiern gekrochenen Jungen haben entweder die Gestalt der Mutter, und unterscheiden sich nur durch geringere Größe und den Mangel der Flügel; oder sie sind den Aeltern ganz unähnlich, wie ein langer, runder, mit kurzen oder keinen Füßen versehener Wurm gestaltet, welcher den Namen Engerling, Raupe oder Made, auch Larve (larva) erhalten hat. Jene Jungen häuten sich bloß und bekommen nach und nach Flügel, diese dagegen häuten sich auch, ohne ihre Gestalt zu ändern, und liegen darauf eine Zeit lang unbeweglich da, ohne Nahrung einzunehmen, meistens von seidenartigen Geweben umschlossen; dann führen sie den Namen Puppe (pupa). Aus der Hülle dieser Puppe kriecht dann das Insekt in seiner vollkommenen Form erst hervor. Diese Insekten wachsen also nur als Raupen. Man unterscheidet nach dieser Verschiedenheit die Insekten mit der ersten Verwandlung als solche mit unvollkommener Metamorphose, die der zweiten als mit vollkommener Metamorphose begabte, die letzteren sind die zahlreicheren.

Die Gruppe der Insekten ist übrigens unter allen Thiergruppen die größte; man kennt gegenwärtig gewiß 80,000 verschiedene Arten, die theils von pflanzlicher, theils von thie-

rischer Nahrung leben. Folgendes ist die Eintheilung derselben:

A. Insekten mit vollkommener Metamorphose und zweigförmigen Flügeladern.

- a. Mit beißenden Mundtheilen, Flügeldecken und beweglichem Prothorax. 1. Fam. Käfer.
- b. Mit saugenden Mundtheilen und für sich unbeweglichem Prothorax.

Bier ungleiche nackte Flügel.	2. —	Immen.
Bier ungleiche bestäubte Flügel.	3. —	Falter.
Zwei Flügel.	4. —	Fliegen.

B. Insekten mit unvollkommener Metamorphose und neßförmigen Flügeladern.

- a. Mit 3. Theil freien, allermeist beißenden Mundtheilen. 5. — Neßflügler.
- b. Mit in einen Schnabel vereinten saugenden Mundtheilen. 6. — Halbdecker.

Erste Familie. Käfer, Coleoptera Linn. Eleutherata Fabr.

§ 63. Außer den aufgeführten Merkmalen der hornigen Vorderflügel (Flügeldecken) und der beißenden Mundtheile, haben sie noch andere eigenthümliche Eigenschaften. So finden sich fast niemals bei ihnen Nebenaugen; ihr erster Bruststring ist freier abgesondert, die beiden folgenden aber sind mit dem Bauche enger verwachsen und von den Flügeldecken verdeckt. Ein Stachel kommt ihnen nicht zu. Ihre Larven haben höchstens 6 Füße, oft gar keine, einen deutlichen Kopf und leben in der Erde, im Holze, wenige auf Blättern; die Puppe hat freie, sichtbare Gliedmaßen. Dahin:

Der Puppenräuber (*Calosoma sycophanta*) mit fadenförmigen, eifsgliedrigen Fühlern, langen Beinen, fünfgliedrigen Füßen, und breiten, gold und grün glänzenden Flügeldecken. Häufig in Wäldungen, frist, wie seine schwarze Larve, Schmetterlingsraupen, besonders der *Liparis dispar*.

Der breite Schwimmkäfer (*Dyticus latissimus*) wird 1½" lang, ist oben grünlich mit gelbem Rande, unten ganz gelb; Hinterbeine breit gedrückt, mit Haaren am Rande zum Schwimmen. Fühler fadenförmig. Männchen mit erweiterten Vorderfüßen, Weibchen mit gefurchten Flügeldecken. Lebt, wie seine 3" lange, grünlichgelbe Larve, in Fischteichen, und stellt dem Fischlaich nach. Selten.

Der Todtengräber (*Necrophorus vespillo*) hat knopfförmige gefühlte Fühlhörner und hinten abgestufte Flügeldecken; Farbe schwarz, Fühlernopf und 2 Binden der Decken rothgelb; Brust gelbhaarig. Die breite, schwarze Larve lebt im Aas, das der Käfer mit seinen Kameraden eingescharrt hat.

Der Mistkäfer (*Melolontha vulgaris*), Fühler fächerförmig, beim Männchen größer; Leib dick, fast rund, mit spitzer Afterdecke; Flügeldecken mit 3 schwachen Rippen. Farbe schwarz, Fühler, Beine und Flügeldecken braun, Bauchringe mit weißem, dreieckigem Seitenfleck. Die gelbe, weiche, rothköpfige Larve (Engerling) hat sechs lange Beine und lebt in der Erde von Grassurzeln.

Der Mistkäfer (*Scarabaeus stercorarius*) ist kürzer, aber dicker, hat ähnliche, fächerförmige, aber kleinere, bei beiden Geschlechtern gleiche Fühler und eine stumpfe Afterdecke. Farbe schwarz, Stahlblau angelaufen. Lebt im Pferdemist, die Larve in der Erde.

Die spanische Fliege (*Lytta vesicatoria*) hat gerade schnurförmige Fühlhörner, und an den vier Vorderbeinen fünfgliederige, an den hinteren viergliederige Füße. Farbe einfarbig metallisch grün. Lebt auf Eschen, Hartriegel (*Ligustrum*) und wird zu Blasenpflastern benutzt.

Der Schreiner oder Geiger (*Lamia aedilis*) hat lange, borstenförmige Fühler, viergliedrige Füße und einen ziemlich breiten, flachen Körper. Farbe grau, mit undeutlichen Wollenflecken. Die gelbe, fußlose Larve lebt im Bauholz; der Käfer giebt bei der Berührung einen zirpenden Ton von sich, den er durch Reiben des ersten Brusttringes am zweiten hervorbringt.

Das Sonnenkäferchen (*Coccinella septem-punctata*) hat einen halbkugelförmigen Leib, kleine in einen Knopf endende Fühler, und scheinbar dreigliedrige, eigentlich viergliedrige Füße. Farbe schwarz, Flügeldecken roth, mit 7 schwarzen Flecken. Die schwarze, rothgefleckte, rauhe, sechsfüßige Larve lebt auf Pflanzen, die von Blattläusen bewohnt werden, und nährt sich von diesen. Daher Blattlauslöwe genannt.

Zweite Familie. Immen oder Hautflügler, Hymenoptera Linn. Piezata Fabr.

§ 64. Sie haben einfache Kugeln und Neßaugen, vier ungleiche, häutige Flügel, die von wenigen verzweigten Adern durchzogen werden. Bißweilen fehlen sie. Mundtheile saugend, die Unterkiefer sind flach, lederartig, und bilden eine Scheibe, welche die in eine fleischige, oft lange, röhrenförmige, auch wohl behaarte, oder in mehrere Lappen getheilte Zunge auslaufende Unterlippe umgiebt. Weibchen mit einem Sta-

chel. Larven theils mit Kopf und bis 22 Füßen, theils fußlose, nicht mit einem deutlichen Kopf versehene, also blinde, Maden.

Die Schlupfwespen (*Ichneumon*es), mit langen, borstenförmigen Fühlern, dünngegliedertem Hinterleibe und kurzer Unterlippe. Die Weibchen stechen die Schmetterlingsraupen an, legen ihre Eier in dieselben und tödten sie dadurch. Man kennt sehr viele (gegen 1000) einheimische Arten dieser Gruppe.

Die Wespe (*Vespa vulgaris*), mit geknickten Fühlern, der Länge nach gefalteten Oberflügeln, und tegelförmigem, gestieltem Hinterleibe. Farbe schwarz, gelb gefleckt, Hinterleib mit gelben Binden, deren jede 2 schwarze Punkte führt. Das Weibchen bauet ein Nest aus Holzstückchen, und gründet darin einen einjährigen großen Staat, der aus geschlechtslosen Arbeitern, Männchen und Weibchen besteht.

Die Honigbiene (*Apis mellifica*) hat geknickte Fühler, eine lange, runde Zunge, ungefaltete Oberflügel und breitgedrückte Hinterschienen und Füße. Farbe braun, röthlich behaart. Bauet eine ähnliche, mehrjährige Wohnung aus Wachs, welches von eigenen Organen am Hinterleibe abgesondert wird; sammelt Blumenhonig ein zur Ernährung des Staates, der aus vielen geschlechtslosen Arbeitern, vielen Männchen (Drohn) und einem Weibchen (Königin, Bienen) besteht.

Die Ameisen (*Formicae*) haben geknickte, kolbige Fühler, keine verlängerte Zunge, und einen runden, von einem knotenförmigen oder schuppenförmigen Stiel getragenen Hinterleib. Manche haben keinen Stachel, sondern vertheidigen sich durch Beißen. Auch sie leben in Kolonien, aber in der Erde. Jeder Staat besteht aus ungeflügelten Arbeitern, geflügelten, größeren Weibchen und kleineren Männchen. Die sogenannten Ameisenheer sind die Puppen. —

Dritte Familie. Falter oder Schmetterlinge. *Lepidoptera* Linn. *Glossata* Fabr.

§. 65. Sie haben vier häutige, von kleinen bachziegelartig über einander liegenden Schuppen bedeckte Flügel, deren hinteres Paar kleiner ist, als das vordere. Mundtheile saugend; die meist langen, hohlen, fadenförmigen Unterkiefer bilden einen spiralig aufrollbaren Rüssel (*Kollzunge* genannt), der von den Tastern der Unterlippe verdeckt wird. Larven leben frei auf Blättern und haben 10 — 18 Füße. Puppe mit versteckten Gliedern, oft in Gespinnsten eingeschlossen.

Die Tagfalter (*Papilion*es) haben lange, kolbige Fühler, einen kleinen Leib, große Flügel und eine lange Röllzunge. Raupen häufig mit Dornen, Puppe frei hängend. Der große (*P. po-*

lychlorus) und kleine Fuchs (*P. urticae*), so wie die Kohlweisslinge (*P. crategi*, *P. brassicae*, *P. napi*) gehören hierher und sind uns Allen bekannt genug.

Die Schwärmer, Abend- oder Dämmerungsfalter (*Sphinges*) haben einen dicken, kegelförmigen Leib, kleinere, schmale Flügel, eine sehr lange Röllzunge und kürzere, cylindrische Fühler. Raupen nackt, auf dem letzten Ringe mit einem Horn. Puppe frei, in der Erde. *z. B.* der Wolfsmilchschwärmer (*Sph. Euphorbiae*), der Todtenkopf (*Sph. atropos*) und viele andere.

Die Nachtfalter oder Spinner (*Bombyces*) haben einen dicken Leib, breite Flügel und gekämmte Fühler. Ihre Raupen sind meistens stark behaart und spinnen ein dichtes Gewebe. *z. B.* der Seidenspinner (*B. mori*), die Ringelmotte (*B. neustria*), die Kupferglocke (*B. alnifolia*) u. a. m.

Die Eulen (*Noctuae*) haben borstenförmige Fühler, kegelförmige Leiber, und kleinere Flügel, die den Leib wie ein Dach bedecken. Raupen leicht behaart oder nackt; verpuppen sich in einem leichten Gewebe. *z. B.* das rothe Seidenband (*N. elocata*), die γ Eule (*N. gamma*) u. v. a.

Die Blattwickler (*Tortrices*) haben borstige Fühler, breite, abgestufte oder am Ende ausgeschweifte Flügel, die flach auf dem Leibe liegen, und einen meistens nur kleinen Körper. Ihre nackten Raupen wickeln Blätter zusammen, und wohnen in diesem Gehäuse, oder bohren Früchte an; *z. B.* die Obstmotte (*T. pomana*), deren fleischfarbige oben braunröthliche Larve in Kern- und Steinobst Gänge bohrt.

Die Motten (*Tineae*) haben fine, borstenförmige, oft sehr lange Fühler, längere, weiter hervorstehende Fächer, und schmale, flach neben einander liegende Flügel; *z. B.* die Kleidermotte (*T. pellionella*), grau, mit weißgelbem Halbringe. Die nackte Raupe lebt in wollenen Kleidern, Pelzwerk, und spinnt sich eine Hülle, worin sie beständig steckt.

Vierte Familie. Fliegen oder Zweiflügler, *Diptera* Linn. Antliata Fabr.

§ 77. Sie haben saugende Mundtheile, d. h. einen meist knieförmig gebogenen, weichen Rüssel, in welchem harte Borsten liegen. Hinterflügel fehlen, statt deren zwei gestielte Knöpfchen (Schwingkolben, halteres); die vorderen dünnhäutig, mit wenigen, verzweigten, meist parallelen Adern. Weibchen ohne Stachel, aber Manche stechen mit dem Rüssel.

larven fuß- und kopflos (Maden), leben versteckt; Puppen meist in der alten Larvenhaut.

Die ächten Fliegen (*Muscae*) haben dreigliedrige Fühler und wenige (4) Hauptadern im Flügel. Maden leben in Mist, Aas und Pflanzentheilen; z. B. die Schmeißfliege (*Musca vomitoria*), blaugrau, mit stahlblauem Hinterleibe. Legt ihre Eier auf faules Fleisch. Die Maden sind in 7 Tagen erwachsen. Die Fleischfliege (*M. carnaria*) ist etwas größer, aber schlanker; Leib schwarz und weiß getüpfelt, Augen roth. Die Stubenfliege (*M. domestica*), ein Drittel so groß, grauschwarz, Hinterleib am Grunde gelb. Die weiße Made lebt im Mist.

Die Stechfliege (*Stomoxys calcitrans*) hat das Aussehn einer Stubenfliege, ist jedoch etwas kleiner und hat einen dünnen, gerade nach vorn vorstehenden Rüssel. Sticht Menschen und Vieh, saugt also Blut.

Die Bremsengattung (*Oestrus*) hat sehr kleine, knopfförmige Fühler und eine unscheinbare, kaum sichtbare Rundöffnung. Leib meistens dicht behaart. Die Larven leben im Leibe der Pferde und Wiederfäuer, z. B. die von *Oestrus ovis* in dem Rachen und der Nasenhöhle der Schaaf. Fliege bräunlich, mit weißlichem Kopf. Größe fast wie eine Schmeißfliege.

Die Stechmücke (*Culex pipiens*) hat vielgegliederte, behaarte Flügel und lange, dünne Beine. Saugt Blut. Die Larven und Puppen leben im Wasser, worin sie durch Schlängeln des Hinterleibes munter umherschwimmen.

Fünfte Familie. Netzflügler, *Neuroptera* Linn. *Synistata* Fabr. *Gymnognatha* Burm.

§. 67. Sie haben größtentheils beißende Mundtheile, wie die Käfer, jeder Unterkiefer in der Regel von einer Art Kappe (*Helmgalca*) bedeckt. Fühler bald länger, faden- oder kolbenförmig, bald borstenförmig. Vier große, häutige, von gitterförmigen Adern durchzogene, Flügel, von denen die meistens breiteren hinteren dann der Länge nach gefaltet sind. Larven ähneln mehr oder weniger dem vollkommenen Insekt, leben meistens im Freien und an denselben Stellen mit den vollkommenen Insekten, oder im Wasser; im letztern Falle athmen sie durch Kiemen. Einige ruhen als Puppe, die Meisten bewegen sich und fressen.

I. Die Larven gleichen den vollkommenen Insekten wenig,

die Puppen ruhen nahrunglos. Untertiefer der vollkommenen Insekten bloß häutig.

A. Larven auf dem Lande. Flügel der vollkommenen Insekten gleich groß, die hinteren nicht gefaltet.

Der Ameisenlöwe (*Myrmecoleon formicarum*) hat kurze, kolbige Fühler, eine kleine Brust, aber einen langen, dünnen Hinterleib. Die kurze, breite, eiförmige, etwas flache, mit 2 großen Riefen versehene Larve gräbt Trichter im Sande, und nährt sich von den hineinfallenden Insekten, besonders Ameisen.

Die Florfliege (*Hemerobius perla*) hat lange, borstenförmige Fühler, sonst den Bau des Vorigen. Ihre Farbe ist ein blasses Grün, die Augen golden. In Gärten. Die dunkelfleischrothe, lanzettförmige Larve lebt zwischen den Blattläusen auf Pflanzen, und frisst sie mit ihren großen, weit vorstehenden Riefen.

Die Skorpionsfliege (*Panorpa communis*) hat ein schnabelförmig verlängertes Maul und borstenförmige Fühler; der Hinterleib des Männchens läuft in eine dicke, an zweien Gliedern hängende Zange aus. Farbe gelblich, braun gefleckt; Flügel ebenso. Sange roth. Gemein in Gebüsch. Larve noch unbekannt.

B. Larven im Wasser; Flügel der vollkommenen Insekten ungleich, die hinteren gefaltet.

Die Frühlingsfliegen (*Phryganeae*) haben lange, borstenförmige Fühler, ein schwaches Gebiß und vier ungleiche, behaarte Flügel. B. B. die große F. (*Phr. grandis*), gelbgrau, mit vielen dunklen, grauen und weißen, verworrenen Zeichnungen auf den Oberflügeln. Die unter dem Namen Sprocken bekannten Larven leben im Wasser, athmen durch Kiemen, und bauen sich Röhren, in denen sie wohnen.

II. Die Larven gleichen den vollkommenen Insekten ganz oder ziemlich; die Puppen bewegen sich und fressen. Untertiefer der vollkommenen Insekten hornig.

A. Larven leben im Wasser und athmen durch Kiemen. Hintere Flügel nicht größer als die vorderen und ungefalt.

Die Wasserjungfern (*Libellulae*) haben kurze, borstenförmige Fühler, ein starkes Gebiß, und vier gleich große Flügel. Die gemeine W. (*L. vulgata*) ist gelb oder roth, mit glashellen Flügeln, die am Grunde nicht gelb sind. Gemein auf Wiesen. Die Larven leben im Wasser, und haben eine ausstreckbare Zange am Maul zum Ergreifen der Beute.

Die Gaste oder Eintagsfliegen (*Ephemerae*) haben dieselben Fühler, ein schwaches Gebiß und vier ungleiche oder nur zwei

Flügel. Hinterleib mit 2 oder 3 Endborsten. Der gemeine H. (*E. v. Igata*) ist gelblich, braun gefleckt, Flügel braun gesprenkelt. Leben nur kurze Zeit; häuten sich noch als vollkommenes Insekt. Die Larven leben im Wasser und athmen mittelst seitlicher Kiemen.

B. Die Larven leben auf dem Lande und gleichen den vollkommenen Insekten genau. Hinterflügel dieser größer als die vorderen und gefaltet. Orthoptera Latr. Ulonata Fabr.

Der Ohrwurm (*Forficula auricularia*) hat perlschnurförmige Fühler; kurze, abgestufte Flügeldecken; umgeschlagene, von der Mitte des Vorderrandes aus gefaltete Flügel, und eine Zange am Schwanzende. Kriecht gern in kleine Löcher; frist saftige Früchte.

Die Gryllen (*Grylli*) haben lange, borstenförmige Fühler, dreigliedrige Füße und verlängerte, stärkere, hintere Springbeine. Die Feldgrylle (*G. campestris*) ist dunkelbraun, mit blutrothem Innenrande der Hinterschenkel. Gemein in Erdlöchern auf Feldern; das Männchen giebt, wie das der folgenden Art, einen lauten zirpenden Ton von sich. Das Weibchen (*G. domesticus*), kleiner, einfarbig gelbgrau. In Häusern an warmen Stellen, besonders bei Bäckern.

Die Maulwurfsgrille oder der Riedwurm, Biere (*Gryllotalpa vulgaris*), hat keine hintern Springfüße, aber breite, vordere Maulwurfsfüße zum Graben. Auf Feldern in Erdlöchern.

Die Grasspüßer (*Locustae*) haben lange borstenförmige Fühler, viergliedrige Füße, und verlängerte, hintere Springbeine mit dicken Schenkeln. Der grüne Gr. (*Gr. viridissimus*) ist ganz grasgrün mit gelbem Bauch. Auf Feldern, im Gesträuch und auf Bäumen. Das Männchen giebt einen lauten zirpenden Ton von sich.

Die Heuschrecken (*Acridia*) haben kurze, cylindrische Fühler, dreigliedrige Füße und zum Springen taugliche, längere Hinterbeine. Berüchtigt ist die Zugheuschrecke (*A. migratorium*) wegen ihrer verheerenden Züge. Sie wird 1½" lang, ist schmutzig grün; mit braun gefleckten Decken. Ueberall in Deutschland, aber meistens nur einzeln.

Sechste Familie. Halbdecker. Hemiptera Linn. Rhynchota Fabr.

§. 68. Ihre Mundtheile sind in einen Schnabel umgewandelt, der aus einer gegliederten Scheide und vier darin liegenden Borsten besteht. Vorderbrust ring freier abgesondert. Flügel ungleich, die vorderen häufig zur Hälfte hornig, die hintern mit verzweigten Adern; diese oft der Länge nach gefaltet. Bisweilen fehlen beide. Verwandlung unvollkommen.

Die große Gruppe der Wanzen (*Cimices*) zeichnet sich aus durch 4—5-gliedrige, meistens lange Fühler, eine 3—4-gliedrige Schnabelscheide, die an der Brust zurückgeschlagen liegt, und meistens halb hornige Flügeldecken. Bei der Bettwanze (*Cimex lectularius*) fehlen die Flügel, die Schnabelscheide ist dreigliedrig, der Leib sehr flach und dünn; Farbe gelbbraun. In Häusern, Bettstellen, saugt Menschenblut.

Die Zirpen (*Cicadae*) haben kurze, borstenförmige Fühler und einen dickeren, kürzeren Leib. Vorderflügel nicht abweichend, oder nur lederartig. Die Singzirpe oder Cika (C. orni) wird einen Zoll lang, ist braun, mit gelben Streifen am Bauch. Lebt im südlichen Europa auf Eschen; die Männchen geben einen lauten, zirpenden Ton von sich. Die Schaumzirpe (*C. spumaria*) hat einen spitzeren, dreiseitigen Kopf, lederartige Vorderflügel und hintere Springbeine. Farbe grau, mit 2 braunen Binden. 4''' lang. Die grüne Larve lebt auf Pflanzen, und verbreitet einen weißen Schaum um sich, den man Kuckucksspeichel genannt hat.

Die Blattläuse (*Aphides*) haben ziemlich lange 5—7-gliedrige Fühler und vier ungleiche, häutige Flügel. Am Bauch haben sie hinten 2 Röhren, die einen honigartigen Saft auströpfeln lassen. Sie leben auf Pflanzen, saugen deren Saft, und verursachen daselbst oft fruchtförmige Auswüchse. Z. B. die grüne Rosenblattlaus (*A. rosae*), an den jungen Trieben der Rose.

Die eigentlichen Läuse (*Pediculi*) haben kurze, 5-gliedrige Fühler, keine Flügel, und hakenförmige, eingliedrige, zum Festklammern eingerichtete Füße. Die Arten leben auf Säugethieren und saugen deren Blut. Z. B. die Kopflaus des Menschen (*P. capitis*), gelblich mit braun durchscheinenden Magen, 1½''' lang.

Sechste Klasse.

Spinnenartige Gliederthiere, Arachnoidea.

§ 69. Die Uebereinstimmung im Bau der nur zum Gehen tauglichen gegliederten Füße und der inneren Luft aufnehmenden Athmungsorgane bildet den Charakter dieser Klasse. Ihre Mundtheile bestehen, wie bei den Insekten, aus zwei scheeren- oder hakenförmigen Oberkiefern, zweien kleineren z. Thl. mit Tastern versehenen Unterkiefern und einer undeutlichen tastelosen Unterlippe. Die Fühlhörner fehlen häufig, ebenso beständig die zusammengesetzten Augen; die Anzahl der einfachen wechselt von 2 bis 40. Die Taster der

Unterkiefer sind oft groß und scheerenförmig, die Beine nie. Diese sind immer vollkommen gleichgebildet und ihre Anzahl ist entweder acht*) oder mehr als zwanzig. Im erstern Falle sitzen sie bloß am Brustkasten, welcher zugleich die Kiefer und Augen trägt, daher Kopfbrustkasten (cephalothorax) heißt, und der Hinterleib hat dann gar keine Füße. Er ist entweder ein einfacher ungegliederter Bauch (ächte Spinnen) oder er besteht aus mehreren, deutlichen oder undeutlichen Gliedern. Im zweiten Falle dagegen besteht der ganze Körper aus lauter gleichen Ringen, von denen jeder 1 oder 2 Fußpaare trägt.

Von inneren Organen zeigen die Athmungswerkzeuge Verschiedenheiten. Bei den einen (ächten Spinnen) sind es gefaltete Luftsäcke, Lungen; bei den andern ästige Luftröhren, Tracheen; diese haben mehrere Luftlöcher, jene nur zwei, die in beiden Fällen am Hinterleibe liegen.

Die Thiere dieser Gruppe häuten sich und verwandeln ihre Gestalt nur darin, daß die Alten oft mehr Beine haben, als die Jungen. Sie fressen fast nur thierische Nahrung, besitzen zum Theil Giftdrüsen und oft stark verletzende Stacheln.

Man theilt sie in folgende Gruppen.

I. Mit Cephalothorax und ungleichen Ringen. Arachnidae.

A. Mit Luftsäcken.

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Bauch deutlich getrennt, aber ungegliedert. | 1. Fam. Aechte Spinnen. |
| b. Bauch undeutlich getrennt, ungegliedert. | 2. — Skorpione. |

B. Mit Luftröhren.

- | | |
|--|------------------|
| a. Bauch gegliedert, von der Brust schwach getrennt. | 3. — Phalangien. |
| b. Bauch und Brust gar nicht getrennt. | 4. — Milben. |

II. Mit freiem Kopf und gleichen Körperringen.

Myriopoda.

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a. Jeder Ring mit 2 Fußpaaren. | 5. Fam. Hohlvielfüßer. |
| b. Jeder Ring mit 1 Fußpaar. | 6. — Plattvielfüßer. |

*) Die sechsbeinigen Milben sind nur Junge.

Erste Familie. Achte Spinnen, Araneae.

§. 70. Taster und Kiefer niemals scheerenförmig, die letzteren mit einem beweglichen durchbohrten Zahn, in welchen der Ausgang der Giftdrüse mündet. Hinterleib ungegliedert, blasig; an seiner Spitze mit mehreren, seidenartige Fäden absondernden Drüsen (Spinnorgane), 6—8 Augen. Bekannt sind:

Die Buschspinne (*Mygale avicularia*), mit unterwärts gebogenem Kieferzahn und dicken, stark behaarten Beinen. Der Bauch allein hat die Größe eines Taubeneies, die Beine gegen 3" lang, Farbe braun. Brasilien.

Die Kreuzspinne (*Epeira diadema*) hat einwärts gebogene Kieferhaken und acht in zwei bogenförmigen Querlinien gestellte Augen. Bauch wie eine Haselnuß, gelb oder grau, mit weißen ein Kreuz bildenden Flecken. Gemein in Gärten, spinnt ein großes, frei schwebendes Netz, und fängt darin Insekten, denen sie das Blut ausaugt.

Die Tarantel (*Lycosa tarantula*), fast dreimal so groß, bräunlich, Bruststück mit einem Rückentheil; acht Augen, in der Form eines Rechtecks. Italien, lebt in Erdlöchern, macht kein Gewebe. Ihr Biß erregt Entzündung.

Zweite Familie. Skorpione, Arthrogastra.

§. 71. Es sind große Arachniden, mit langen meist scheerenförmigen Tastern an den Unterkiefern, die Unkundigen für Beine gelten, daher man sie für zehnfüßig halten könnte. Der Hinterleib ist ziemlich mit dem Bruststück verwachsen, aber in mehrere (oft 12) Glieder getheilt.

Der europäische St. (*Scorpio europaeus*) hat scheerenförmige Taster, sechs Augen am Rande, und zwei auf der Mitte des Cephalothorax; die 5 letzten Glieder des Hinterleibes sind viel dünner und länger, bilden einen Schwanz, dessen Spitze eine Blase trägt, welche in einen gebogenen Stachel ausläuft, der als Waffe dient; in der Blase die Giftdrüse. Süd-Europa. Seine Stiche erregen Entzündungen. Man kennt noch viele Arten aus heißen Gegenden, deren Stiche tödtlich sein sollen.

Dritte Familie. Phalangien, Phalangodea.

§. 72. Sie haben scheerenförmige Kiefer, und lange, bald fadenförmige, bald scheerenförmige Taster. Leib birnför-

mig, gegliedert. Nur 2 Augen mitten auf dem Bruststück. Hierher:

Der *W. berknecht* oder *Schneider* (*Phalangium opilio*) hat scheerenförmige Oberkiefer und Taster, einen kurzen, dicken Hinterleib und sehr lange, dünne Beine, die ausgerissen noch lange zucken, und sich, wie bei allen Spinnen, wieder neu am Körper erzeugen. Sizen an Wänden in Grübchen, jagen Nachts nach Fliegen.

Vierte Familie. Milben, *Acarina*.

§ 73. Leib klein, kugelförmig, Brust nicht vom Hinterleibe deutlich geschieden, dieser ohne Ringel. Kurze, dreigliedrige Taster. Kiefer theils borstenförmig, theils lanzettartig, theils scheerenförmig. 2—4 Augen. Leben im Wasser, auf Pflanzen, in fauligen Substanzen, z. B. Käse, als Schmarozer auf Thieren, und sind oft ungeheuer häufig. 3. B.

Die rothe Gartenmilbe (*Trombidium holosericeum*), scharlachroth, sammetartig glänzend; die vier vorderen Beine von den hinteren entfernt. Kriecht in Gärten an schattigen Stellen unter Büschen umher.

Die Käse milbe (*Acarus siro*) hat kurze Beine und einen glatten, glänzenden, mit langen Borsten besetzten Leib; Farbe weißlich-gelb. Häufig im alten Käse.

Die Wassermilben (*Hydrarachnae*) haben vier lange, mit Wimpern besetzte Füße und einen beweglichen Haken an der Spitze der dreigliedrigen Taster. Diese bilden zugleich die Scheide der borstenförmigen, einen Schnabel bildenden Kiefer. Viele, rothe und blaue, schwarz gefleckte Arten finden sich in unsern stehenden Gewässern.

Fünfte Familie. Rollvielfüßer. *Chilognatha*.

§ 74. Leib drehrund, wurmförmig, oder halbrund, kann sich zusammenfugeln. Kopf in den ersten Körperring hineingezogen mit 2 Gruppen einfacher Augen. Fühler kurz, siebengliedrig; im Munde große Oberkiefer, keine eigentlichen Unterkiefer und keine Taster. Jeder Körperring trägt 2 Paar kurze Füße.

Die Rollassel (*Glomeris pustulata*) hat die Gestalt der Kellerrasseln, aber besteht aus 12 gleichen Ringen, deren jeder einen weißlichen Rand und 2 helle Flecken auf dunklem Grunde zeigt. Unter Steinen.

Der Tausendfuß (*Julus sabulosus*) ist völlig drehrund, vielgliedrig, und rollt sich bei der Berührung spiralig auf. Sein Kopf

hat viele Augen an jeder Seite und kolbige Fühler. Farbe braun mit rothgelbem doppeltem Rückenstreife. In sandigen Gegenden an feuchten Stellen.

Sechste Familie. Plattvielfüßer. Chilopoda.

§ 75. Leib flachrund, oben platt, kann sich nicht kugeln. Kopf frei, scheibenförmig, mit langen vielgliedrigen Fühlern und 3 Paar Unterkiefern, deren letztes zangenförmig und sehr groß ist. — Jeder Körperring mit einem Fußpaar.

Der gemeine Bielfuß (*Scolopendra forficata*) hat 15 Körperringe von abwechselnd gleicher Größe, ist kaffeebraun, wird 1 Zoll lang und findet sich unter Steinen und in Kellern an feuchten Stellen. Er läuft sehr schnell.

Siebente Klasse.

Krebsartige Gliederthiere, Krustaceen, Crustacea.

§ 76. Diese Gruppe ist, mit der folgenden, die vielgestaltigste unter den Gliederthieren; die Einteilung des Leibes in viele, unter sich ungleiche Ringe, von welchen alle, oder die meisten, mit Gliedmaßen versehen sind, giebt noch den besten Charakter. Auch unterscheidet man bei den Meisten 3 Hauptgruppen der Körperringe, nemlich die vorderen, welche Sinnesorgane tragen und den Kopf bilden, die mittleren, welche die Hauptbewegungsorgane besitzen und den Brustkasten zusammensetzen, und die hinteren, deren Gliedmaßen immer Flossen sind oder ganz fehlen. Sie bilden den Hinterleib. An der Grenze der beiden letzten Abschnitte liegen die Geschlechtsöffnungen, am Ende des letzten die Afteröffnung. Am Kopfe finden sich in der Regel vier, seltener zwei, Fühler; zusammengesetzte Augen, ein Paar eigentlicher Kiefer, aber 2—5 Paare accessorischer Kiefer, Unterkiefer oder Kaufüße genannt, weil sie oft wie Füße gestaltet, mitunter die Beine selbst sind, und in den meisten Fällen Fächer tragen. Die Gliedmaßen dienen theils zum Gehen, theils zum Schwimmen. Erstere, Beine genannt, nur am Brustkasten befestigt, bestehen aus einer einfachen Reihe von Ge-

lenken und enden bisweilen scheerenförmig; letztere, Flossen genannt, bestehen dagegen aus 2 gleichen, seltener ungleichen parallelen Reihen sehr zahlreicher kleiner Gelenke, und sind immer mit langen Borsten am Rande besetzt. Die Krebse leben meistens im Wasser und athmen daher durch Kiemen, die oben an den Füßen oder Flossen angebracht sind, und eine blatt- oder büschelförmige Gestalt haben; ihr Gefäßsystem ist vollkommen entwickelt und sehr allgemein verbreitet, aber das Blut noch farblos. — Man muß sie folgendermaßen einteilen:

I. Sie bestehen keine Verwandlung, da die Jungen den Alten völlig gleichen. Am Brustkasten haben sie allermeist Gangfüße, am Hinterleibe Flossen.

A. Mit gegliedertem Brustkasten und unbeweglichen Augen am freien Kopf.

14 gleiche Füße; Kiemen am Hinterleibe.

14 ungleiche Füße; Kiemen am Brustkasten.

B. Mit einfachem Brustkastenpanzer, unbeweglichem Kopf, aber gestielten, beweglichen Augen.

16 ungleiche Füße.

10 meistens ungleiche Füße.

I. Ringelkrebse.

1. Isopoden.

2. Amphipoden.

II. Panzerkrebse.

3. Stomatopoden.

4. Dekapoden.

II. Sie bestehen eine Verwandlung, indem die Jungen ganz anders gestaltet sind als die Alten. Am Hinterleibe finden sich in der Regel weder Füße noch Flossen.

A. Junge und Alte mit Augen, beide stets beweglich.

10 Gangfüße, in deren Mitte das Maul.

22 — 34 blattartige Flossenfüße.

8 — 12 gegliederte Flossenfüße.

B. Junge mit Augen und beweglich, die Alten gewöhnlich augenlos und unbeweglich.

Maul mit 3 Paar Kiefern, 12 gegliederte Rankenfüße, Hinterleib fehlt. —

Maul ein Schnabel mit 1 Paar Kiefern, 4 — 12 Füße; Hinterleib vorhanden, ohne Füße, mit Endflossen oder Borsten.

III. Schalenkrebse.

5. Pöcilopoden.

6. Phyllopoden.

7. Lophyropoden.

IV. Haftkrebse.

8. Cirripeden.

9. Parasiten.

Erste Familie. Gleichfüßer, Isopoda.

§ 77. Ihr Leib besteht, außer dem Kopf, aus sieben Hauptringen, auf welche 3—6 kleinere Ringe, die den Hinterleib (Schwanz) bilden, folgen; von den sieben Brustringen hat jeder ein Fußpaar. Vier Fühler am Kopf, viele einfache Augen. Kiefer oft ohne Laster. Athmen durch Kiemen, die als Bläschen unter dem Hinterleibe liegen. Die meisten leben im Meer. Z. B.

Die Kellerassel (*Oniscus asellus*), mit acht gliedrigen äußeren, und zweigliedrigen inneren Fühlern, Leib eiförmig, unten flach, oben gewölbt, schwarzgrau, mit 2 Reihen gelber Flecken. Gemein an Mauern, unter Steinen, selbst in feuchten Kammern etc.

Die Wasserassel (*Asellus aquaticus*), mit längeren Fühlern und eingliedrigem, rundlichem Hinterleibe, woran zwei gegliederte, gabelige Anhänge. Weibchen mit einem Eiersack an der Brust. Gemein in süßen Gewässern.

Zweite Familie. Flohkrebse, Amphipoda.

§ 78. Ihr Leib ist häufig seitlich zusammengedrückt, hat einen freien Kopf, mit vier meist langen, viergliedrigen Fühlern und großen zusammengesetzten Augen. Darauf folgen 6 oder 7 größere Ringe, mit eben so vielen Fußpaaren, von welchen die vorderen scheeren- oder hakenförmig gestaltet sind; an der Basis dieser Füße die Kiemenblasen. Hinterleib 3—6 ringelig, mit gegliederten Anhängen an allen oder den letzten Ringen. Alle leben im Wasser, die Meisten im Meere.

Die Flußgarnele (*Gammarus pulex*) hat lange, borstenförmige, obere Fühler, die am dritten Gliede mit einem zweiten, ganz kleinen gegliederten Fortsatz versehen sind; die drei ersten Fußpaare hakig. Sechs Hinterleibsringe, die 3 letzten mit Anhängen. Wird 2" lang, hat eine graugrünliche Farbe und findet sich häufig in Bächen, z. B. bei Berlin im Schaafgraben.

Dritte Familie. Maulfüßer, Stomatopoda.

§ 79. Ihr Kopf ist mit dem Brustkasten verbunden, unbeweglich, aber die Augen sind gestielt und zusammengesetzt; vier Fühler; 8 Paar Füße am vorn von einem gemeinsamen Panzer bedeckt, hinten noch gegliederten Bruststück; die Kiemen unter dem ziemlich langen Hinterleibe, am Ende desselben breite Flossen. Leben nur im Meere.

Der Heuschreckenkrebs (*Squilla mantis*) hat kurzgestielte Augen und acht Fußpaare, von welchen die fünf ersten am vorderen, vom Panzer bedeckten Theile des Brustkastens in der Nähe des Mundes sitzen und hakenförmig enden; die drei hinteren, kürzeren einen gegliederten Anhang haben, und an drei freien Ringen des Brustkastens befestigt sind. Der lange Hinterleib hat oben fünf erhabene Leisten. Der Krebs wird 8—10'' lang und findet sich im Mittelmeer.

Vierte Familie. Zehnfüßer, Decapoda.

§. 80. Der Kopf ist mit dem großen Rückenschilde des Brustkastens verwachsen; an ihm 2 gestielte, zusammengesetzte Augen und vier Fühler. Am Munde sind sechs Paare von Kauwerkzeugen, die meistens mit Tastern. Am Bruststück sitzen fünf Paar Füße, von welchen das vorderste in der Regel wie eine Scheere endet. Die Kiemen sitzen an den Schenkeln, unter dem Brustschilde. Der fünfkringelige Hinterleib hat keine oder verkümmerte Flossen.

A. Mit großem, im Leben meistens grade ausgestrecktem Hinterleibe (gemeinlich Schwanz genannt), an dessen Ende 5 Flossen. Langschwänze.

Der Flußkreb (*Astacus fluviatilis*) hat 3 Paare scheerenförmig gebildeter Vorderfüße, deren erstes Paar sehr groß ist, und einen von kalkigen Halbringen bedeckten Hinterleib, dessen Seitenendflossen aus zwei Stücken bestehen. Er wird gegen 6'' lang, ist im Leben braun, im Tode roth, findet sich in unsern süßen Gewässern und nährt sich von thierischen Substanzen, besonders Aas.

Der Einsiedlerkreb (*Pagurus Bernhardus*) hat nur am ersten Fußpaare Scheeren und einen nicht von kalkigen Halbringen bedeckten, sondern nackten Hinterleib. Er findet sich im Meere und sucht sich SchneckenSchalen, in welchen er den weichen Leib versteckt, um ihn gegen Angriffe zu schützen.

B. Mit kleinem Hinterleibe, der keine Flossen am Ende hat, und im Leben gegen die Brust nach vorn umgeschlagen ist. Kurzschwänze, Taschenkrebse.

Der gemeine Taschenkreb (*Cancer pagurus*) hat, wie alle Kurzschwänze, nur am ersten größeren Fußpaare Scheeren, die übrigen Füße laufen in ein kegelförmiges Glied aus. Bruststück breit, fast halbkreisförmig, am Vorderrande jederseits mit 9 Zähnen. Gemein in den Meeren an deutschen Küsten.

Fünfte Familie. Stachelfüßer, Poecilopoda.

§. 81. Kopf mit dem großen, fast kreisförmigen Brust-

stück verwachsen, dieses hinten tief ausgeschnitten zur Aufnahme des Hinterleibes. Fünf Fußpaare, alle scheerenförmig, in ihrer Mitte das Maul, und die mit Stacheln besetzten Hüften vertreten die Stelle der Kiefer. Kiemen an den Flossen des Hinterleibes, dieser läuft in einen Stachel aus.

Hierher die einzige Gattung des moluckischen Krebses (*Limulus*), große Thiere von 1' Durchmesser und brauner Farbe enthaltend, die an ostindischen und amerikanischen Küsten gefunden werden.

Sechste Familie. Blattfüßer, Phyllopoda.

§. 82. Kopf bald angewachsen, bald frei; Maul mit 2 großen, starken Kiefern; dahinter am Bruststück viele blattförmige gewimperte Füße. Hinterleib ohne Füße, am Ende mit Borsten oder Schwimmblättern. Z. B.

Der Blattfuß (*Apus cancriformis*), mit angewachsenem Kopf und einem großen, ovalen Rückenschild, das das ganze Bruststück bedeckt. Am Ende des Hinterleibes 2 lange Borsten. Bisweilen in großer Menge in Pfützen, Gräben etc.

Der Kiemenfuß (*Branchiopus stagnalis*) hat einen freien Kopf, kein Rückenschild, sondern ein freies, gegliedertes Bruststück. Ebenda. Beide 1" lang.

Siebente Familie. Büschelfüßer, Lophyropoda.

§. 83. Kopf mit dem Bruststück verwachsen; an ihm 2 oder 4 oft ästige Fühler und ein einziges mittleres Auge. Leib bald deutlich gegliedert, bald von zwei großen, klappenförmigen Schalen zum Theil oder vollkommen bedeckt. Weibchen in geringer Anzahl; höchstens 5 Paare, gegliedert, mit Borsten und Wimpern besetzt. Z. B.

Das Einauge (*Cyclops quadricornis*) hat einen gestreckten, deutlich gegliederten Leib, vier nicht ästige Fühler und meistens fünf Fußpaare. Das Weibchen führt 2 große Eiersäcke mit sich herum. In Gräben und Pfützen.

Der Wasserfloh (*Daphnia pulex*); Leib von zwei klappigen Schalen umschlossen, aus welchen nur der Kopf hervorragt; 2 ästige Fühler, 5 Fußpaare; Farbe fleischroth; Darm grün. So groß wie ein Stecknadelknopf; bisweilen zu Millionen in Gräben und Pfützen.

Achte Familie. Rankenfüßer, Cirripedia *).

§. 84. Kopf im Alter undeutlich, mit dem Bruststück

*) Vergleiche meine Abhandlung: Beiträge zur Naturgeschichte der Rankenfüßer. Berlin 1834. 4.

verwachsen, augenlos, in der Jugend mit einfachem Auge und 2 Fühlern. 2 Paare tastloser Kiefer, 6 Fußpaare, jeder Fuß aus 2 gegliederten Ranken gebildet. Stecken im Alter in großen kalkigen aus mehreren Stücken zusammengesetzten Schalen, die mit einem häutigen oft stielsförmigen Grunde festsitzen.

Die Entenmuschel (*Lepas anatifera*) hat eine fünfschalige Kalkhülle, die von einem langen häutigen Stiel getragen wird. Thier mit fünf Paar zipfelförmigen Kiemen und langem schwanzförmigen Anhang zwischen den Füßen. In allen Meeren.

Die Seepocke (*Balanus tintinnabulum*) hat eine aus mehreren Stücken zusammengewachsene, kegelförmige, oben offene Schale, deren Eingang durch 2 Deckelschalen verschlossen wird. Die Schale sitzt ohne Stiel auf Austerschalen, Steinen, etc. Das Thier mit 2 großen gefalteten Kiemen.

Neunte Familie. Schmarotzerkrebse, Parasita.

§. 85. Kopf mit dem Bruststück verwachsen, an ihm in der Regel 2 ungestielte Augen und 2 oder 4 Fühler. Maul mehr oder weniger schnabelförmig, mit borstenförmigen Kiefern, oder eine bloße Oeffnung, ohne alle Kiefer (?). Vorderbeine hakig zum Anklammern, die hinteren flossenförmig; höchstens 6 Fußpaare, bisweilen gar keine, sondern bloße fleischige Lappen an deren Stelle. Die Thiere leben als Schmarotzer auf Fischen und sind von unbedeutender Größe. Z. B.

Caligus piscinus, mit 2gliedrigen Fühlern, Augen am Vorderende eines jeden seitlich vorn vom Brustschilde entspringenden Fortsatzes, mit rüffelförmigem Maul und 6 Fußpaaren, die zwei ersten hakenförmig. Auf mehreren Seefischen, Dorschen, Lachsen u. s. w.

Achte Klasse.

Würmer, Vermes *).

§. 86. Der nackte Leib der Würmer besteht aus vielen unter sich gleichen Ringen, die oft sehr deutlich, häufig aber

*) Die Vereinigung der bisher unter dem Namen von Rothwürmern oder Anneliden, Strubelwürmern und Eingeweidewürmern als getrennte Klassen aufgestellten Gruppen in eine einzige Klasse, bedarf vor dem sachkundigen Publikum eines näheren Beweises, der nicht hierher gehört; es genügt zu bemerken, daß es kein einziges ausschließendes Merkmal giebt zur Trennung in 2 natürliche Klassen, Ringel- und Eingeweidewürmer, die man gewöhnlich anzunehmen pflegt, sondern

auch nur schwach, abgesetzt sind. Gliedmaßen finden sich noch an diesen Ringen, doch eigentlich dann nur mit Bestimmtheit, wenn zugleich der Kopf mit Fühlern und Augen deutlicher hervortritt. Es sind in diesem Fall kurze, höckerige, mit Borsten besetzte Füße. Sonst finden sich statt ihrer bloße Borsten oder große, muskulöse Gruben, Saugnapfe genannt. Sie liegen dann, wie die Füße, am Bauch, meistens am Vorder- und Hinterende; auch liegt wohl die Mundöffnung in einer solchen Sauggrube. Auf der Oberfläche stehen bei Vielen lange, feine oder dickere Borsten, die den Thieren ein haariges Ansehen geben, daher man sie, weil sie im Meere leben, Meerraupen zu nennen pflegt. Oft wird die Rauigkeit durch zwischen den Borsten befindliche Kiemenbüschel verstärkt. Die im Wasser Lebenden haben zum Theil Kiemen und rothes Blut in deutlichen Gefäßen; die Uebrigen leben im Inneren anderer Thiere, haben keine Athmungswerkzeuge und kein rothes Blut. Diesen ist dagegen ein gabelsförmig getheilter, mit vielen Nebenästen versehener Darm eigen, der blind endet, also keine Aftöffnung hat; die ersteren haben einen einfachen, graden oder mit weiten Taschen versehenen Darm mit Aftöffnung am Hinterleibe.

Man kann diese Klasse folgendermaßen eintheilen:

- | | |
|---|---------------------|
| A. Mit drehrundem Leibe, woran Bor- | Erste Ordnung. |
| sten oder wahre Füße. Darm grade, | Arthrodes. |
| mit Aft. | |
| a. Mit rothem Blut und Kiemen. | 1. Fam. Rothwürmer. |
| b. Keine Kiemen, Blut roth, steife Bor- | |
| sten statt der Füße. | 2. — Borstenwürmer. |
| c. Ohne Kiemen und äußere Organe. | |
| Blut weiß. Leib rund. | 3. — Fadenwürmer. |
| d. Keine Kiemen, Blut weiß, der Leib flach, | |
| zum Theil mit Wimpern versehen. | 4. — Strudelwürmer. |

daß sich außer diesen mehrere gleichwerthige Gruppen finden, zu welchen aus beiden Klassen sich entsprechende und ergänzende Glieder gehören. Diese Gruppen habe ich vorläufig als Familien bezeichnet; die umständliche Beweisführung behalte ich mir für die Zukunft bei besserer Gelegenheit vor. Die Räberthiere, welche ich früher den Würmern verwandt glaubte, ergeben sich nach Hrn. Ehrenberg's neuesten Mittheilungen als Krebse, und nahe Verwandte der Lophyropoda; sie sind, als unbedeutende Uebergangsglieder, jetzt ganz ausgelassen. Vergleiche mein Handbuch der Naturgeschichte. Berlin 1836. 8.

- B. Mit flachem, schwach oder nicht gegliedertem Leibe, woran Sauggruben.** Zweite Ordnung.
Trematodes.
- a. Leib länglich, mit Afteröffnung. Blut roth. 5. Fam. Blutigelwürmer.
 - b. Leib veränderlich, Darm gabelig, ohne After. Eine Sauggrube, worin der Mund. 6. — Plattwürmer.
 - c. Leib elliptisch; Darm gabelig, ohne After. Mehrere Sauggruben. 7. — Saugwürmer.
- C. Mit rundem oder flachem, deutlich gegliedertem Leibe; Kopf mit Sauggruben oder Haken, oder beiden zugleich. Kein After.** Dritte Ordnung.
Helminthes.
- a. Kopf ein einziehbarer, hakiger Rüssel, Leib rund. 8. Fam. Stachelkopfw.
 - b. Kopf eckig; Leib flach, bandförmig. 9. — Bandwürmer.
 - c. Kopf eckig; Leib flach, endet in eine Blase. 10. — Blasenwürmer.

Erste Familie. Rothwürmer, Annulati.

§. 87. Sie haben einen runden Leib mit deutlich abgesetzten, gleichen Gliedern, deren jedes an der Bauchseite mit fußartigen Höckern, die Borsten tragen, versehen ist. Der vorderste Ring hat bisweilen einen abweichenden Bau, trägt dann gegliederte Fühler und 2 — 4 einfache Augen. Kiemen äußerlich büschelförmig, theils auf dem ganzen Leibe, theils am Vorderende. Blut roth, in deutlichen Gefäßen. Dahin:

Nereis pelagica, mit deutlichem Kopf, woran mehr als 2 Fühler und ein Maul mit 2 gezähnten Kiefern; vier Augen; drei kleine Kiemenblättchen jederseits an jedem Ringe; 2 Schwanzfäden. Gegen 4" lang. Gemein in der Nordsee.

Serpula vermicularis (Wurm röhre); kein deutlicher Kopf; also auch keine Augen und Fühler; 2 — 3 Kiemenbüschel am Vorderende des Körpers; Fußhöcker mit kurzen Borsten, längere auf dem Rücken. Die Thiere stecken in gewundenen Kalkröhren, welche von der Oberfläche ihres Körpers abgesondert werden, und die sie mit einem kolbenförmigen Anhang des ersten Gliedes verschließen. Nordsee.

Zweite Familie. Borstenwürmer, Chaetopodes.

§. 88. Ihr Leib ist drehrund, deutlich geringelt, mit steifen Borsten an der Bauchseite, theils an allen, theils an

mehreren Ringen. Leib von verschiedener Länge; Kopf, Augen, Fühler nicht bei allen bemerkbar; bisweilen Fäden neben dem Munde. Leben im Schlamm des Ufers oder in feuchter Erde. *Z. B.*

Der Regenwurm (*Lumbricus terrestris*) hat keinen deutlichen Kopf, also auch keine Augen und Fühler, keine äußeren Kiemen, aber rothes Blut führende Gefäße, und kurze Warzen mit steifen Borsten in 4 Doppelreihen am Bauch und an der Seite. Auf ein Drittel des Leibes ein dickerer Ring (Sattel, Gürtel.) Lebt in feuchter Gartenerde und wühlt dort Gänge. Er nährt sich vom Erdsaft (*humus*).

Die Naiden haben einen zarten, feinen, durchsichtigen, mit einzelnen oder mehreren Borsten jederseits an jedem Ringe besetzten Leib; bei manchen finden sich Augen; bei keiner äußere Kiemen. *Nais proboscidea* hat einen langen Fühlfaden (Rüssel) an der Oberlippe, 2 Augen und 2 Borsten auf dem Rücken, 4 am Bauch an jeder Seite jedes Ringes. Pflanzte sich auch durch Theilung fort. In stehenden Gewässern. Die meisten Arten stecken in Röhren im Schlamm.

Dritte Familie. Fadenwürmer, Nematodes.

§. 89. Sie haben einen langen, drehrunden, meist dünnen Leib, ohne alle äußeren Organe, als Fußwarzen, Borsten u. dergl. Die Ringe des Leibes sind kurz und nur schwach angedeutet, meistens in großer Anzahl vorhanden; Maul eine bloße Oeffnung, ohne Haken und Kiefer. Blut weiß, ebenso der Körper. Sie leben meistens im Inneren anderer Thiere, besonders im Darmkanal. *Z. B.*

Der Spulwurm (*Ascaris lumbricoides*), ein langer, federkielst. dicker, gelblichweißer Wurm, der an beiden Enden zugespitzt ist. Maul von drei Knötchen umgeben. Lebt im Darm des Menschen, besonders der Kinder.

Vierte Familie. Strudelwürmer, Turbellarii.

§. 90. Der Leib ist länglich, flach, bandsförmig, wenig geringelt, bisweilen geschwänzt, auf der Oberfläche fein gewimpert, nicht zum Schwimmen geschikt. Ueber der Mundöffnung nicht selten mehrere Augenpunkte. Darm weit, nicht gewunden, mit Afteroöffnung. Blutgefäße bemerkbar, keine Athmungsorgane. Einige pflanzen sich durch Theilung fort. Leben im Wasser, zwischen Pflanzen und Steinen.

Der Schnurwurm (*Nemertes [Borlasia] gigas*) hat einen flach,

runden Leib, eine vordere Mundöffnung, hintere Afteröffnung, und eine große saugnapfförmige Geschlechtsöffnung am Vorderleibe. Wird bis 6' lang, lebt zwischen Steinen an den Küsten von England, liegt zusammengeknauelt. Farbe braun, ins Grünliche, mit 5 helleren Längsstreifen.

Fünfte Familie. Blutigelwürmer, Hirudinei.

§. 91. Ihr Leib ist ebenfalls nackt, aber nicht lang, meistens nur 3 — 4'', dabei flach, breit, nach beiden Enden zugespitzt und schwach geringelt. Mundöffnung in einer Sauggrube, eine zweite am Schwanzende unter dem After; Darm weit, mit Nebentaschen und After; Blut roth; keine äußeren Kiemen, aber innere Säcke an der Bauchseite statt ihrer. Leben im Wasser und saugen Blut an Rückgraththieren. Z. B.

Der medicinische Blutigel (*Hirudo medicinalis*), vorderer Saugnapf nicht abgesetzt, bloß der erweiterte Mundrand; im Runde drei lanzettförmige Kiefer mit gezählter Schneide. 10 Augen. Farbe oben braungrün, mit Augenflecken in 6 Reihen, unten grau, schwarz gefleckt. In Teichen, Bächen, wird zum Blutsaugen benutzt.

Sechste Familie. Plattwürmer, Planarici.

§. 92. Sie haben einen mehr flachen Leib, welcher keine deutliche Ringelung mehr zeigt, aber, besonders bei den Jungen, mit Wimpern besetzt ist. An der Bauchseite ein Saugnapf worin der Mund; am Vorderende Augen, die bisweilen fehlen. Blut weiß. Darm gabelförmig, einfach oder verzweigt, ohne After. Sie leben im Wasser. Z. B.

Der milchweiße Plattwurm (*Planaria lactea*), Maul an der Bauchseite, mit vorstreckbarem Rüssel; Darm zerästelt, dreischenklig; 2 Augen. Farbe milchweiß, Darm scheint bräunlich durch. In Gräben, an Steinen, Holzstückchen u. s. w.

Anderer Arten und Gattungen leben im Meere, zwischen Tangen und Korallen.

Siebente Familie. Saugwürmer, Trematodes.

§. 93. Sie haben ganz die Gestalt und Bildung der Vorigen, aber ihr Leib ist glatt, ohne Wimper. Saugnapfe meist groß, in verschiedener Anzahl. Meistens keine Augen. Sie leben schmarotzend an anderen Thieren, besonders im Darm. Z. B.

Der Leberegel oder die Egel Schnecke (*Distomum hepaticum*),

mit großer Sauggrube am Bauch, einer kleineren, worin der Mund, und einem dritten kleineren Grübchen dazwischen, worin der Eierstock mündet. Darm stark zerästelt. Form und Größe eines kleinen Rosenblatts; Farbe gelblich. In den Gallengängen der Schaafe und Menschen; bisweilen sehr gemeln. Andere Gattungen finden sich sogar im Auge der Fische, manche auch äußerlich an den Kiemen und auf der Haut der Fische.

Achte Familie. Stachelkopfwürmer, Acanthocephali.

§. 94. In dieser Familie findet sich ein ziemlich langer, immer drehrunder Leib wieder, welcher nach vorn gemeinlich dicker wird; ganz am Vorderende ein Rüssel, welcher auf der Oberfläche mit Haken besetzt ist, und in den Leib zurückgezogen werden kann. After fehlt. Hierher die Gattung:

Echinorhynchus (Krazer), deren viele Arten im Darmkanal der Rückgraththiere und Insekten vorkommen, z. B. der Riesenkräher (*Ech. gigas*) beim Schwein. Er wird 1' lang, ist federkielsdick und schwach geringelt; Männchen nur 3'', hinten mit einem glockenartigen Anhang.

Neunte Familie. Bandwürmer, Cestodes.

§. 95. Leib lang, flach, deutlich gegliedert, von hinten nach vorn verschmälert, am spitzen Vorderende ein eckiger, mit 2 oder 4 Sauggruben und oft mit einem Hakenkranz um den Mund besetzter Kopf. Jedes hintere Glied hat eigene Geschlechtsorgane, deren Ausführungsgang bald auf der Fläche, bald am Rande liegt. Sie leben im Darm und in der Bauchhöhle der Rückgraththiere. Z. B.

Der schmale Bandwurm (*Taenia solium*), Kopf viereckig, mit 4 Sauggruben und Hakenkranz. Glieder quadratisch. Geschlechtsöffnung abwechselnd am Rande. Im Darm des Menschen, besonders in Deutschland, Frankreich, England, Schweden.

Der breite Bandwurm (*Bothriocephalus latns*) hat einen länglichen Kopf mit 2 Sauggruben; breite, quer rechteckige Glieder, deren Geschlechtsöffnung am Bauch. Auch im Darm des Menschen, besonders bei Polen, Russen, Böhmen und Schweizern.

Zehnte Familie. Blasenwürmer, Cystici.

§. 96. Sie haben einen kurzen, gegliederten, flachen Leib, der hinten in eine Blase ausläuft. Kopf der Vorigen.

Wie diese ohne After, mit gabeligem Darm. Leben auch im Inneren der Thiere, aber nie im Darm. 3. B.

Die Finne (*Cysticercus cellulosae*). Die Blase wird so groß wie ein Schrotkorn oder eine Erbse, und geht allmählig in einen Leib von der beschriebenen Form über. Zu Tausenden im Muskelfleisch der Schweine, auch wohl des Menschen.

Der Drehwurm (*Coenurus cerebralis*). An einer einzigen Blase, welche größer als ein Hühnerei wird, hängen viele kleine Leiber von der beschriebenen Gestalt, welche sich rückwärts in die Blase zurückziehen können. Im Gehirn der Schaafe, veranlaßt die Drehkrankheit.

Dritte Hauptgruppe.

B a u c h t h i e r e.

§. 97. Das sicherste Kennzeichen dieser dritten Hauptgruppe des Thierreiches liefert nicht sowohl die allgemeine Form des Körpers, als vielmehr der gleichzeitige Mangel symmetrischer Bewegungsorgane bei Allen, und des Kopfes mit den Sinnesorganen bei den Meisten. Ihr Leib ist nemlich ein bloßer, bald mehr rundlicher, bald flacher, scheibenförmiger, bald auch länglicher, aber stets ungegliederter Sack, in welchem die oft sehr vollkommen entwickelten Verdauungs- und Fortpflanzungsorgane stecken. An diesem Leibe finden sich wohl einige oder viele, häufig durch die Zahl vier oder fünf ohne Rest theilbare, regelmäßige Ausstrahlungen, welche in einigen Fällen sogar aus hintereinander liegenden, von Haut bekleideten, gleichen Knochengliedern bestehen, aber nie erkennt man an diesen Strahlen jene Hauptabschnitte, welche den Charakter der Gliedmaßen bilden, wieder; immer nehmen sie vom Anfange gegen das Ende hin an Umfang ab, und bestehen aus gar keinen oder unzähligen Gliedern. Bei den sack- und röhrenförmigen liegt der Mund vorn, bei den scheibenförmigen in der Mitte an der Unterseite; um ihn stehen meistens einziehbare Fühlfäden, oder lange, hohle, nicht einziehbare Fängarme. Bei manchen bedecken den Leib eine, zwei oder mehrere Kalkschalen; bei anderen ist er nackt, aber mit vielem Schleim überzogen; bei noch anderen setzt sich die Kalkmasse im Inneren ab.

Unter den inneren Organen fehlt der Darm wohl nie; oft ist er ein gewundener Kanal mit Schlund, Magen, Dünndarm und Dickdarm, zu welchen die große Leber hinzukommt; bei anderen ist er ein bloßer einfacher geschlängelter Kanal; bei anderen ein bloßer blinder Sack ohne Ausgang; bei wieder anderen hängen viele rundliche Magen an dem hinten offenen Darmkanal. Die Fortpflanzungsorgane bestehen aus großen Eiersäcken, die sich bald am Bauch, bald in der Nähe des Mundes öffnen.

Von Sinnesorganen finden sich bei Vielen noch Augen, ja selbst bei einer Gruppe (Cephalopoda) noch Gehörswerkzeuge, und dann ist der Kopf auch deutlicher vom übrigen Leibe getrennt, allen anderen fehlen Kopf und Sinneswerkzeuge vollkommen.

Die allermeisten dieser Thiere leben im Wasser, besonders im Meere, und fressen dann thierische Nahrungsmittel; einige, die auf dem Lande, aber nur an feuchten, schattigen Stellen vorkommen, fressen auch Blätter.

Man theilt die Bauchthiere am besten folgendermaßen ein:

I. Symmetrische. (§. 7).

- a) Weichthiere. Ihr weicher, von 1, 2 oder mehr Kalkschalen umgebener Leib hat einen weichen, vielen Schleim absondernden Hautlappen (Mantel), welcher den ganzen Körper umhüllt. Maul vorn.

II. Reguläre (ebenda).

- b) Strahlthiere. Ihr flacher oder kugelig, selten cylindrischer Leib ist von kalkigen oder lederartigen Schalen umgeben und läuft in 5 oder 10 Hauptstrahlen aus, in deren Mitte das Maul.
- c) Quallen. Ihr meistens flacher, selten blasiger, gallertartiger Leib hat keine Schale, aber 4 oder 8, auch viele Fangarme um den mittleren Mund, der jedoch einigen fehlt; statt seiner dann viele Saugröhren. *)
- d) Polypen. Leib gallertartig, rundlich, mit vorderer, von Fühlfäden umgebener Mundöffnung. Viele Thier.

*) Wenn gleich die Strahlthiere und Quallen genau genommen nur eine Klasse bilden, so sollen sie hier doch, der leichteren Darstellung wegen, für zwei besondere Klassen noch ferner gelten. Vergl. mein Handbuch d. Naturgesch. Berlin 1836.

chen durch gemeinsame Haut zu einem ästigen oder strahligen Stamm, der innen oder außen Kalkmasse absetzt, verwachsen.

III. Irreguläre (ebenda).

- e) Infusionsthier. Leib klein, gallertartig, frei oder durch Stiele zu einem gemeinschaftlichen Stamm verwachsen. Inwendig viele rundliche Magenblasen.

Neunte Klasse.

Weichthiere, Mollusca.

§. 98. Hierher die symmetrischen Bauchthiere mit deutlichem Kopf und Sinnesorganen, welcher jedoch nicht einmal Allen zukommt. Ihr Leib ist eine ziemlich große, fleischige Höhle mit vorderer Mundöffnung. Von den Seiten des Rückens entspringt der weiche, häutige Mantel, welcher theils den ganzen Leib, theils nur die Eingeweide einhüllt. Er sondert die kalkigen Schalen ab, von welchen die meisten Weichthiere umgeben werden. Unter dem Mantel liegen zugleich die Athmungsorgane, bei den Meisten faltige und blüschelförmige Kiemen, bei anderen eine große faltige Lunge. Alle haben einen wahren Darm, mit Afteröffnung, und einer großen braunen Leber. Eben so wenig fehlt das Gefäßsystem, auch ist immer ein Herz da, von welchem die Bewegung des bläulich weißen Blutes ausgeht. Das Nervensystem bildet einen Ring um den Schlund, von welchem die paarigen Nerven zu den übrigen Organen hingehen. Bei den meisten bildet die untere Kante des Bauches eine fleischige Schwiele, auf welcher sie fort kriechen, und die daher den Namen Fuß erhalten hat. Die kalkige Schale ist theils eine gewundene Röhre, theils besteht sie aus zwei Klappen, selten aus mehreren gleichen oder ungleichen Stücken; manchen fehlt sie.

Man theilt die Weichthiere folgendermaßen ein:

A. Mit deutlichem Kopf, woran Fühläden und Augen.

Kopf mit großen, langen Fangarmen; Mantel sackförmig, vorn offen. . . . 1. Fam. Kopffüßer.

- Kopf mit 2 oder 4 einziehbaren Fühlern; Mantel meist groß, die Eingeweide umhüllend; Fuß flach, scheibenförmig. 2. Fam. Bauchfüßer.
 Kopf mit kleinen, einziehbaren Fühlern; Mantel klein; Fuß flossenförmig. 3. — Kielfüßer.
 Kopf klein, neben ihm 2 flügelartige Ausbreitungen des Mantels. 4. — Flossenfüßer.

B. Kein deutlicher Kopf.

- Am Bauche 2 fleischige, gefranzte, einrollbare Arme, dazwischen das Maul. 5. — Armfüßer.
 Bauch kielförmig, daneben 2 Paar blättrige, inwendig gefaltene Kiemen. Mantel weit. 2 Schalen. 6. — Muscheln.
 Bauch ganz von dem nur vorn und hinten offenen Mantel umschlossen, Kiemen in einer besondern Höhle. Keine Schale. 7. — Mantelthiere.

Erste Familie, Kopffüßer, Cephalopoda.

§ 99. Kopf groß, rundlich, mit 2 großen Augen, darüber die Mundöffnung, von den langen, fleischigen Fangarmen umgeben. Im Maul 2 Kiefer und eine gezähnte Zunge. Leib wie ein Sack, wegen des großen, vorn offenen Mantels, in welchem, außerhalb des Körpers, die Kiemen liegen. Alle leben im Meere und fressen Fleisch. Geschlechter getrennt. Hierher:

Der Dintenfisch (*Sepia officinalis*), mit 10 Armen, wovon 2 länger; Leib länglich, jederseits mit einer flügelartigen Ausbreitung des Mantels; im Mantel am Rücken ein kalkiges Schalenstück. Mittelmeer, kriecht auf dem Grunde mit dem Maule nach unten, hat eine mit brauner Farbe gefüllte Blase, aus welcher die braune Farbe *Sepia* bereitet wird. Diesen Saft läßt er bei Gefahr ins Wasser, trübt dasselbe und entgeht dadurch seinen Feinden.

Der Papiernautilus (*Argonauta argo*) hat 8 Arme, wovon 2 flossenartig erweitert sind. Das Thier steckt in einer weißen, gerippten, fahnenförmigen Schale, mit welcher es auf der Oberfläche des Meeres segelt. Mittelmeer.

Zweite Familie. Bauchfüßer, Schnecken, Gastropoda.

§. 100. Leib langgestreckt, mit deutlichem Kopf, woran 2 oder 4 Fühler, die hinteren mit Augen am Grunde oder an der Spitze. Bauch eine breite, sehnige Scheibe; der Man-

tel dünn, die Eingeweide umhüllend, meistens mit diesen in der röhrigen, spiralförmig gewundenen Schale versteckt. Sie athmen meistens durch Kiemen, einige auch durch Lungen; diese sind alle Zwitter, die Uebrigen bald getrennten Geschlechtes, bald ebenfalls Zwitter. 3. B.

Die schwarze Waldschnecke (*Limax ater*), ohne Schale, mit ovalem, flachem, schildförmigem Mantel auf dem Rücken, unter welchem sich der Leib verbirgt. Lunge ein faltiger Sack im Mantel, am rechten Rande desselben die Oeffnung. An feuchten Stellen im Walde, rothbraun oder schwarz; frist Vegetabilien.

Die große Gartenschnecke (*Helix pomatia*), ebenfalls mit Lungen, und jener im Bau ähnlich, aber der Mantel steckt mit den Eingeweiden in einer gewundenen, glatten Schale, deren letzte Windung die faltige Lunge einnimmt. Athemloch in der Außenecke, daneben der After. Erreicht über 1" im Durchmesser. Farbe braungrau. In feuchten Gebüsch; wird gegessen.

Die Posthornschnecke (*Planorbis corneus*) hat eine flache Schale, deren Windungen alle in einer Ebene liegen. Das Thier hat nur 2 aber sehr lange, zugespitzte Fühler. Gehäuse über 1" im Durchmesser, braunschwarz, Thier schwarzgrau. In süßen Gewässern, kommen an die Oberfläche, um frische Luft in die Lungen aufzunehmen.

Die mit Kiemen versehenen Schnecken tragen dieselben an sehr verschiedenen Stellen; bei den meisten liegen sie im Nacken des Thieres in einer besonderen Höhle, und haben, wie die Fischkiemen, ein Kammförmiges Ansehen (daher Kammkiemer); sie sind getrennten Geschlechtes. Bei andern liegen sie an der rechten Seite und werden vom Mantel bedeckt (Dachkiemer); wieder andere haben auf dem Rücken freie büschelförmige Kiemen (Rackkiemer); noch andere haben sie an einer oder beiden Seiten des Körpers in einer tiefen Falte zwischen Mantel und Leib (Seitenkiemer). Die zahlreichen Gattungen dieser Gruppen leben mit wenigen Ausnahmen im Meere, besonders der Tropengegenden *).

*) Die unendliche Mannigfaltigkeit in den todten Schalen und Gehäusen der Schnecken hier auseinander zu setzen, würde den Schüler ermüden, besonders da er in den Naturgegenständen seiner Umgebung umsonst nach Repräsentanten sucht; solche Erörterungen müssen einem spezialeren Vortrage vorbehalten bleiben.

Dritte Familie. Kielfüßer, Heteropoda.

§. 101. Kopf deutlich, mit Augen und Fühlern, Maul rüßelförmig verlängert; Leib gestreckt, an der Bauchseite eine zusammengedrückte Flosse, die am Hinterrande einen Saugnapf hat. Schale klein, müßensförmig, zart, nimmt nur die Leber und Kiemen auf. Schwimmen im Meere, den Bauch nach oben, wo die Flosse als Segel dient. Z. B.

Carinaria cymbium, mit spitzem, breitem, flossenförmigem Schwanz, kleiner quergestreifter Schale, rüßelförmigem, ausstreckbarem Maule, zwei langen, vorderen Fühlern und zwei kleinen, hinteren mit Augen. Farbe bläulich. Mittelmeer.

Vierte Familie. Flossenfüßer, Pteropoda.

§. 102. Kopf oft undeutlich, neben ihm zwei flügelartige Fortsätze des Mantels. Leib bald nackt, bald in einer Schale. Leben in der hohen See. Z. B.

Das Wallfisch aas. (*Clio borealis*), mit deutlichem Kopf, woran 2 kleine Fühler, die sich in ein Paar Gruben zurückziehen. Leib länglich, flach, vom Mantel enge eingehüllt, ohne Schale; 1' lang. Im Nordmeer sehr häufig; die gewöhnlichste Speise der Wallfische.

Fünfte Familie. Armfüßer, Brachiopoda.

§. 103. Kein Kopf, der Leib steckt in einer zweiflappigen Schale, welche von einem fleischigen Fortsatz des Thieres (Fuß) getragen wird. Mit diesem Fuß setzen sie sich fest. Mund unterhalb, neben ihm zwei fleischige, gefranzte Arme, die das Thier spiraltig einrollt. Alle im Meere. Z. B.

Ligula anatina. Schalen länglich, etwas keilförmig, dünn, gleich groß. Der Fuß dringt hinten zwischen beiden Schalen hervor und ist sehr lang. Schale hornfarben. Indischer Ocean.

Bei *Terebratula* durchbohrt der Fuß den Buckel der größeren Schale. Ebenda.

Sechste Familie. Muscheln, Conchifera.

§. 104. Ebenfalls ohne Kopf. Der Leib, vom häutigen Mantel eingehüllt, dessen Lappen an der Bauchseite bald getrennt, bald verwachsen sind; darunter neben dem Rücken die blattförmigen, hohlen, inwendig gefalteten Kiemen. Die Bauchkante läuft in einen fleischigen Kiel oder Fortsatz aus, auf welchem das Thier fortfriecht (daher Fuß). Der ganze Leib

steckt in zwei meistens gleichen, runden, nach außen gewölbten Schalen, die an der Rückenseite zusammenstoßen, mit Zähnen in einander greifen (Schloß) und äußerlich durch ein sehniges Band verbunden sind. Mit diesen Schalen steht das Thier durch einen oder zwei Muskeln in Verbindung. Die Thiere leben nur im Wasser, meistens im Meere. Sie bilden, nächst den Schnecken, die zahlreichste Gruppe der Mollusken. *B. B.*

Die Auster (*Ostrea edulis*). Schalen flach, gleich, durch einen dicken Muskel, welcher mitten in der Schale von der einen Hälfte zur anderen hinüberläuft, und an jeder Schale einen tiefen Eindruck macht, verbunden. Mantel ganz offen, am Rande gefranzt. Schloß ohne Zahn. Band klein und dick. Im Meere an europäischen Küsten, auf Sandbänken. Wird gegessen.

Die Perlmuschel (*Meleagrina margaritifera*). Hat 2 Muskeleindrücke in jeder Schale, also auch 2 Verbindungsmuskeln. Schalen flach, scheibenförmig, gleich groß. Schloß ohne Zahn. Mantel ganz offen. Im indischen Ocean. Die Schale wird als Perlmutter zu Kunstfachen verarbeitet; kleine, runde, kugelförmige Absonderungen des Mantels sind die so geschätzten echten Perlen.

Die Teichmuscheln (*Anodontae*) finden sich bei uns in süßen Gewässern, haben 2 Muskeln, gleiche Schalen, keinen Zahn am Schloß, und einen überall offenen Mantel. Man kennt mehrere Arten, die sich nach der Größe und Form der dünnen, inwendig perlmutterfarbenen, außen grünbraunen Schalen unterscheiden.

Die Malermuschel (*Unio pictorum*) hat einen starken Zahn am Schloß und eine dickere Schale, die vorn abgerundet, nach hinten zugespitzt ist. Sie findet sich ebenda, ist aber kleiner, besonders schmaler.

Siebente Familie. Mantelthiere, Tunicata.

§. 105. Sie haben Aehnlichkeit mit den Vorigen, aber die Schale fehlt; dagegen bildet der häutige oder lederartige am Bauch geschlossene Mantel die äußere Hülle. In ihm nur 2 Oeffnungen, eine dem Maule, die andere der Afteröffnung des Körpers gegenüber; beide bisweilen dicht neben einander. Kiemen in einer eigenen Höhle. Leben nur im Meere; manche verbreiten ein schimmerndes Licht.

Salpa. Kiemenhöhle vorn und hinten auf, in ihr die Darmmündungen, und zwar neben der hinteren der Mund, neben der vorderen der After. Die Kieme als Diameter durch die Höhle gezogen. Die Arten sind frei beweglich, die Individuen nicht verwaschen, und suchen das hohe Meer.

Pyrosoma. Wie Salpa, aber die Wand der Kiemenhöhle ist zugleich Kieme. Die Individuen verwachsen zu einer cylindrischen Thiergruppe, welche beweglich ist und stark leuchtet.

Ascidiae. Kiemenhöhle mit einer Mündung, aus ihrem Grunde entspringt der Mund; der After mündet frei nach außen. Einige sind einzeln, andere verwachsen. Alle unbeweglich angeheftet.

Zehnte Klasse.

Strahlthiere, Radiata.

§. 106. Der kugelige, strahlenförmige oder cylindrische Leib wird von einer aus mehreren Kalkstücken zusammengesetzten, oder lederartigen Schale eingehüllt. Der Mund befindet sich an der unteren Fläche, oder dem vorderen Ende, und ist von Tentakeln umgeben. Im Inneren des Körpers findet sich entweder ein langer, gewundener Darm, der sich stets in einen After mündet, oder ein bloßer Magensack, ohne After. Respirationsorgane sind theils Bläschen, die im inneren liegen, und das Wasser vermittlest der Afteröffnung in sich aufnehmen; oder sie fehlen, und das Wasser umgiebt die inneren Organe unmittelbar. Viele deutliche Gefäße; weißes Blut; ein Nervenring um den Schlund; große Eierstöcke. Alle leben im Meere. Vier Familien sind bekannt.

A. Mit lederartiger, weicher Hülle. 1. Fam. Holothurien.

B. Mit Kalkschalen und Kalkstücken.

- | | |
|--|------------------|
| a. Leib kugel- oder scheibenförmig, ohne Hauptstrahlen. | 2. — Seeigel. |
| b. Leib in mehrere Hauptstrahlen getheilt. Ohne After, Maul unten. | 3. — Seeesterne. |
| c. Mit einem After, Maul oben. | 4. — Haargerne. |

Erste Familie. Holothurien, Holothurodea.

§. 107. Leib mehr oder weniger lang gestreckt, bisweilen wurmförmig, von lederartiger Hülle umschlossen, aus welcher an der Bauchseite, oder überall, kurze Fortsätze hervortreten, die das Thier fortschieben. Um die vordere Mundöffnung weiche, einziehbare, gefranzte Arme. After am Hin-

terende, dient zugleich als Eingang in das ästige, mit vielen Blasen besetzte, Respirationsorgan.

Holothuria tubulosa, wird gegen 1' lang, ist braun, hat am Bauch viele hundert einziehbare Füße und findet sich im Mittelmeere.

Zweite Familie. Seeigel, Echinodea.

§ 108. Die aus vielen Kalkstücken zusammengesetzte Schale bildet eine einzige, meistens halbkugelförmige Hülle, worin 2 große Löcher, eins in der Mitte der Unterseite für den Mund, das zweite mehr obere für den After. Auf der Schale viele Höcker, woran bewegliche Stacheln sitzen; außerdem fünf Doppelreihen von Löchern, aus welchen weiche, mit einem Saugnapf endende Füßchen hervorragen. Kein Respirationsorgan, sondern das Wasser umspült die Organe.

Der gemeine Seeigel (*Echinus esculentus*) hat eine pomeranzenförmige Schale, mit schwachen Höckern, worauf die kurzen, feinen Stacheln, und weiten Oeffnungen in den beiden Polen der Hauptachse. In der unteren Mundöffnung steckt ein aus 5 Zähnen gebildetes Kauorgan. An europäischen Küsten, die 10 reifen Eierstöcke werden gegessen.

Dritte Familie. Seesterne, Asteroidea.

§ 109. Die Schale ist ebenfalls aus vielen Kalkstücken zusammengesetzt, allein diese gränzen nicht genau aneinander, bilden kein einfaches Gehäuse, sondern liegen mehr schuppenförmig übereinander und sind an der weichen Haut festgewachsen. Leib flach, scheibenförmig, in 5—25 Hauptarme getheilt, die theils einfach sind, theils sich spalten oder gabelförmig zerästeln. Mund unterhalb; kein Respirationsorgan. Kein After.

Beim gemeinen Seestern (*Asterias rubens*) ist der flache Leib in fünf ungetheilte, breite Strahlen ausgedehnt, auf deren unterer Seite in der Mitte die Kalkschilder fehlen, dagegen hier viele einziehbare, kurze Röhren sitzen, welche Wasser in den Leib saugen, daneben die gestielten Saugscheibchen, welche als Bewegungsorgane zum Kriechen dienen. Farbe röthlich. Nordsee.

Das Medusenhaupt (*Gorgonocephalus verrucosus*) ist in 5 Hauptarme getheilt, deren jeder sich wiederholt spaltet, so daß dadurch eine wohl zehnfache Verästelung entsteht.

Vierte Familie. Haarsterne, Crinodea.

§ 110. Sie haben die Gestalt der letztgenannten Gattung, aber der Leib sitzt vermittelst anderer strahllich entspringender Rückenarme, oder eines einfachen Stieles fest, so daß die Mundöffnung nach oben steht. Der After ist vorhanden.

Der gemeine Haarstern (*Comatula mediterranea*) hat zehn Hauptstrahlen um den Mund, und kleine Ranken am Rücken zum Festhalten. Mittelmeer.

Das gestielte Medusenhaupt (*Encrinus caput Medusae*) ruhet auf einem langen, gegliederten, vom Rücken entspringenden Stiel, der von Absatz zu Absatz mit 5 einfachen Ranken besetzt ist. 5 Hauptarme, deren jeder gabelig ist, um den Mund. Westindische Küsten, sitzt an Felsen.

Fünfte Klasse.

Quallen oder Medusen, Acalephae.

§ 111. Der gallertartige, weiche Leib dieser Thiere bildet theils eine Scheibe, theils eine große Blase, theils einen gestreckten, bandförmigen Körper, und ist mit Fangarmen oder langen, feineren, gleichfalls gallertartigen Fäden versehen. Die Mundöffnung liegt bei den scheibenförmigen an der Unterseite, und im Umfange derselben sitzen die Fangarme, 4 oder 8 an Zahl; bei anderen fehlt eine Mundöffnung ganz, und statt ihrer sind viele hohle Saugröhren da, welche die Nahrung einnehmen. Diesen fehlt wohl der Magen, die anderen haben einen großen, blasenförmigen, mit Nebentaschen versehenen Magen, aus welchem ästige Gefäße entspringen. Darm und After fehlen. Keine Respirationsorgane, aber bei vielen Blasen, welche durch eigene Öffnungen Luft (Schwimmbblasen) oder Wasser (Schwimmhöhlen) einnehmen zum Schwimmen. Die Quallen leben nehmlich alle im Meere, meistens zwischen den Tropen, haben eine hellbläuliche, halb durchsichtige, bisweilen röthliche Farbe, welche an den um den Magen liegenden Genitalien (Eierstöcken oder Hoden) am deutlichsten ist. Sie fressen thierische Nahrung; einige leuchten. Man hat 3 Hauptgruppen unterschieden.

Erste Familie. Rippenquallen, Ctenophorae.

§ 112. Leib eiförmig oder bandartig, Mundöffnung nach unten, führt in eine Höhle, die eine zweite gegenüberstehende Oeffnung hat. Bei den eiförmigen laufen von einer Oeffnung zur andern 8 Rippen kleiner Blättchen, die bei den bandförmigen am Rande sich erstrecken. Keine Fangarme, aber oft 2 Fangfäden.

Der Venusgürtel (Cestum Veneris) hat einen langen, schmalen bandförmigen Leib, in dessen Mitte der längliche Magen; neben dem Munde 2 Fangfäden. Gefäße durchlaufen den Leib. Indischer Ocean.

Die Hutqualle (Cydippe pileus) hat einen eiförmigen Leib, ein weites Maul mit wulstigem Rande, 8 Rippen und 8 Gefäße, die von einem Ringe um den Mund ausgehen. Zwei lange Fangfäden. Atlantisches Meer.

Zweite Familie. Scheibenquallen, Discophorae.

§ 113. Der scheibenförmige, rundliche Leib ist entweder, wie ein Pilz, nach unten in einen kurzen Stiel verlängert, oder es fehlt dieser Stiel. In beiden Fällen bewegt er sich durch gleichförmiges Zusammenziehen und darauf folgende flache Ausbreitung, wobei die Oberseite nach vorn gerichtet ist. An der untern Seite der Mund, von 4 oder 8 Armen umgeben. In der Mitte der Magen, rings um ihn die 4 Genitalien.

An deutschen Küsten ist nur eine Art dieser Gruppe häufig, nemlich die Ohrenqualle (Medusa aurita); sie hat keinen Stiel, vier gefranzte Arme um den Mund, dazwischen 4 Höhlen, worin die 4 halbmondförmigen Genitalien, und 4—5" im Durchmesser. Ost- und Nordsee.

Dritte Familie. Röhrenquallen, Siphonophorae.

§ 114. Sie haben keinen einfachen Mund und Magen, sondern viele kurze Röhren, die die Nahrungsmittel sogleich aussaugen. Leib eine große Blase, oder aus vielen kleineren zusammengesetzt. Keine oder viele Schwimmhöhlen. Lange Fühlfäden.

Die Seeblase (Physalia arethusa) besteht aus einer großen Blase, die wie eine schwimmende Ente gestaltet ist; auf dem Rücken

den ein Hautkamm, vorn an dem aufgerichteten Vorderende die Öffnung; viele kurze Saugröhren an der Bauchseite, dazwischen lange, knotige Fäden. Ueber 1' lang. Atlantischer Ocean.

Zwölfte Klasse.

Polypen, Polypina.

§ 115. Thiere von gallertartiger, weicher, oft nur schleimiger Beschaffenheit, mit kugeligem oder cylindrischem Körper, an dessen oberem Ende eine Mundöffnung, von vielen oder wenigen (6, 8 oder 12), einfachen oder gefranzten, fein gewimperten Tentakeln oder Fangarmen umgeben, die eine große Empfindlichkeit an den Tag legen. Der Mund führt in einen einfachen Magen. Keine Respirations- und Circulationsorgane, keine Nerven, aber ziemlich deutliche Muskeln. Manche haben Geschlechtsorgane, die in den Magen münden; andere pflanzen sich durch Keimbildung fort, indem sie Knospen an ihrem Körper entwickeln. Diese Knospen bleiben bei vielen mit dem Mutterkörper in Verbindung, treiben wieder Knospen, und so entsteht ein verzweigter, pflanzenförmiger Thierstamm. Bei den meisten sondert sich an ihm, theils an der Oberfläche, theils im Centrum, Kalkmasse ab, welche das Gerüst des Thieres bildet und den Namen Korallenstock führt. Die meisten leben im Meere heißer Gegenden.

Erste Familie. Polyartinia.

Die Polypen haben sehr viele Fangarme rings um den Mund. Dahin:

Die Seeanemonen (*Actiniae*), mit weichem, aber doch ziemlich festem, halbkugelförmigem Körper, der unten sich in eine breite Scheibe erweitert, mit welcher sich das Thier festsetzt. Maul oben, wie die Fangarme einziehbar. Kein Kalkstamm. Viele Eierstöcke im Umfange des Magens öffnen sich in diesen, und die Eier werden durch den Mund geböhren. Keine Knospen und häßliche Theilung.

Der Kelkenkorall (*Caryophyllia cristata*) hat einen aufrechten gabelig getheilten Stamm, dessen letzte Enden sich trompetenförmig zur Polypenzelle erweitern; diese mit zackigem Rande und sehr vielen radialen Lamellen. In jeder Zelle ein Polyp, des-

sen Haut sich über die Zelle ausdehnt und das obere Ende des kalkigen Stammes bekleidet; dieser bis 2' hoch, und die Zellen oft 3" weit. Sie halbiren sich, bilden aber keine Knospen. Im rothen Meer.

Zweite Familie. Dodeactinia.

Die Polypen haben 12 kurze, einfache oder gar keine Fangarme, und bilden unter der allgemeinen Haut einen kalkigen Korallenstock, welcher auf seiner ganzen Oberfläche mit vielen kleinen meistens 6strahligen Grübchen bedeckt ist.

Bei *Madrepora* hat der Stamm einen zentralen, 6strahligen Achsenkanal; er ist aufrecht, verästelt, und zeigt völlig sternförmige Zellen.

Bei *Millepora* fehlt der Kanal in der Achse und die Zellen sind bloß rund. Die Polypen haben keine Tentakeln.

Dritte Familie. Octactinia.

Die Polypen haben acht gefiederte, nicht zurückziehbare Arme und eben so viele dünne Eiersäcke, welche sich in den Grund des Magens senken. Dahin:

Der rothe Korall (*Corallium rubrum*). Der rothe, ästig-verzweigte, auf der Oberfläche fein gereifte Korallstock wird von einer weichen Haut überkleidet, in welcher Zellen für die einzelnen Polypen. Mittelmeer; liefert die zu vielen Kunstsachen verarbeiteten rothen Korallmassen.

Der Doldenpolyp (*Umbellularia groenlandica*). Am Ende eines langen, innen kalkigen Stiels, der im Boden des Meeres steckt, stehen viele, weiche, nicht zurückziehbare Polypen, die sich gerad alle gerade ausstrecken und dicht neben einander drängen, sonst aber nach allen Seiten hin im Meere umherspielen. An Island, Grönland, Norwegen.

Das Orgelwerk (*Tubipora musica*), viele mit einer gemeinschaftlichen Basis festfügende Polypen stecken jeder in einer kalkigen Röhre. Diese Röhren dicht neben einander, durch kalkige Querschichten verbunden. Farbe blutroth.

Vierte Familie. Oligactinia.

Die Polypen haben wenige (5—20, selten mehr) einfache, mehr weniger zurückziehbare Fangarme; sie haben keine Eiersäcke, sondern treiben am Stamm Knospen oder Kapselfeln, worin Eier. Dahin:

Der grüne Armpolyp (*Hydra viridis*); ohne Schale, ein kurzer, kolbiger Leib sitzt mit seinem unteren Ende an Wasserpflan-

gen fest, und hat um die obere Mundöffnung 6—8 einfache, weit ausstreckbare Arme; meistens sitzen auch Junge am Stamm. In süßen Gewässern, besonders zwischen Wasserlinsen.

Fünfte Familie. Bryozoa.

Die Polypen haben viele fadenförmige, nicht einziehbare Arme, und stecken gewöhnlich in sehr dünnen durchsichtigen Gehäusen. Jeder hat außer dem Magen noch einen Darm, der neben dem Munde sich öffnet, und einen Eierstock hinter dem Magen. Dahin:

Der Federbuschpolyp (*Alcyonella reptans*) findet sich in unseren süßen Gewässern und erscheint als ein kleines, verzweigtes, horniges Rohr, das an allerlei Gegenständen, besonders alten Pfählen, sich hinwindet, und aus den offenen Enden der Röhren die halbmondförmig gestellten, vielen, fein gefiederten Arme hervorsteckt, allein bei jeder Berührung schnell in das Rohr zurückzieht.

Dreizehnte Klasse.

Infusionsthier, Infusoria.

§. 116. Kleine, mit bloßen Augen kaum sichtbare Thiere, von rundlicher, kugel- oder scheibenförmiger, ovaler, beständig veränderlicher Gestalt (die Fälle ausgenommen, wo der Leib eine harte Schale besitzt), mit einfacher, von beweglichen Wimpern umgebener Mundöffnung, von welcher ein Kanal, der mit vielen blasenförmigen Erweiterungen besetzt ist, entspringt. After vorhanden oder fehlend, oft neben dem Munde keine Eierstöcke; überhaupt keine andern innern Organe. Diese Thiere pflanzen sich durch hälftige Theilung, die entweder der Länge oder der Quere nach geht, fort; entstehen aber auch in Aufgüssen auf organische Materien von selbst, daher ihr Name. Einige stehen, wie die Polypen, auf einem gemeinschaftlichen Stamm, lösen sich aber hernach ab; die Meisten sind immer frei. Man findet diese Thiere zu Millionen in allen, besonders stehenden, Gewässern, worin thierische oder pflanzliche Stoffe in Fäulniß übergehen, daher auch in Cisternen, Brunnentrögen, Regentonnen u. s. w.

Erste Familie. Enteropolygastrica.

Der Darmkanal ist vorhanden, hat 2 Oeffnungen, und viele gestielte Magenblasen. Dahin:

Der *Blumenpolyp* (*Vorticella Convallaria*); er besteht aus einem kriechenden Stamm, woran viele, von langen Stielen getragene, becherförmige Körper, die am freien Rande mit Wimpern (Silien) besetzt sind. Ebenda an einer Stelle Mund und After neben einander; $\frac{1}{12}$ ''' lang. In Wasserpflanzen.

Das *Walzenthierchen* (*Enchelys pupa*) hat eine kolbige Gestalt, Mund am dünnen, After am dicken Ende; $\frac{1}{12}$ ''' lang; gemein. Eine der größten Infusorien.

Zweite Familie. Polygastrica.

Die Thierchen haben keinen Darm, sondern die gestielten Magenblasen gehen unmittelbar von der Mundöffnung aus; es fehlt also allen der After. Dahin:

Die *Monade* (*Monas termo*) hat einen sehr kleinen, runden Leib, mit abgestutzter Mundöffnung, in deren Umfange seine Härchen stehen, die sich beständig bewegen. Das kleinste Thier, von $\frac{1}{2000}$ ''' Durchmesser. Viele Millionen derselben haben in einem Wassertropfen Raum.

Dritte Familie. Agastrica.

Die Thierchen haben keinen deutlichen Mund und keinen deutlichen Magen, daher man sie niemals Nahrung zu sich nehmen sieht; sie sind klar, zeigen aber meistens regelmäßige dunkle Stellen im Innern. Alle bewegen sich langsam und unbeholfen durch Ausstrecken einzelner Stellen des Körpers oder Biegung desselben; die Meisten haben einen glasartigen, aus Kieselerde bestehenden Panzer. — Uebrigens sind die Naturforscher noch nicht einig, ob diese Geschöpfe zum Thierreich oder zum Pflanzenreich gehören; weniggleich die letztere Annahme mehr Gründe für sich zu haben scheint, als die erste. Man würde sie alsdann zu den Cryptogamisten in die Gruppe der Algen stellen müssen.

Das *Stabthierchen* (*Bacillaria paradoxa*), Leib flach, länglich, viereckig prismatisch, an allen Seiten von einer dünnen Schale umgeben. Setzen sich mit dem Ende oder der Seite fest, und hängen reihenweis aneinander.

Zweiter Abschnitt.

B o t a n i k.

§. 117. Die Botanik handelt von den in die zweite Hauptgruppe der organischen Naturkörper (§. 2.) gestellten Wesen, von den Pflanzen. Sie ist mithin die Naturgeschichte des Pflanzenreichs.

§. 118. Pflanzen (plantae) sind alle organischen Naturkörper, denen die willkürliche Bewegung (§. 6.) mangelt.

§. 119. Die Pflanzen bestehen so gut wie die Thiere aus mehreren Organen, welche die Erhaltung jeder einzelnen Pflanze, so wie des ganzen Pflanzenreichs, veranstalten.

§. 120. Zwei Haufen von Organen haben die Pflanzen mit den Thieren gemein, nemlich alle diejenigen, welche sich im Rumpfe befinden (§. 15.); also die Ernährungs- und Fortpflanzungsorgane. Die übrigen, d. h. die Bewegungs- und Empfindungsorgane, fehlen den Pflanzen, und daher kommt es, daß sie ihre Stelle nicht verlassen, so wie Eindrücke von außen nicht wahrnehmen, oder sich derselben bewußt werden können.

§. 121. 1. Die Ernährungsorgane der Pflanzen sind: die Wurzel, der Stengel mit den Zweigen und die Blätter.

a. Wurzel (radix) heißt derjenige Theil der Pflanze, welcher nach unten in den Boden hinabsteigt, und die Nahrung der Pflanzen einsaugt. Sie hat dazu keine Oeffnung, wie die Thiere den Mund, sondern auf der Oberfläche der Wurzel sitzen viele kleine Fasern, die Wurzelfasern (fibrillae), welche mit ihren kolbigen, schwammigen Spitzen den Nahrungsaft einsaugen. Dieser besteht in reinem Wasser, das

aber zugleich Kohlensäure, und die Säfte vermorderter Pflanzen oder Thierstoffe, enthalten muß; wenigstens ist solches Wasser um vieles nahrhafter für die Pflanzen.

Man unterscheidet nach der Form mehrere Arten von Wurzeln; folgende sind die wichtigsten:

Aestig (*ramosa*) heißt die Wurzel, welche sich in mehrere große Zweige spaltet; **faserig** (*fibrosa*), wenn sie aus einem Büschel dünner Fäden besteht; **spindelförmig** (*fusiformis*) wenn sie wie ein dicker, kegelförmiger Fortsatz gerade in die Erde hinabsteigt, z. B. bei der Mohrrübe; bisweilen ist sie mehr birnförmig, wie bei der Rübe, dem Radischen u. a. m.; **knollig** (*tuberosa*) heißt jede Wurzel, die aus einer dichten, fleischigen, saftigen Masse besteht, an deren Oberfläche sich Grübchen mit Keimen befinden. Ist die Wurzel in mehrere solcher Massen getheilt, so heißt jede eine **Knolle** (*tuber*). Die **Zwiebel** (*bulbus*) unterscheidet sich von der Knolle dadurch, daß sie aus mehreren Schichten besteht, und nur einen Keim, bald in der Mitte, bald am Rande, entwickelt; sie ist eigentlich nicht bloß Wurzel, sondern eine Wurzelfasern treibende Knospe.

Der Richtung nach sind die meisten Wurzeln **senkrecht** (*perpendicularis*), einige aber auch **wagerecht** (*horizontalis*), d. h. mit der Oberfläche der Erde gleichlaufend. Rückt mit dieser Wurzel die ganze Pflanze fort, so daß sie in jedem Jahre an einer andern Stelle der Erde vorkommt, so heißt die Wurzel **kriechend** (*repens*), z. B. bei den Farnkräutern. —

Nach dem Alter der Wurzeln hat man folgende Verschiedenheiten:

einjährige (*annuae* ☉) die alle Jahr absterben;

zweijährige (*biennes* ☿), die im zweiten Jahre absterben; z. B. Petersilie, Kummel; und

ausbauernde (*perennes* ♀), die viele Jahre alt werden.

§. 122. **b. Der Stamm** (*truncus*) ist derjenige Theil der Pflanze, welcher sich über die Erdoberfläche erhebt und die äußeren Organe der Pflanze, als Blätter, Blumen und Früchte trägt. Die **Zweige** (*rami*) sind bloße Fortsetzun-

gen desselben, und stimmen mit ihm im Bau und der Ver-
richtung überein. Diese besteht darin, die von der Wurzel
aufgenommenen Säfte in alle Theile der Pflanze, und aus
diesen verändert wieder zur Wurzel zurückzuführen. Sonach
läßt er sich mit dem Blutgefäßsystem der Thiere vergleichen. —

Der Stamm besteht, wie die ganze Pflanze, aus vielen
kleinen zwölfseitigen Zellen, die in der innigsten Verbin-
dung stehen und das Zellgewebe bilden. Zwischen diesen
Zellen verbreiten sich Gefäße, theils zerstreut, theils in Krei-
sen um einander. In diesen läuft der Saft (*succus*) durch
die ganze Pflanze. Bei den mehrjährigen Pflanzen wird
das Zellgewebe mit den Gefäßen zu Holz (*lignum*) da-
durch, daß die Säfte aufhören darin sich fortzubewegen, und
vielmehr eintrocknen. Um das Holz liegt dann außen am
Stamm die Rinde (*cortex*), welche eine bloß aus Zell-
gewebe bestehende Schicht bildet, die sich alljährig mehr ver-
dickt. Zwischen Rinde und Holz steigt der Saft auf, und
geht theils in die Rinde, theils ins Holz über; auf demsel-
ben Wege kehrt er auch wieder zurück. Das Einsaugen und
Aufsteigen des Saftes erfolgt bei unseren Bäumen 2mal des
Jahres, nemlich im April und Juli; ersteres veranlaßt das
Aufbrechen des Laubes und der Blüthen; dieses die Reife
der Frucht. Auch bildet sich bei den mehrjährigen Pflanzen
aus dem übriggebliebenen Saft neues Holz (*Splint*), wel-
ches sich in den Pflanzen mit kreisförmig gestellten Gefäßen
an der äußeren Oberfläche, zunächst unter der Rinde ab-
setzt. Eine solche Holzschicht heißt Jahresring, und nach
deren Menge kann man das Alter des Baumes oder Zweiges
bestimmen.

Man unterscheidet folgende Arten des Stammes:

Der holzige Stamm (*truncus lignosus*, oder bloß
truncus) findet sich bei den Bäumen (*arbor*); strauchar-
tig (*fruticosus*) heißt ein holziger Stamm, der sich gleich
von der Wurzel in viele Aeste spaltet. Eine Pflanze mit sol-
chem Stamm heißt Strauch (*frutex*).

Der weiche, saftige Stamm der einjährigen Pflanzen heißt
Stengel (*caulis*), und die ganze Pflanze Kraut (*herba*);

ist dieser Stengel hohl, und von Zeit zu Zeit mit Anschwellungen, Knoten (*nodi*), versehen, an welchen die Blätter sitzen, so nennt man ihn *Stamm* (*culmus*); trägt ein Stengel bloß Blüthen, so heißt er *Schaft* (*scapus*). Fehlt bei einer krautartigen Pflanze der Stengel, so heißt sie *stengelloß* (*acaulis*); kriecht ein unmittelbar über der Wurzel entspringender Stengel am Boden fort und schlägt dann wieder Wurzel, so heißt er *Schößling* (*stolo*).

Was die Ausbreitungen und Fortsetzungen des Stammes betrifft, so nennt man die größeren *Äste* (*rami*), die kleineren *Zweige* (*ramuli*). Beide entspringen nur an solchen Stellen, wo früher Blätter am Stamm gesessen haben. Bleibt ein Zweig ohne Blätter, ein bloßer spitzer Fortsatz, so heißt er *Dorn* (*spina*); der meistens kleinere *Stachel* (*aculeus*) ist bloß Fortsetzung der Rinde.

Nach der Stellung und Lage unterscheidet man den Stamm wie folgt: *aufrecht* (*erectus*), wenn er ziemlich, und *gerade* (*strictus*), wenn er ganz senkrecht steht; *aufsteigend* (*ascendens*), wenn er erst liegt und dann gerade ist; *liegend* (*procumbens*, *prostratus*, *decumbens*), wenn er immer liegt; *kriechend* (*repens*), wenn er liegt und Wurzeln treibt; *wurzelnd* (*radicans*), wenn er an anderen Körpern in die Höhe kriecht und in diese Wurzeln treibt; *kletternd* (*scandens*), wenn er sich, ohne Wurzeln zu treiben, an anderen Pflanzen aufrichtet; *windend* (*volubilis*), wenn er sich um andere Pflanzen dreht; *schmarotzend* (*parasiticus*), wenn er auf anderen Pflanzen sesshaft ist. — Nach der Form ist der Stamm: *rund* (*teres*), oder *halbrund* (*semi-teres*); oder *eckig* (*angulatus*), wobei die Anzahl der Kanten noch näher durch Zahlen bestimmt wird; oder *geflügelt* (*alatus*), wenn die Ecken in breite, hautartige Lappen hervortreten; *knotig* (*nodosus*), wenn er Anschwellungen hat, aber *enodis*, wo diese fehlen; *gegliedert* (*articulatus*), wenn er deutlich getrennte Abschnitte hat; *hohl* (*listulosus*), wenn er inwendig leer; *fächerig* (*loculosus*), wenn der hohle Stamm durch Scheidewände getheilt ist.

Da die Zweige in den Blattachseln hervordachsen, so stimmt deren Stellung mit der der Blätter überein; es gelten auch von beiden gleiche Ausdrücke, weshalb ich auf Stellung der Blätter nur hinweise. Die ersten Hervorragungen am Stengel, aus welchen die Zweige sich entwickeln, heißen Knospen oder Augen (*gemmae*).

§ 123. c. Das Blatt (*folium*) ist eine Ausbreitung der Pflanzensubstanz in die Fläche. Es besteht, wie der Stamm, aus Gefäßen und Zellgewebe; jene bilden die Rippen (*costae*) oder Blattnerven (*nervi, venae*), dieses die dazwischen liegende Blattsubstanz. Die Farbe der Blätter ist vorzugsweise grün; ihre Verrichtung aber besteht darin, frische Stoffe, nemlich Kohlensäure, aus der Luft einzunehmen, damit diese sich mit dem Saft verbinden; ein Theil derselben, der Sauerstoff, wird nicht verbraucht, sondern an die Luft zurückgegeben. Dieser ganze Hergang erfolgt aber nur am Tage im Sonnenschein, und ist dem Athmen der Thiere zu vergleichen, daher die Blätter mit Recht für die Athmungs-werkzeuge der Pflanzen gelten.

Man unterscheidet an jedem Blatte den Stiel (*petiolus*), oder den Theil, mit welchem das Blatt am Stengel sitzt, und die Blattfläche (*lamina*).

§ 124. Der Stiel ist theils rund (*teres*); theils eckig (*angulatus*); theils rinnenförmig (*canaliculatus*); theils mit seitlichen Hautklappen versehen, geflügelt (*alatus*); theils fehlt er ganz, und dann nennt man das Blatt sitzend (*sessile*); reitend (*equitans*) heißt ein sitzendes Blatt, welches mit zweien Fortsätzen den Stengel umspannt; umfassend (*amplexicaule*), wenn sich diese Fortsätze um den Stamm vereinigen und mit einander verwachsen; herablaufend (*decurrens*), wenn die Blattfläche an den Rändern des Stiels und selbst an den Seiten des Stengels sich fortsetzt.

§ 125. An der Blattfläche unterscheidet man die Gegend, woran sich der Blattstiel setzt, als Grund (*basis*); das gegenüberstehende Ende als Spitze (*apex*), die Mittelfläche als Scheibe (*discus*), die Gegend am Umfange als Saum (*limbus*), und die Gränze des Umfanges als Rand (*margo*).

Hinsichtlich ihrer Stellung heißen die Blätter Wurzelblätter (*solia radicalia*), wenn sie aus der Wurzel entspringen; Stengelblätter (*s. caulina*), wenn sie am Stengel, und blüthenständige Blätter (*s. floralia*), wenn sie in der Nähe der Blume sitzen.

§ 126. Die Stellung der Blätter am Stengel folgt eigentlich immer einer spiralig um den Stamm gewundenen Linie, erscheint jedoch unter sehr verschiedenen Formen. Gegenüberstehend (*s. opposita*) heißen sie, wenn sie in einerlei Höhe an entgegengesetzten Seiten des Stengels sitzen; fallspaarige (*disparia*), wenn solche gegenüberstehende Blätter ungleich sind; verwachsen (*connata*), wenn gegenüberstehende Blätter keinen Stiel haben, sondern mit ihrer Blattsubstanz zusammenhängen, sie heißen auch wohl durchwachsen (*s. perforata*); abwechselnd (*alterna*), wenn in verschiedener Höhe an entgegengesetzten Seiten des Stengels; quirlförmig (*verticillata*), wenn in einerlei Höhe rings um den Stamm; zerstreut (*sparsa*), wenn keine bestimmte Ordnung in ihnen sogleich erkannt wird; gedrängt (*conferta*), wenn sie dicht beisammen stehen; schuppenförmig (*imbricata*), wenn sie einander zum Theil bedecken; dreifach, vierfach u. (*terna, quaterna etc.*), wenn drei oder vier Blätter rings um den Zweig sitzen; zweizeilig (*disticha*), wenn sie in zwei gegenüberstehenden Reihen sitzen; zweireihig, dreireihig u. (*bifaria, trifaria etc.*), wenn die schuppenförmigen Blätter in Reihen stehen; angedrückt (*appressa*), wenn sie sich dicht an den Stamm legen; aufrecht (*erecta*), wenn sie fast senkrecht stehen; abstehend (*patentia*), wenn sie unter einem spitzen Winkel vom Stengel ausgehen; niedergebogen (*reflexa*), wenn sie mehr nach unten gerichtet sind; eingerollt (*revoluta*), wenn sie nach unten; aufgerollt (*involuta*), wenn sie nach oben zurückgerollt sind.

§ 127. Der Form nach werden die Blätter eingetheilt in einfache (*s. simplicia*), und zusammengesetzte (*s. composita*).

Einfache Blätter sind diejenigen, deren Mittelrippe, als Fortsetzung des Blattstiels, ganz von Blattsubstanz umgeben ist. Solche einfache Blätter zerfallen wieder in die ungetheilten (f. indivisa), d. h. solche, wo auch der Saum ganz und nicht durch Einschnitte getrennt ist, und in die getheilten (f. divisa), wo der Saum tiefe Ausschnitte hat.

§ 128. Einfache ungetheilte Blätter sind: das runde Bl. (f. orbiculatum), dessen Durchmesser alle gleich sind; man nennt es schildförmig (peltatum), wenn sich der Blattstiel an die untere Fläche, nicht an den Grund des Blattes, ansetzt. Eiförmig (ovatum) heißt ein Blatt, dessen Basis breiter ist als die Spitze, wie der Durchschnitt eines Eies; elliptisch (ovale s. ellipticum), dessen Basis und Spitze gleiche Breite haben und wo der Längsdurchmesser größer ist als der Querdurchmesser; lanzettförmig (lanceolatum), ein längliches Blatt, dessen Basis und Spitze zugespitzt sind; linienförmig (lineare), ein längliches Blatt mit parallelen Rändern; Schwerdtförmig (ensiforme), ein langes, schmales Blatt, dessen Ränder gegen die Spitze hin sich mehr und mehr nähern; schaufelförmig (spatulatum), ein Blatt, das gegen die Spitze breiter wird; herzförmig (cordatum), ein dreieckiges Blatt, dessen Seitenränder geschweift und dessen Grund ausgebuchtet ist; geigenförmig (panduraeforme), ein Blatt, dessen Seitenränder tief ausgebuchtet sind; pfeilförmig (sagittatum), ein gleichschenkelig dreiseitiges Blatt, dessen Grund einen einspringenden Winkel hat; pfriemenförmig (subulatum), ein etwas dickes, schmales Blatt, das allmählig in eine Spitze ausläuft; winkelige Blätter (f. angulata), d. h. solche, deren Rand winkelförmig gebogen ist, unterscheidet man nach der Anzahl der Winkel, als dreiseitig (triangulare), vierseitig (quadrangulare), sowohl quadratisch (quadratum) als rechteckig (oblongum s. rectangulare), fünfeckig (quinguangulare) u. s. w. Ein dreiseitiges Blatt, an dessen eine Ecke (eigentlich Basis) sich der Blattstiel ansetzt, heißt keilförmig (cuneatum).

§. 129. Die einfachen getheilten Blätter (folia simplicia divisa) lassen sich wieder nach der Richtung der Einschnitte in 2 Gruppen bringen, insofern die Einschnitte

theils gegen die Basis, theils senkrecht gegen den Mittelnerven gerichtet sind.

Zur ersten Form gehören: das lappige Blatt (f. lobatum), mit Einschnitten, die bloß den Saum theilen; man zählt dabei die Lappen und bestimmt das Blatt näher, als zwei-, drei-, vier- u. lappig (f. bi-, tri-, quadri- etc. lobatum); das handförmige Bl. (f. palmatum), mit 5, 7 oder 9 tief getheilten Lappen; das doppelt handförmige Bl. (f. duplicato-palmatum), wenn diese Lappen wieder durch Einschnitte getheilt sind; fächerförmig (flabelliforme), wenn das Blatt keilsförmig ist, und die Einschnitte nur den abgestuften Endrand theilen, aber tief sind; das zweitheilige (f. partitum), ein Blatt, das der Länge nach gespalten ist; gabelförmig (f. dichotomum), wenn die Lappen wieder der Länge nach gespalten sind u. s. f.

Zur zweiten Form gehören; das buchtige Blatt (f. sinuatum), wenn ein Blatt am Rande rundliche Ausschnitte hat; das eingerissene (f. laciniatum), wenn unregelmäßige Einschnitte da sind; das leierförmige (f. lyratum), wenn ein, gegen die Spitze hin breiteres Blatt durch solche Einschnitte getheilt ist; fiederspaltig (f. pinnatifidum), wenn das Blatt parallelrandig ist und die von den Einschnitten gebildeten Lappen alle gleich sind. Diese Theilung wiederholt sich wohl an den Lappen, dann heißen die Blätter, nach der Zahl der Wiederholungen, doppelt, dreifach u. fiederspaltig (bi-, tri-, etc. pinnatifidum).

§. 130. Die zusammengesetzten Blätter (folia composita), d. h. diejenigen, bei welchen der Mittelnerv keine Blattsubstanz neben sich hat, vielmehr den gemeinschaftlichen Stiel (petiolus communis) des ganzen Blattes bildet, zeigen dieselben Grundformen, wie die getheilten Blätter; denn entweder sitzen die einzelnen Blätter, Blättchen (foliola) genannt, alle am Ende des gemeinsamen Blattstieles, oder der Reihe nach an beiden Seiten.

Unter die erstere Form gehören: das gezweigte Blatt (f. binatum s. conjugatum), wo 2 gleiche Blätter am Ende des Stieles sitzen, das doppelt gezweigte (bigeminatum),

wo zwei Blätterpaare am Ende des Blattstiels stehen, und das dreifach gezweigte (*trigeminatum*), wo drei solcher Paare vom Ende des Blattstiels getragen werden. Auf dieselbe Weise giebt es ein einfach gebreites oder Drillingblatt (*f. ternatum*), ein doppeltes Drillingblatt (*f. bi-ternatum*) und ein dreifaches Drillingblatt (*f. tri-ternatum*). Auch das fünffache (*f. quinatum*) und siebenfache oder gefingerte (*f. digitatum*), so wie das gefuhte Bl. (*f. pedatum*) gehören hierher, bei welchem letzteren der am Ende gabelich getheilte Stiel am Innenrande der Gabel 5—9 Blättchen trägt.

Unter die zweite Form kommen alle gefiederten Bl. (*f. pinnata*). Schlechtweg gefiedert heißt jedes Blatt, das gegenüberstehende Blättchen am Hauptstiel trägt; jedes dieser Blattpaare heißt Foch (*jugum*), und nach der Anzahl der Föche das Blatt zweiföchig (*bijugum*), dreiföchig (*trijugum*) u. s. w. Steht ein unpaares Blatt am Ende, so heißt es unpaarig gefiedert (*impari-pinnatum*), wo nicht paarig gefiedert (*abrupte-pinnatum* s. *pari-pinnatum*). Ist statt des unpaaren Endes ein spirallig gewundener Faden, eine Ranke (*cirrus*) da, so heißt das Blatt rankend gefiedert (*cirroso-pinnatum*). Theilt sich ein Blattstiel gabelförmig, und bildet jede Zinke der Gabel ein gefiedertes Blatt, so heißt das ganze Blatt verbunden gefiedert (*conjugato-pinnatum*). Gefingert-gefiedert (*digitato-pinnatum*) ist dieselbe Form, aber das Ende des Stieles läuft in mehr als 2, meistens 5—7, Nebenstiele aus. Sind die Blättchen eines gefiederten Blattes wieder gefiedert, so heißt das ganze Blatt doppeltgefiedert (*bipinnatum*), auch dreifach und vierfach (*tripinnatum*, *quadripinnatum*) gefiederte Blätter kommen vor. Noch mehr gefiederte Blätter, deren Blättchen gewöhnlich schon ungleiche Größe und Zusammensetzung haben, nennt man überzusammengesetzt (*supradecompositum*).

§. 131. Außer der Form des ganzen Blattes sind noch die verschiedenen Abänderungen des Grundes, Randes, der Spitze und Blattfläche von Wichtigkeit.

Der Grund heißt abgestutzt (*f. truncatum*), wenn

er durch eine grade Linie begränzt ist; ausgerandet (emarginatum), wenn er an der Anheftungsstelle des Blattstieles einen Ausschnitt hat; geohrt (auriculatum), wenn er neben dem Blattstiele in 2 kleine, runde Lappen erweitert ist.

Der Rand ist ohne Auszeichnung, ganzrandig (integerrimus), wenn er eine in gleicher Richtung fortlaufende Linie beschreibt; gezähnt (dentatus), wenn er Einschnitte hat die stumpf sind, die Zähne dazwischen aber spiz; gekerbt (crenatus), wenn die Einschnitte spiz, die Zähne stumpf sind; gesägt (serratus), wo beide spiz sind; wimperig (ciliatus), wenn seine Haare am ganzen Rande sitzen.

Der Spitze nach heißt ein Blatt schlechtweg spiz (acutum), wenn die Ränder in einen spizen Winkel zusammenstoßen; zugespizt (acuminatum), wenn diese Spitze noch besonders hervorgezogen ist; feinzugespizt (cuspidatum), wenn die verlängerte Spitze sehr lang ist; dolchspizig (mucronatum), wenn ein abgerundetes Blatt noch eine feine Spitze hat; stumpf (obtusum), wenn die Spitze abgerundet ist; abgebissen (praemorsum), wenn es einen tiefen Ausschnitt hat.

Die Verschiedenheiten der Fläche rühren theils von der Blattsubstanz selbst, theils von fremden darauf ruhenden Theilen her. Formen der ersten Art sind: das krause Bl. (f. crispum), wenn der Rand weiter ist als die Fläche; das runzelige (rugosum), wenn die Blattsubstanz zwischen den Rippen sich erhebt; gefaltet (plicatum), wenn es der Länge nach in Falten gelegt ist; kielförmig (carinatum), wenn das Blatt der Länge nach zusammengeschlagen ist und nach unten also einen Kiel bildet; glatt (laeve), wenn solche Verschiedenheiten fehlen; glänzend (nitidum), wenn die Blattfläche spiegelt.

Ein Blatt, auf welchem keine Haare stehen, heißt haarlos (glabrum); rauh (scabrum), wenn es mit sehr kleinen aber steifen bloß fühlbaren Haaren besetzt ist; haarig (pilosum), wenn auf der Oberfläche einzelne lange Haare stehen; zottig (villosum), wenn es sehr lange büschelweis, gedrängte weiche Haare hat; weichhaarig (pubescens)

wenn die Haare klein, weich und fein sind; seidenartig (*sericeum*), wenn die kleinen Haare dicht anliegen und seidenartig glänzen; wollig (*lanatum*), wenn die Haare lang und gleichförmig dicht, auch wohl gekräuselt sind; filzig (*tomentosum*), wenn die Haare sehr dicht stehen und fest in einander verwebt sind; bestäubt (*farinosum*), wenn ein mehrlartiger Staub auf der Oberfläche liegt; pollinosum, wenn dieser Staub gelb ist; bereift (*pruinoseum*), wenn ein weißer Hauch die Oberfläche bekleidet; beschuppt (*lepidotum*), wenn kleine Schuppen auf der Oberfläche liegen; warzig (*papillosum*), wenn das Blatt kleine, fleischige Warzen hat; drüsig (*glandulosum*), wenn helle, etwas erhabene Punkte mit einem schwarzen Mittelpunkt auf dem Blatte stehen; klebrig (*glutinosum*), wenn ein im Wasser löslicher Leim das Blatt überzieht; harzig (*viscosum*), wenn dieser klebrige Ueberzug im Wasser unlöslich ist.

Nach der Substanz des Blattes endlich unterscheidet man: das häutige Bl. (*f. membranaceum*), wenn es dünn und fein ist; das lederartige (*coriaceum*), wenn es steifer und dicker ist; das fleischige (*carnosum*), wenn es aus einem dicken, saftigen Zellgewebe besteht; das hohle (*fistulosum*), wenn es eine Röhre bildet; das trockne (*scariosum*), wenn es ganz oder zum Theil vertrocknet ist.

§. 132. II. Die Fortpflanzungsorgane der Gewächse haben den Zweck, für die Erhaltung einer ganzen Pflanzengruppe Sorge zu tragen, und Keime zu bilden, aus welchen, wenn die alten Pflanzen absterben, junge Pflanzen entstehen können. Sie finden sich in der Blume, deren Bau wir also zunächst untersuchen müssen.

Eine vollkommene Blume (*flos*) besteht aus mehreren Kreisen von Blättern, die an einer Achse übereinander befestigt sind. Diese Achse, also auch die ganze Blume, wird vom Blumenstiel (*pedunculus*) getragen. Meistens erweitert er sich kolbenförmig und bildet eine Endfläche, auf welcher die Blume und später die Frucht ruht; man nennt diese Fläche deshalb Fruchtboden (*receptaculum*).

Der äußerste Kreis der Blätter bekommt den Namen

Kelch (calyx); er ist, wie die Blätter, grün gefärbt, und stimmt mit ihnen auch in der Art des Ueberzuges überein.

Der zweite Kreis, die Blumenkrone (corolla), unterscheidet sich außerdem durch die bunte Farbe vom Kelch; die Blätter stehen in der Regel so, daß sie die Zwischenräume zwischen den Kelchblättern ausfüllen.

Der dritte Kreis ist weniger blattförmig. Er besteht aus den Staubgefäßen (stamina), deren jedes ein dünner Faden (filamentum) ist, der am Ende einen Beutel (anthera) trägt, in welchem viele feine Körnchen, die Blumenstaub (pollen) heißen, eingeschlossen sind. In vielen Fällen bilden die Staubgefäße mehrere Kreise übereinander.

Der vierte Kreis der Blätter, oder der Stempel (pistillum), ist ein ein- oder mehrfacher stielsförmiger Fortsatz, der unten einen Knopf bildet, welcher Fruchtknoten (germen) heißt; weil aus ihm die Frucht entsteht. Dieser Fruchtknoten ruhet allemal auf dem Fruchtboden, und entsteht dadurch aus dem vierten Blätterkreise, daß die Blätter desselben am Rande mit einander verbunden bleiben, und so eine Höhle bilden. Von der Spitze des Fruchtknotens entspringt ein dünner Fortsatz, der Griffel oder Staubweg (stylus), welcher nach oben in einen kleineren Knopf, oder in einen oder mehrere Fäden ausläuft, die man Narben (stigmata) genannt hat.

Dies sind die Theile einer vollkommenen Blume. Häufig fehlt die Blumenkrone (s. *apetalus*), und dann ist der Kelch allein vorhanden. In diesem Zustande heißt er schlechtweg Blumenhülle (perigonium), oder corollinischer Kelch (calyx corollinus), wenn er bunt gefärbt ist. Fehlen beide Blätterkreise, so heißt die Blume nackt (s. *nudus*); fehlen bloß die Staubgefäße, so heißt sie weiblich (s. *femineus*), fehlen bloß die Stempel, so nennt man sie männlich (s. *masculus*); fehlen endlich beide inneren Theile, die Staubgefäße mit den Stempeln, so heißt die Blume unfruchtbar (*sterilis*); sind sie vorhanden, so wird sie in Bezug auf die Anwesenheit dieser Theile Zwitterblume (s. *hermaphroditicus*) genannt.

§. 133. Die Stellung der Blumen, welche man mit dem Namen des Blüthenstandes (inflorescentia) bezeichnet, zeigt manche Verschiedenheiten. Ursprünglich steht eigentlich jede Blume in der Achsel eines Blattes, d. h. da, wo das Blatt am Stengel sitzt, achselständig (axillaris); doch kann dieses Blatt auch das letzte am Stengel sein, und dann steht die Blume auch am Ende des Stengels, gipfelständig (terminalis). Das Blatt, welches unter der Blume steht, verändert gemeinlich seine Form und Größe, bisweilen sogar seine Farbe, und heißt darn Stütz-, Hüll- oder Deckblatt (bractea), auch, wie früher bemerkt wurde, blumenständiges Blatt (fol. florale).

Trägt ein Blumenstiel nur eine Blume, so heißt er einblumig (p. uniflorus); mehrere Blumen zählt man, und benennt den Stiel danach zwei-, drei-, vier- u. und vielblumig (bi-, tri-, quadri- etc. multiflorus). Sitzen an einem viele Blumen tragenden Stengel die einzelnen Blüthen auf besonderen Stielen in Reihen und frei, so heißt der Blüthenstand eine Traube (racemus); stehen die Blumen dicht gedrängt und ungestielt in Reihen am Ende des gemeinsamen Stieles, so heißt der Blüthenstand eine Aehre (spica); die Reihen nennt man Zeilen (stichis), und darnach die Aehre ein-, zwei- u. zeilig (mono-, di- etc. sticha); stehen an jeder Stelle nicht einzelne Blumen, sondern wieder viele, auf einem kurzen Nebenblumenstiel ährenförmig gestellte, Blüthen, so nennt man diese Aehrchen (spiculae) und die ganze Aehre zusammengesetzt (sp. composita): der gemeinschaftliche Stiel heißt die Achse (axis s. rachis). Ist der gemeinschaftliche Blumenstengel regelmäßig verästelt, und tragen die Nebensterke mehrere Blumen oder Aehrchen, so nennt man den Blüthenstand eine Rispe (panicula). Ist die Achse einer Aehre dick und fleischig, so heißt der Blüthenstand Kolben (spadix), und das große Hüllblatt am Grunde des Kolbens Blumen Scheide (spatha). Ist die Achse dünn, ungestielt, am Grunde artikulirt, und stehen die Blumen gedrängt, unter Schuppen so dicht nebeneinander, daß man die einzelnen kaum unterscheiden kann, so giebt dies das Räh-

chen (amentum); ist die allgemeine Form desselben kugelig, so nennt man's Knopf (capitulum), ist sie länglicher unregelmäßiger, Büschel (fasciculus). Hat ein Rähchen holzige, dicht anliegende Schuppen über den Hüllblättchen jeder einzelnen Blume, so heißt diese Form Zapfen (strobilus).

Eine Traube, deren Blüthen ziemlich eine Ebene bilden, heißt Doldentraube (corymbus) oder Schirm. Eine Rispe dagegen, deren Blüthen in einerlei Höhe stehen, heißt Austerdolde (cyma). Stehen aber die einzelnen Blüthenstiele an der Spitze des gemeinschaftlichen strahlenförmig, und haben sie dabei ungleiche Länge, so daß die mittleren die kürzesten, die äußersten die längsten sind, und alle Blumen in einer Ebene liegen, so heißt der Blüthenstand eine Dolde (umbella), oder zusammengesetzte Dolde (umb. composita), wenn die Nebenblüthenstiele an ihrer Spitze viele Blumen auf ungleichen Stielen in gleicher Höhe tragen, so daß alle in derselben Ebene liegen. Die Dolden haben häufig sowohl am Grunde der ersten, als auch der zweiten Nebienstiele einen Kranz von Stützblättern, der den Namen der Hülle (involucrum) vorzugsweise erhält; jener heißt allgemeine Hülle (involucrum universale), dieser besondere Hülle (i. partiale) oder Hüllchen (involucellum).

§. 134. Nicht geringere Verschiedenheiten, als die so eben dargelegten der Blüthenstellung, gewahren wir bei Betrachtung der einzelnen Blumentheile.

Was zuerst den Kelch betrifft, so besteht er bald aus einem, bald aus mehreren Blättern (sepala s. phylla). Er ruhet bald unmittelbar auf dem Fruchtboden, den Fruchtknoten mit einschließend, und heißt dann unterständig (calyx inferus), oder er sitzt auf dem Fruchtknoten, oberständig (c. superus). Seiner Form nach ist er röhrig (tubulosus), glockenförmig (campanulatus), becherförmig (urceolatus), trichterförmig (infundibuliformis), eckig (angulatus), blasig (inflatus s. tumidus) u. s. w. Der einblättrige Kelch ist am Rande meistens eingeschnitten, nach der Anzahl der Einschnitte heißt er ein-, zwei- u. zählig (uni-, bi- etc. dentatus); sind diese Zähne ungleich, so heißt er

unregelmäßig (*irregularis*), und bilden die ungleichen Zähne zwei gegenüberstehende Hauptlappen, so wird er zweilippig (*bilabiatus*) genannt.

Die Blumenkrone betreffend, so wiederholen sich bei ihr fast alle Formen des Kelches. Sie ist, wie jener, bald einblättrig (*corolla monopetala*), bald mehrblättrig (*c. polypetala*); jedes Blatt heißt Blumenblatt (*petalum*) und sein Stiel, wenn es einen hat, Nagel (*unguis*). Steht die Krone frei unter dem Fruchtknoten, so heißt sie *c. hypogyna*, verwächst sie mit dem Kelch *c. perigyna*, steht sie mit diesem auf dem Fruchtknoten *c. epigyna*.

Die einblättrige Blumenkrone zeigt alle genannten Formen des Kelches. Bei diesen Formen unterscheidet man den unteren verengten Theil als Rohr (*tubus*), und die obere, meistens in Lappen getheilte, Ausbreitung als Saum (*limbus*); wo beide an einander gränzen ist der Eingang, Rachen (*faux*) genannt, welcher bisweilen von kleinen Schüppchen, Gewölbe (*fornix*), geschlossen (*clausa*) ist, oder offen steht (*pervia*), und dann einen vorspringenden aufrechten Rand, Kranz (*corona*), haben kann. Radförmig (*rotata*) heißt eine einblättrige Blumenkrone, bei welcher Rohr und Saum allmählig in einander übergehen und ziemlich flach ausgebreitet liegen; präsentirtellerförmig (*hypocrateriformis*) wo das Rohr sehr lang und eng, der Saum aber breit und plötzlich flach ausgebreitet ist. Rachenförmig (*c. ringens*) nennt man die Blumenkrone, wenn sie 2 Hauptlippen (*labia*) hat, und maskirt (*personata*), wenn der Eingang einer solchen durch die gewölbte Unterlippe geschlossen ist; gespornt (*calcarata*), wenn sie am Grunde einen längeren oder kürzeren hohlen Fortsatz, Sporn (*calcar*), hat; zungenförmig (*ligulata*), wenn sie nach einer Seite hin in einem flachen, blattsförmigen Fortsatz ausgebreitet ist.

Die Staubgefäße zeigen wenige Verschiedenheiten. Bisweilen fehlt der Faden, dann heißt der Beutel sitzend (*anthera sessilis*), häufiger fehlt der Beutel, dann nennt man den Faden unfruchtbar (*s. sterile*). Der Faden ist meistens rund (*teres*), bisweilen flach, blattartig, oder eckig und lanzettförmig, meistens ist er einfach, mit-

unter verzweigt; in den meisten Fällen sitzt an ihm der Beutel mit einem Ende fest (a. erecta), seltener mit der Seite, hängend (a. pendula). Der Beutel besteht aus 2 Fächern (loculi), die in der Regel wieder durch eine Scheidewand getheilt sind. Diese Fächer öffnen sich bald mit Klappen (valvulae), bald zerreißen sie (dehiscentes).

Der Stempel ist unter allen Organen der Blume dasjenige, welches die meisten Verschiedenheiten zeigt. So ist die Narbe bald knöpförmig (capitatum), bald fadenförmig (filiforme), bald einfach (simplex), bald in mehrere gleiche Fortsätze gespalten (fissum), deren Zahl näher angegeben wird. Auf ihrer gegen die Mitte vertieften und durchbohrten Oberfläche hat sie einen drüsenartigen Ueberzug; an welchem die Blumenstaubkörnerchen festkleben, ihren Inhalt, eine schleimartige Flüssigkeit, in der Gestalt eines langen dünnen Schlauches hier ergießen und ihn durch die Oeffnung der Narbe und den Kanal des Griffels in die Höhle des Fruchtknotens senden, woselbst er mit den Eierchen in Verbindung tritt und dadurch die Entwicklung des Fruchtknotens zur Frucht bedingt; ohne diese Vermischung des Pollenschlauches mit den Eierchen entsteht kein Saame, und die mangelnde Entwicklung so vieler Blumen zu Früchten hat hierin ihre Ursache.

Der Staubweg fehlt vielen Blumen, und dann sitzt die Narbe unmittelbar auf dem Fruchtknoten; in anderen Fällen ist derselbe außerordentlich lang. Ist er einfach, so hat er in der Mitte einen Kanal, der in die Höhle des Fruchtknotens führt; ist er gespalten, so liegt der Eingang in den Fruchtknoten am Grunde der einzelnen Fäden. Oft nehmlich nimmt er an dererspaltung der Narbe Antheil, und ist dann in eben so viele Fäden, als sie in Lappen, getheilt.

Der Fruchtknoten besteht aus 4 Theilen: 1) einer äußeren, grünen, blattartigen Hülle, der späteren Fruchthülle (pericarpium), unter welcher 2) die Keime der Saamen, die Eierchen (ovula), enthalten sind. Vermitteltst eines Fädchens, 3) des Nabelstranges (funiculus umbilicalis), sitzen sie an einer verdickten Stelle der inneren Höhle des Fruchtknotens fest. Diese Verdickung heißt 4) Mutter-

fuchen (placenta), und befindet sich da, wo die Blätter der Fruchthülle mit ihren Rändern verwachsen sind und äußerlich eine Falte, eine Art von Naht (sutura), bilden.

§. 135. In vielen Blumen bemerkt man, außer den genannten Theilen, noch eigene drüsenartige Körper, welche, weil sie Honig absondern, Honiggefäße (nectaria) genannt werden. Sie sitzen oft an anderen Theilen, z. B. am Kelch, oder an der Blumenkrone, besonders im Sporn; in anderen Fällen stehen sie frei, innerhalb der Blumenkrone, zwischen ihr und den Staubfäden. Linne bezeichnete übrigens mit dem Namen Honiggefäße alle eigenthümlich gestalteten Theile der Blume, welche weder Kelch, noch Blumenkrone, noch Staubfäden, noch Stempel sind, selbst dann, wenn sie gar keinen Honig absondern, und viele Botaniker sind ihm darin gefolgt. So zeigen denn die Honiggefäße, in dieser Ausdehnung genommen, sehr viele Verschiedenheiten in Gestalt, Lage und Verrichtung, welche zum Theil bei Beschreibung von Blumen, die solche Organe besitzen, hervorgehoben werden sollen.

§. 136. Hat die Thätigkeit der Blüthe, welche, wie wir gesehen haben, in der Verbindung des Pollenschlauches mit den Eierchen ihr Ziel findet, dieses erreicht, so ist die Blume nun nutzlos, ihre Theile fallen daher ab, und nur der Fruchtknoten bleibt übrig. Aus diesem entwickelt sich die Frucht (fructus). Man findet an ihr die vier Theile des Fruchtknotens wieder, doch alle mehr ausgebildet und zum Theil verändert. Die Fruchthülle oder das Perikarpium ist theils blattartig, theils holzig, theils fleischig, theils aus einer fleischigen und einer holzigen Schicht gebildet, und umschließt bald eine, bald mehrere Höhlen, Fächer (locula) genannt. Sind mehrere Höhlen da, so werden dieselben durch Scheidewände (dissepimenta s. parietes) getrennt, und man erkennt gewöhnlich schon auf der Oberfläche der Frucht die Anzahl derselben an den Nähten, in welchen die Blätter der Fruchthülle mit einander verwachsen sind. Fehlen die Scheidewände, was bisweilen der Fall ist, so sitzen die Mutterfuchen an den Nähten, (placenta peripherica)

sind sie vorhanden, so befinden sich die Mutterkuchen theils an der Scheidewand (pl. parietalis, wandständig), theils im Mittelpunkt, wo sich die Scheidewände treffen (pl. centralis, mittelständig).

Was die Formen der Früchte betrifft, so hat man folgende zu unterscheiden:

I. Einfache Früchte (fructus simplices). Die Fruchthülle besteht nur aus einem Blatt.

1. Weichfrucht (caryopsis), eine einsamige Frucht, bei welcher das häutige Perikarpium mit der Oberhaut des Samens verwachsen ist. — 2. Nüßchen (achenium), eine einsamige Frucht, deren pergamentartige Hülle eng um den Samen liegt, aber noch nicht mit seiner Oberhaut verwachsen ist. — 3. Nuß (nux), eine einsamige Frucht mit holzigem Perikarpium, die unten in eine Hülle, dem Nüßchen (cupula), steckt. — 4. Steinfrucht (drupa), eine einsamige Frucht, deren Perikarpium inwendig holzig und außerhalb fleischig ist. — 5. Balg (folliculus) eine mehrsamige Frucht, deren trockenes Perikarpium eine Naht hat, an welcher die Samen sitzen. — 6. Hülse (legumen) unterscheidet sich nur durch die Anwesenheit einer zweiten Naht, aber die Samen sitzen alle an einer. —

II. Zusammengesetzte Früchte (fructus multiplices). Die Fruchthülle besteht aus mehreren Blättern und enthält in der Regel mehrere Fächer.

7. Schoote (siliqua), eine langgestreckte trockene Frucht mit 2 Nähten und einer Scheidewand von einer Naht zur andern; an den beiden Nähten sitzen die Samen. — 8. Kapsel (capsula), jede rundliche zusammengesetzte Frucht mit trockner Hülle; bisweilen fehlen die Scheidewände, und die Kapsel ist dann einfächerig (unilocularis), gewöhnlich mehrfächerig (multilocularis). — 9. Orange (aurantium), hat eine lederartige Hülle, und ein saftiges Zellgewebe in den Fächern, das die am mittleren Mutterkuchen sitzenden Samen umschließt. — 10. Kürbis (pepo), eine fleischige Frucht mit saftigem Zellgewebe in den Fächern, deren Mutterkuchen an der ganzen Innenfläche der Perikarpiumblätter

liegen. — 11. Apfel (*pomum*), eine fleischige Frucht mit mehreren hohlen Fächern im Innern, worin die Samen. — 12. Steinbeere (*nucularium*), eine mehrsamige Steinfrucht, die theils freie, theils zusammengewachsene Steinchen enthält. — 13. Beere (*bacca*) nennt man jede ganz fleischige Frucht, deren Samen ohne besondere Hülle im Fleische selbst liegen. Sie ist theils eine einfache (*b. simplex*) und dann entweder einsamig (*b. monosperma*) oder mehrsamig (*b. polysperma*), in welchem Falle sie bald einen zentralen (*Vaccinium*), bald zwei oder mehrere periphereische Placenten (*Ribes*) haben kann; theils eine zusammengesetzte (*b. composita*), d. h. aus vielen einfachen verwachsenen Beeren entstandenen Frucht (*Rubus*). Im letzteren Falle sind die einzelnen Beeren in der Regel bloß einsamige.

§. 137. Unter allen Theilen der Frucht ist der Same (*semen*) der vorzüglichste und wichtigste. Er entsteht aus dem Eichen durch eine mannigfache Reihe von Entwicklungen, deren einzelne Stufen, wegen der Kleinheit des Gegenstandes, schwer begriffen werden, daher wir diesen so interessanten Theil hier unberücksichtigt lassen müssen. Bisweilen steckt der Same innerhalb der Fruchthülle noch in einer feinen, nehartigen Haut, die vom Nabelstrange ausgeht, dem Mantel (*arillus*). Am reifen Samen unterscheidet man die Stelle, wo sich der Nabelstrang ansetzt, als Nabel (*umbilicus* s. *hilum*). Theile des Samens bemerkt man vier: 1) die äußere Bedeckung des Samens, sie bildet eine dicke, meistens gefärbte Haut, Schale (*testa*) genannt. Unter dieser liegt bei sehr vielen Samen 2) ein fleichiger, mehlig oder hornartiger Körper, das Eiweiß (*albumen*), welches den Hauptnahrungstoff der Samen enthält, und immer, selbst bei den giftigsten Gewächsen, unschädlich ist. Vielen Samen, z. B. unseren Hülsenfrüchten und Obstsamen, fehlt es; in anderen, z. B. den Getreidekörnern, ist es sehr groß. An, in oder neben dem Eiweißkörper, oder wo dieser fehlt, unmittelbar unter der Schale, liegt 3) der meist große, fleischige Samenlappen (*cotyledon*), mit welchem 4) der Keim (*embryo*), welcher aus dem Federchen (*plumula*) und dem Würzelchen (*radicula*) besteht, zusammenhängt.

Der Samenlappen ist bald einfach (Monocotyledones), bald doppelt (Dicotyledones), und erscheint im ersten Falle als eine, im letzteren als zwei meistens halbkugelförmige oder flache, rundliche oder gestreckte Schuppen, unter der, oder zwischen welchen, die Theile des Keimes liegen. Sie bilden zusammen einen oben flachen, nach unten zugespitzten Theil, der sowohl mit dem einfachen, als auch mit dem doppelten Samenlappen in Verbindung steht. Der obere, flachere, bisweilen am Rande gekerbte Theil ist das Federchen, der untere zugespitzte bildet das Würzelchen. Beide werden immer von dem Samenlappen verdeckt, und dieser liegt entweder unmittelbar unter der Samenhaut, oder neben dem Eiweißkörper, von ihm zum Theil umgeben. —

§. 138. Gelangt nun ein solches Samenkorn in den für ihn bestimmten Boden, so zieht es aus seiner Umgebung Feuchtigkeit an sich, und dehnt sich vermittelt derselben aus, quillt. In Folge dieser Ausdehnung platzt die Samenhülle, dann bringt die Spitze des Würzelchens zuerst aus dem Samen hervor, und steigt nun, der Same mag aufrecht oder verkehrt in der Erde liegen, jedesmal senkrecht nach unten hinab. Sein entgegengesetztes Ende, das Federchen, sucht den entgegengesetzten Weg, und erhebt sich theils allein, theils mit den Samenlappen zugleich, über die Oberfläche. Hier im Lichte entfalten sich dann die Samenlappen, das Federchen wächst zwischen ihnen hervor, entfaltet sich ebenfalls, bildet Blätter, und demnächst einen aufwärts strebenden Schößling. Sobald die ersten Blätter gebildet sind, vertrocknen die nach und nach blattartig gewordenen Samenlappen. Dieser ganze Hergang heißt Keimung (*germinatio*).

Da alle Pflanzen Samen oder samenartige Körper hervorbringen, so können sich natürlich alle durch Samen fortpflanzen. Es ist dies aber noch auf eine andere Weise möglich, nemlich durch Stecklinge. Schneidet man einen jungen Trieb einer mehrjährigen Pflanze ab, steckt ihn in die Erde, und sucht ihn gegen äußere Schädlichkeiten zu schützen, so schlägt er in der Regel Wurzeln, und bildet sich zu einer Pflanze derselben Art aus. Bei einjährigen Pflanzen findet

diese Methode jedoch keine Anwendung. Viele mehrjährige Gewächse pflanzen sich freiwillig auf diese Art fort, indem sie aus der Wurzel, oder aus dem Stamm Fortsätze, Schößlinge (stolones), treiben, die eigene Wurzeln entwickeln, und sich nach und nach zu selbstständigen Individuen ausbilden. Hierdurch erhält man eine leichte Methode, die Bäume und anderen Gewächse zu vervielfältigen.

§. 139. Wie die Thiere, werden auch die Pflanzen nach der Verschiedenheit gewisser Organe in Gruppen eingetheilt, welche zusammen das System der Pflanzen bilden. Unter allen Eintheilungen ist keine, welche so allgemeine Anerkennung gefunden hat, als die des schwedischen Naturforschers Linne, welcher das Pflanzenreich nach den Verschiedenheiten der Staubgefäße in 24 Klassen, und jede nach der Bildung der Stempel und einiger anderen Organe in mehrere Ordnungen eintheilte. Sein System ist folgendes:

I. Pflanzen mit deutlich sichtbaren Blumen. Phanerogamia.

A. Staubgefäße und Stempel in einer Blume. Monoclinia.

a. Staubgefäße mit keinem anderen Theile verwachsen.

† Alle von gleicher Länge.

Ein Staubgefäß.	1. Klasse Monandria.
Zwei Staubgefäße	2. — Diandria.
Drei —	3. — Triandria.
Vier —	4. — Tetrandria.
Fünf —	5. — Pentandria.
Sechs —	6. — Hexandria.
Sieben —	7. — Heptandria.
Acht —	8. — Octandria.
Neun —	9. — Enneandria.
Zehn —	10. — Decandria.

Zehn bis zwanzig Staubgefäße. 11. — Dodecandria.

Zwanzig und mehrere Staubgefäße,
die am Kelch sitzen. 12. — Icosandria.

Zwanzig und mehrere Staubgefäße
auf dem Fruchtboden sitzend 13. — Polyandria.

†† Von ungleicher Länge.

Zwei lange und zwei kurze. 14. — Didynamia.

Vier lange und zwei kurze. 15. — Tetradynamia.

b. Staubfäden unter sich verwachsen.

In einen Ring 16. — Monadelphia.

- In zwei Bündel 17. — Diadelphia.
 In mehrere Bündel 18. — Polyadelphia.
 c. Staubbeutel verwachsen.
 Unter sich in einen Ring. 19. — Syngenesia.
 Mit dem Stempel 20. — Gynandria.
 B. Staubgefäße und Stempel in verschie-
 denen Blumen. Diclinia.
 Beide Blumen auf einem Stamm. 21. — Monoecia.
 Beide Blumen auf verschiedenen
 Stämmen 22. — Dioecia.
 Männliche oder weibliche Blumen
 mit Zwitterblumen auf dem
 selben Stamm. 23. — Polygamia.
 II. Pflanzen ohne sichtbare Blumen . . 24. — Cryptogamia.

Wir wollen nun aus allen diesen Klassen einige einhei-
 mische, oder besonders wichtige Pflanzen durchgehen.

Erste Klasse. Monandria.

§. 140. Hierher alle Pflanzen mit deutlich sichtbaren
 Blumen, in welchen sich nur ein Staubgefäß vorfindet. Diese
 Klasse ist eine der kleinsten und enthält meistens ausländische
 Pflanzen. Einheimisch ist:

Der Tannenwedel (*Hippuris vulgaris*), ein Kraut von 1'
 Länge, mit grade stehendem, saftigem Stengel, an welchem viele
 Kreise quirlförmig gestellter, linienförmiger Blätter über einander.
 Die kleinen Blumen stehen ungestielt in den Blattachseln, haben keine
 Krone, einen einblättrigen Kelch auf dem Fruchtknoten, an welchem
 Kelche zugleich der kurze Staubfaden sitzt. Frucht ein kleines einsa-
 miges Nüsschen. Der Tannenwedel wächst bei uns überall in Grä-
 ben, Sümpfen, an Flußufern, steckt mit der Wurzel im Schlamm,
 und erhebt sich mit dem Stengel und den Blättern über dem Wasser.

Zweite Klasse. Diandria.

§. 141. Alle Pflanzen, die in deutlichen Blumen zwei
 Staubfäden neben dem ein- oder mehrfachen Stempel zeigen,
 gehören hierher. Die meisten haben nur einen Stempel, wo-
 nach Linne die Ordnung Monogynia bildete, wenige besitzen
 zwei, und bilden die zweite Ordnung Digynia. Die einhei-
 mischen sind alle monogynisch. 3. B.

Der Partriegel (*Ligustrum vulgare*), eine strauchartige Pflanze
 mit gegenüberstehenden, kurzgestielten, lanzettförmigen, glatten Blät.

tern und rispenförmigem Blütenstande. Blumenkrone einblättrig, röhrig, Saum vierlappig, weiß. Die Frucht eine zweifächerige Beere, die in jedem Fache 2 Samen enthält. Häufig in Gärten, zu Hecken und Lauben angepflanzt.

Der spanische Flieder (*Syringa vulgaris*) hat die Kennzeichen der vorigen Pflanze, aber die Blätter sind breiter, herzförmig, und die Frucht ist eine zweiklappige, zweifächerige Kapsel, die auch 2 Samen in jedem Fach enthält. Bei uns in Gärten als Zierstrauch, stammt aus dem südlichen Europa.

Die Ehrenpreisgattung (*Veronica*) hat einen 4—5 theiligen ungleichlappigen Kelch, eine radförmige ungleichvierlappige Blumenkrone, und eine zweiklappige vielstamige Kapsel, in welcher die Scheidewände an den Klappen sitzen. Unter den vielen Arten unserer Gegend ist die gemeinste *V. chamaedrys*; sie hat gegenüberstehende tiefgezähnte eiförmige haarige Blätter, einen achselständigen ährenförmigen Blütenstand, vierlappigen Kelch und eine große, blaue Blumenkrone. Ueberall auf Feldern, liegt am Boden, doch die Blumenähre steht aufrecht.

Die gemeine Entengröße (*Lemna minor*) ist eine kleine Pflanze ohne Stengel, mit linsenförmigen, ziemlich dicken Blättern, die auf dem Wasser schwimmen und einzelne Wurzeln ausenden. Die kleinen Blumen sitzen am Rande der Blätter, haben eine einfache Blumenhülle und eine 1—2 fächerige Kapsel, worin einige Samen. Ueberall gemein auf stehenden Gewässern.

Dritte Klasse. Triandria.

§. 142. Drei freie, gleich lange Staubfäden in deutlich sichtbaren Zwitterblumen bilden den Charakter dieser Klasse. Nach der Anzahl der Griffel zerfällt sie in drei Ordnungen.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Griffel.

Die Sumpflilie (*Iris pseudacorus*) hat eine sechsblättrige, gefärbte Blumenhülle, deren drei abwechselnde Blätter größer sind und herabhängen, während die drei kleineren aufrecht stehen. Der Griffel ist zwar einfach, aber in drei blattartige Lappen gespalten, deren jeder eine Narbe trägt. Fruchtknoten unter der Blume, bildet sich zu einer dreifächerigen, vielstamigen Kapsel aus. Die Pflanze hat Schwerdförmige Blätter, welche den aufrechtstehenden, mehrblumigen Schaft am Grunde scheidenartig umgeben. Blumen schwefelgelb, stecken vor dem Aufblühen in einer Blumenscheide. Gemein in Sümpfen.

2. Ordnung. Digynia. Mit zwei Griffeln.

Hierher gehört die große Familie der Gräser (*Gramineae*), welche sich außerdem noch durch folgende Merkmale auszeichnet. Die

Wurzel ist faserig, meistens einjährig, der Stengel ein knotiger Palm, die linienförmigen Blätter entspringen von den Knoten und umgeben den Palm eine Strecke scheidenförmig. Blumen in einfachen oder zusammengesetzten Aehren und Rispen. Jede Blume hat eine zweiblättrige Blumenhülle, das äußere Blatt derselben heißt äußere oder untere Spelze (*palea s. valvula exterior s. inferior*), das innere gegen die Achse der Aehre gerichtete oft feinere Blatt wird innere oder obere Spelze (*palea s. valvula inferior s. superior*) genannt; hierzu kommt bei vielen noch ein zweites, mehrere Blumen umschließendes, Blattpaar unter dem ersteren, welches man mit dem Namen Bälge (*glumae*) bezeichnet. Nach der Anzahl der Blumen in diesen Bälgen richtet sich die Größe der Aehren, sowohl beim ähren- als auch beim rispenförmigen Blüthenstande. Von der Außenfläche der äußeren oder unteren Spelze entspringt bei vielen Gräsern ein langer meistens borstenförmiger Fortsatz, die Granne (*arista*). Die Frucht ist ein Caryopse, deren Same nur einen Samenlappen und viel Eiweiß enthält. — Die Gräser sind übrigens die wichtigsten von allen Gewächsen, sie geben nicht bloß dem Menschen selbst, sondern auch dessen Hausthieren die nothwendigsten Nahrungsmittel; daher ist ihre Menge so bedeutend, daß sie den zwanzigsten Theil aller bekannten Pflanzen ausmachen. Folgende Arten sind besonders wichtig.

Der Hafer (*Avena sativa*) hat einen rispenförmigen Blüthenstand; Bälge zweiblumig, ungleich, Spelzen am Grunde häufig mit einem Bart, die innere und obere an der Spitze gespalten, die äußere mit einer gedrehten Granne. Wird seit uralten Zeiten in Deutschland angebauet, jetzt aber meistens nur zu Viehfutter benützt.

Die Gerste (*Hordeum vulgare*), mit ährenförmigem Blüthenstande, an jeder Stelle der Achse drei einblumige Aehrchen; Bälge lang, dünn, pfriemenförmig; untere Spelze mit langer, steifer, grader Granne, Samen von Haut umgeben, an beiden Enden zugespitzt, mit einer Längsfurche. Blumen in vier Reihen, je zwei und zwei einander gegenüber und abwechselnd höher. Stammt aus Sicilien; schon lange bei uns angebauet.

Der Roggen (*Secale cereale*). Blüthenstand eine Aehre; Bälge dünn, borsten-pfriemenförmig, untere Spelze in eine lange, haarige Granne verlängert, die obere der Länge nach gefaltet. Samen glatt, cylindrisch, an beiden Enden abgestutzt. Aehrchen zwei-, seltener dreiblumig. Vaterland Persien und Mittel-Asien, kam erst durch die Hunnen nach Europa, und wird jetzt besonders in den nördlichen Gegenden angebauet.

Die Weizengattung (*Triticum*) ist sehr reich an Arten, alle haben einen ährenförmigen Blüthenstand; Bälge groß und breit, mit kürzerer oder längerer grannenförmiger Spitze, untere Spelze wie die

Bälge, die obere ziemlich der Länge nach gefaltet. Man bauet bei uns zwei Arten: den Sommerwaizen (*Tr. aestivum*), mit vierblumigen Aehren, die Bälge glatt und gegrannt; den Winterwaizen (*Tr. hibernum*), ebenso, aber die Bälge ohne Granne. Beide stammen aus dem Orient und wurden schon von den ältesten Ackerbau treibenden Völkern kultivirt. Eine dritte Art, die Quecke (*Tr. repens*), hat vielblumige Aehrchen, deren Bälge bald mit, bald ohne Granne; findet sich überall als Unkraut zwischen dem Getreide, und verbreitet sich sehr stark wegen seiner kriechenden Wurzeln.

3. Ordnung. Trigynia. Mit drei Griffeln.

Das Quellkraut (*Montia fontana*) ist ein kleines Kraut mit kriechendem Stengel, woran aufrechtstehende Zweige mit gegenüberstehenden, länglichen, stumpfen Blättern. Blumen am Ende, fünfblättrig, weiß. Frucht eine Kapsel mit drei Samen. An feuchten Stellen, besonders auf quellenreichem Boden, aber nicht überall.

Vierte Klasse. Tetrandria.

§. 143. Vier freie, gleich lange Staubfäden bilden den Charakter dieser Gruppe. Nach der Anzahl der Griffel zerfällt sie in vier Ordnungen.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Griffel.

Der Weberkarden (*Dipsacus fullonum*) eine große, aufrechtstehende Pflanze mit eckigem, gezähntem Stengel und ungestielt, gezähnten Blättern. Blumen auf einem langen, dünnen Fruchtboden dicht neben einander, Kelch klein, vierzählig, Blumenkrone lang, röhrig, vierlappig, Frucht eine unterständige Caryopsis. Unter jeder Blume ein steifes, gezähntes, hakenförmiges Hüllblatt, welches die Frucht zum Strichgeben der Tuche brauchbar macht. Zu diesem Zwecke bauet man die Pflanze in manchen Gegenden. —

Die Färberröthe (*Rubia tinctorum*), ein mittleres Kraut, mit liegenden, viereckigen, gezähnten Stengeln, lanzettförmigen, quirlförmig gestellten Blättern und achselständigem, büschelförmigem Blütenstande. Blumenkrone trichterförmig, vierlappig, gelb; Frucht zweisamig, die Samen in einer weichen Hülle. Man gewinnt aus dieser Pflanze, besonders aus der Wurzel, eine schöne, rothe Farbe, die in Färbereien häufig gebraucht wird. Füttert man Vögel mit dem Kraut, so färben sich deren Knochen roth.

Die Wegereichsgattung (*Plantago*) hat einen ährenförmigen, blattlosen Blüthenschaft, einen vierlappigen Kelch, vierlappige Blumenkrone, die mit dem Kelch auf dem Fruchtknoten sitzt, vier lange Staubfäden und eine zweifächerige, 2 — viel-samige Kapsel. Bei uns wachsen an Wegen, auf Feldern u. dgl. mehrere Arten, welche alle

ungetheilte Blätter haben; die gemeinste ist der große Wegerich (Pl. major), mit großen, ovalen, stumpfen, glatten, langgestielten Blättern, runden Blüthenschäften und vielstamigen Kapseln.

Die übrigen drei Ordnungen, mit zwei (Digynia), drei (Trigynia) und vier Griffeln (Tetragynia), enthalten keine wichtigen einheimischen Gattungen.

Fünfte Klasse. Pentandria.

§ 144. Sie ist eine der zahlreichsten, und umfaßt alle Pflanzen mit fünf gleich langen, freien Staubfäden, die mit dem Stempel in derselben Blume sitzen. Linne theilte sie nach der Zahl der Griffel in 6 Ordnungen.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Griffel. Hierher gehören mehrere große Familien einheimischer Gewächse, unter welchen folgende die wichtigsten sind.

1. Fam. Raublättrige Pfl. (Asperifoliae). Sie haben eine einblättrige, röhrige, fünfklappige Blumenkrone; eine aus vier einsamigen, rauhen oder stacheligen Nüsschen bestehende Frucht, und abwechselnde rauhe Blätter. 3. P.

Das Bergglockenblumen (Myosotis palustris), eine kleine Pflanze mit lanzettförmigen, ziemlich glatten Blättern und himmelblauer Blumenkrone, deren gelbe Mündung von kleinen rundlichen Schuppen ziemlich geschlossen ist. Nüsschen mit schwachem Nabel und Nabel am Grunde. Gemein in Sümpfen, am Rande von Gräben.

Der gemeine Steinsame (Lithospermum arvense) hat eine offene, freie Mündung der weißen, trichterförmigen Blumenkrone, und nicht gerandete, eiförmige, nicht mit einem Nabel versehene Nüsschen. Blätter breit, lanzettförmig, zugespitzt, sehr rau. Gemein zwischen Getreide.

2. Fam. Schlüsselblumenpflanzen (Primulaceae). Sie haben eine röhren- oder radförmige Blumenkrone mit freier Mündung. Blätter an der Wurzel oder gegenüberstehend. Frucht eine einsächerige, zwei- bis fünfklappige Kapsel.

Die gemeine Schlüsselblume (Primula veris) hat röhrenförmige, hängende, gelbe Blumen am Ende eines blattlosen Blüthenschafte; Blätter gezähnt, runzelig, unten weißhaarig. Gemein in Gebüsch, blühet zeitig im Frühjahr; eine andere, in Gärten häufige Art, die Aurikel (P. auricula), hat glatte, leicht gezähnte, mehrlartig bestäubte Blätter, und dunkelrothbraune Blumen mit gelber Mündung. Stammt aus Italien.

Der Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*) hat zu drei gestellte, langgestielte, eirunde Blättchen und einen aufrechten Blüthenschaft; Blumenkrone weiß, trichterförmig, tieflappig, inwendig rauh; Kapsel zweiflappig mit wandständigen Mutterkuchen. Bei uns häufig auf feuchten Wiesen und in Gräben; wird gegen das kalte Fieber angewendet.

3. Fam. Kartoffelpflanzen (*Solaneae*). Blumenkrone trichterförmig, unterständig, Blätter abwechselnd; 2 Narben am Griffel. Frucht eine 2—4-fächerige, eben so viel klappige Kapsel oder Beere, mit verdicktem Mutterkuchen an den Scheidewänden. Viele Pflanzen dieser Familie sind giftig.

Die Kartoffel (*Solanum tuberosum*) hat eine glockenförmige, gefaltete Blumenkrone, sehr kurzgestielte, längliche, späte Staubbeutel und eine zweifächerige, vielkörnige Beere. Blätter gefiedert, haarig. Die Knollen an den Wurzeln liefern eine nahrhafte Speise; die Pflanze stammt aus Amerika und kam durch Franz Drake in der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts nach Europa.

Die Tollkirsche (*Atropa belladonna*) hat eine glockenförmige, braunrothe Blumenkrone, und eine beerenartige, schwarze Frucht, die von dem fünfklappigen Kelch zur Hälfte umgeben ist; Blätter ziemlich langgestreckt, herzförmig. Im mittleren und südlichen Europa, besonders in Gebirgsgegenden am Rande von Gebüsch; sehr giftig und gefährlich.

Der Stechapfel (*Datura stramonium*) hat auch eine lange, trichterförmige, gefaltete, weiße Blumenkrone, aber die Frucht ist eine große, vierfächerige, stachelige Kapsel. Blätter groß, breit, ausgebuchtet, wellenförmig am Rande gebogen. Das 1—2' hohe Kraut wächst wild an Mauern, Säunen etc., und ist in allen Theilen sehr giftig.

4. Fam. Windenpflanzen (*Convolvulaceae*). Sie haben ebenfalls eine trichterförmige, gefaltete Blumenkrone und eine 2 bis 4-klappige und fächerige Kapsel, aber die Scheidewände stoßen an den Rand der Klappen und die Samen sitzen am Grunde der Scheidewände.

Die Saunwinde (*Convolvulus sepium*) hat eine große, weiße, trichterförmige Blumenkrone; herzförmige, abwechselnde Blätter, und eine dreifächerige Kapsel, jedes Fach mit 2 Samen. Gemein in Gebüsch.

Mit in die erste Ordnung der fünften Klasse, wenngleich zu keiner der genannten Abtheilungen, gehört der Kaffebaum (*Coffea arabica*), ein mäßiger Baum mit gegenüberstehenden, eiförmigen, ziemlich spizen Blättern und quirlförmig gestellten Blumen in den Blattachseln. Kelch fünfklappig. Blumenkrone einblättrig; in 5 tiefe

Lappen getheilt, weiß. Die Frucht eine rothe Beere, von der Größe einer Haselnuß, darin zwei große Samenkörner, welche die bekannten Kaffeebohnen sind. Vaterland Arabien, von da nach Westindien verpflanzt.

2. Ordnung. Digynia. Mit zwei Griffeln.

In diese Abtheilung gehört die große Familie der Doldenpflanzen (*Umbelliferae*), welche diesen Namen von ihrem Blüthenstande bekommen haben. Es sind fast alles krautartige, ein- oder zweijährige Gewächse mit aufrechtstehendem, oben verzweigtem, oft hohlem, knotigem und außerhalb gefurchtem Stengel; mehrmals gefiederten Blättern und kleinen in Dolden stehenden Blumen. Jede Blume hat 5 schmale Kelchblätter auf dem Fruchtknoten und 5 oft herzförmige Blumenblätter. Die Frucht besteht aus zwei von dicker Haut umgebenen, oft mit Rippen, Stacheln und Flügeln versehenen Caryopsen, die im unreifen Zustande fest aneinander hängen, hernach sich aber trennen. Die Pflanzen wachsen in der gemäßigten Zone und enthalten gewürzhafte oder giftige Stoffe. 3. B.

Die Mohrrübe (*Daucus carotta*), mit fiederspaltigen, zerklüfteten Hüllblättchen, und vierreihig stacheligen Früchten, Blätter und Stiel steifharig. Wegen der dicken, orangefarbenen, fleischigen, spindelförmigen Wurzel wird diese in unserer Gegend überall wilde Pflanze in Gärten sehr allgemein angebauet.

Der Kümmel (*Carum carvi*) hat einen einblättrigen, allgemeinen, aber keinen besonderen Hüllblättchenkranz an der Dolden- und länglichrunde, fast fünfeckige, mit 5 stumpfen Rippen versehene Frucht. Blätter dreimal gefiedert, Blättchen schmal linienförmig. Blumen weiß. Wird wegen des gewürzhaften Samens angebauet, wächst aber auch wild bei uns.

Die Eppichgattung (*Apium*) hat gar keine Hüllen und fünfrippige Früchte, die aber viel kürzer, fast kugelförmig sind. Die Petersilie (*A. petroselinum*), mit winkeligem Stengel, glänzenden Blättern; die unteren Blättchen dreitheilig, die oberen lanzettförmig, ganzrandig. Der Sellerie (*A. graveolens*) mit gefurchtem Stengel und gefiederten, keilsförmigen, eingeschnittenen Stengelblättern. Die Wurzeln beider Arten werden als Zusatz an Suppen gethan und auch sonst gegessen; bei jener Art ist sie lang, spindelförmig, bei dieser dicker, mehr knollig, mit vielen Ausstrahlungen.

Der gefleckte Schierling (*Conium maculatum*) hat beide Hüllen, die Früchte eiförmig, mit 5 stumpfen Rippen, die bei der unreifen Frucht gelberb sind; Blätter dreimal gefiedert, Blättchen klein, glänzend, länglicheirund, tief gezähnt; Stengel glatt, dunkel blutroth gefleckt. An angebauten Stellen, neben Dörfern, auf Höfen u. s. w.; in allen Theilen höchst giftig.

Der **Wasserschierling** (*Cicuta virosa*). Keine allgemeine Hülle, die besondere vorhanden. Früchte rund, breit gedrückt, mit breiten Rippen und dazwischen hervorragenden Furchen. Blätter zweimal gefiedert, Blättchen lang, lanzettförmig, gezähnt. Wurzel groß, dick, fleischig, inwendig hohl, aber durch Scheidewände in Fächer getheilt (*radix loculosa*). Wächst in Gräben und auf Flossholz; ist giftig, aber weniger als der vorige.

3. Ordnung. Trigynia. Mit drei Griffeln.

Der gemeine **Hollunder** oder **Flieber** (*Sambucus nigra*) ist ein Strauch mit holzigen Zweigen, in welchen ein sehr weiches, schwammiges Mark. Die Blätter unpaarig gefiedert, Blättchen ovallanzettförmig, gezähnt; Blütenstand eine Astersolbe; Kelch fünfzählig; Blumenkrone einblättrig, in fünf Lappen getheilt, weiß; Frucht eine schwarze Beere, enthält im Fleisch 3 längliche Samen. Ueberall in Gärten, auf Höfen u. s. w.

4. Ordnung. Tetragynia. Mit vier Griffeln.

Die **Sumpf-Parnassblume** (*Parnassia palustris*) ist eine kleine Pflanze, mit aufrechtem, winkeligem Stengel, herzförmigen Blättern, fünfblättrigem Kelch, 5 weißen Blumenblättern, eben so vielen schuppenförmigen, am Rande mit gestielten Knöpfen besetzten Honigdrüsen, und einer einsächerigen, vierklappigen Kapsel, in welcher die vom Arillus umgebenen Samen an den eingerollten Rändern der Klappen sitzen. Gemein auf feuchten Wiesen.

5. Ordnung. Pentagynia. Mit fünf Griffeln.

Der **Flachs** (*Linum usitatissimum*), eine $1\frac{1}{2}$ hohe Pflanze mit gegenüberstehenden, lanzettförmigen Blättern, blauen fünfblättrigen Blumen und einer runden, zehnfächerigen, zehnsamigen Kapsel. Wird bei uns angebauet wegen seiner großen Nutzbarkeit. Die Gefäße des Stengels geben, nach mancherlei Zubereitungen, den Flachs.

Die letzte, sechste, Ordnung, **Polygynia**, mit sehr vielen Griffeln, enthält keine wichtigen Pflanzen.

Sechste Klasse. Hexandria.

§ 145. Hierher gehören fast lauter Pflanzen mit einem Samenlappen; sie haben alle sechs freie, ziemlich lange Staubfäden mit dem Stempel in derselben Krone, und meistens einen einfachen Griffel, doch kommen auch 2, 3, 4 und 5 Griffel, selbst sehr viele, vor.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Griffel.

Dahin viele Zwiebelpflanzen. 3. B.

Die weiße Lilie (*Lilium candidum*), mit aufrechtstehendem, saftigem Stengel, der am Ende mehrere Blumen mit sechsblättriger, weißer Blumenhülle trägt. Frucht eine dreifächerige, viel-samige Kapsel, deren Klappen die Scheidewände in der Mitte tragen. Samen am mittleren Mutterkuchen in doppelter Reihe. Bei uns in Gärten, stammt aus Klein-Asien, Armenien etc.

Die gemeine Zwiebel (*Allium Cepa*) hat einen hohlen, unten bauchig erweiterten, blattlosen Stengel, der an seinem Ende viele in einen runden Knopf gestellte Blumen trägt, die vor dem Aufblühen in einer trockenen Blüthenscheide eingeschlossenen sind. Frucht der vorigen Pflanze, aber kleiner. Süd-Europa, wird bei uns angebaut. Bisweilen bilden sich oben zwischen den Blumen junge Zwiebeln.

Der Spargel (*Asparagus officinalis*), ein staudenartiges Kraut, mit aufrechtstehendem, ästigem Stengel, und vielen fein zertheilten, fadenförmigen Blättchen. Blumen glockenförmig, sechs-lappig, in den Blattachseln. Frucht eine rothe, dreifächerige Beere, jedes Fach mit 2 Samen. Die jungen Schößlinge der alten Wurzeln liefern ein sehr wohlschmeckendes, nahrhaftes Gemüse, weshalb man diese Pflanze bei uns allgemein in Gärten kultivirt.

Die Hyacinthe (*Hyacinthus orientalis*) hat einen aufrechten, blattlosen Blüthenschaft, traubigen Blüthenstand, glockenförmige, sechs-lappige, gefärbte Blumen, und eine dreifächerige, viel-samige Kapsel. Blätter länglich, linienförmig und rinneförmig der Länge nach vertieft. Bei uns als Zierpflanze in Zimmern, stammt aus dem Orient.

Die Tulpe (*Tulipa gesneriana*) ^{et *Hyacintha*} hat einen einblumigen, blattlosen Stengel; sechsblättrige, gefärbte Blumenhülle; dreifächerige, viel-samige Kapsel, und eine dreieckige Narbe, die unmittelbar auf dem Fruchtknoten sitzt. Eben daher; bei uns in Gärten. Beide wurden früher aus Liebhaberei sehr theuer bezahlt.

2. Ordnung. Digynia. Mit zwei Griffeln.

Der Reis (*Oryza sativa*), ein hohes Gras, mit dickem, fleischigem Stengel und großen, breiten Blättern. Blüthenstand rispenförmig, Ähre einblumig, Spelzen am Grunde schwierig, zusammen gedrückt, lederartig, am Samen zum Theil festgewachsen. Stammt eigentlich aus Ostindien, wo er in feuchten Sumpfsgegenden wild wächst; wird jetzt auch in Italien, Spanien und Westindien angebaut. Seine Samen liefern ein sehr beliebtes Gemüse.

3. Ordnung. Trigynia. Mit drei Griffeln.

Die Herbstzeitlose (*Colchicum autumnale*) hat keinen Stengel, sondern die Blume und die breiten scheidenförmigen Blätter erheben sich unmittelbar aus der Wurzel; diese eine Zwiebel. Blumenkrone fleischfarben, lang, trichterförmig, oben sechsclappig; Frucht eine dreifächerige Kapsel, jedes Fach mit vielen Samen ohne Ordnung am Innenwinkel. Sie erscheint erst im folgenden Frühjahr über der Erde, während die Blume im Spätherbst hervorbricht, daher *filius ante patrem*. Auf Wiesen und in Gärten; etwas giftig.

Die übrigen Ordnungen enthalten keine wichtigen Pflanzen.

Siebente Klasse. Heptandria.

§. 146. Diese Gruppe, welche durch sieben freie, gleich lange Staubgefäße, die mit dem Stempel auf demselben Fruchtboden stehen, charakterisirt ist, enthält nur wenige Pflanzen; z. B.

Die Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*), ein hoher Baum mit weit verbreiteten Zweigen, woran siebenfache Blätter und rispenförmig gestellte Blüthen. Jede Blume hat einen einblättrigen 4—5-zähligen Kelch, eine fünfblättrige, unregelmäßige Blumenkrone, gebogene Staubfäden; und eine große, dreifächerige und dreiklappige, oberständige Kapsel, an deren Klappen die Scheidewände sitzen, und die in jedem Fach 2 Eierchen enthält, von welchen 6 aber in der Regel nur 2 oder 3 zur Entwicklung kommen. Auf der Oberfläche der Klappen sitzen Stacheln. Der Baum stammt aus dem Orient, und wird bei uns zur Zierde besonders auf Spaziergängen angepflanzt. Sein Holz ist sehr weich und taugt zum Bauen nicht.

Achte Klasse. Octandria.

§. 147. Acht freie, gleich lange, mit dem Stempel in derselben Blume befindliche Staubfäden bilden das Kennzeichen dieser Gruppe. Sie besteht aus vier Ordnungen.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Pistill.

Die Nachtkerze (*Oenothera biennis*), ein mäßiges Kraut, mit geradestehendem Stengel, woran oval-lanzettförmige, zum Theil herablaufende Blätter, die etwas haarig sind. Die großen, gelben vierblättrigen Blumen stehen in den Blattachseln, und geben eine vierklappige, vierfächerige Kapsel, mit vielen haarlosen Samen am mittleren Mutterkuchen. Auf trocknen, sonnigen Feldern.

Die Heidelbeere oder schwarze Besing (*Vaccinium myrtillus*), hat einen 1' hohen verzweigten Stengel, mit kleinen,

eiförmigen, am Rande gezähnten Blättern. Die Blumen einzeln in den Blattachseln, mit fleischfarbiger, einblättriger, blasiger Blumenkrone auf dem Fruchtknoten, einem vierzähligen Kelch, und einer 4—5-fächerigen Beere, deren viele Samen am Innenwinkel jedes Faches sitzen. Gemein in Wäldern; die blauen Beeren geben ein schmackhaftes Nahrungsmittel.

Die verwandte Gattung des Heidekrautes (*Calluna vulgaris*) hat kleine, schuppenförmige Blätter, und röthliche, einblättrige Blumen. Der Fruchtknoten ist oberständig und wird zu einer vierfächerigen, viertlappigen Kapsel, in welcher die Scheidewände den Klappen parallel laufen und am mittleren Mutterkuchen festsitzen. Gemein auf allen Heiden.

Die 2. Ordnung Digynia enthält keine wichtigen Gattungen.

3. Ordnung. Mit drei Stempeln.

Der Buchweizen (*Polygonum fagopyrum*), eine kleine Pflanze, mit knotigem, sperrig verzweigtem Stengel, dreieckigen, gestielten Blättern und ährenförmigem Blüthenstande; jede Blume mit einfacher, fünfklappiger, fleischrother Blumenhülle und dreiseitigem, schwarzem, glänzendem Nüsschen, welches vom Perigonium eingehüllt ist. Der Same liefert zerschroten ein gutes Nahrungsmittel. Die Pflanze wächst auf trockenem, sandigem Boden wild, und wird in manchen Gegenden angebauet.

4. Ordnung. Tetragynia. Mit vier Pistillen.

Die Einbeere (*Paris quadrifolia*) hat einen geraden, ungetheilten, aufrechten, 1' hohen Stengel, der oben vier eiförmige, zugespitzte Blätter trägt; in der Mitte derselben entspringt ein Blumenstiel, an dessen Ende eine Blume mit 4 Kelchblättern, 4 Blumenblättern, 8 blattartigen Staubfäden, und einem runden oberständigen Fruchtknoten, welcher sich zu einer vierfächerigen, vielsamigen, schwarzen Beere ausbildet, die giftige Eigenschaften hat. Die Pflanze wächst nicht selten in feuchten Gebüschen.

Neunte Klasse. Enneandria.

§ 148. Mit neun freien, gleich langen Staubfäden neben den Stempeln auf demselben Fruchtboden. In unserer Gegend findet sich aus dieser Gruppe nur eine Pflanze, nemlich:

Der Wasserliesch oder die Doldenbinse (*Butomus umbellatus*), mit hohem, gerade aufsteigendem, zelligem, saftigem, unverzweigtem Blüthenschaft, der an seinem Ende viele doldenförmig gestellte Blumen trägt, und am Grunde von wenigen, schmalen, zuge-

spitzten Blättern umgeben ist. Jede Blume mit sechsblättriger, fleischrother Blumenhülle, 9 Staubfäden und 6 Stempeln, deren jeder sich zu einer einsächerigen, vielsamigen, länglichen Balgkapsel entwickelt. An Ufern von Seen, Teichen, Flüssen und in Gräben nicht selten.

Behnte Klasse. Decandria.

§ 149. Eine etwas größere Gruppe, die durch zehn freie, gleich lange, neben dem Stempel, theils auf dem Fruchtboden, theils an der Blumenkrone, befestigte Staubgefäße bestimmt ist. Sie hat 5 Hauptordnungen.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Pistill.

Der Sumpfschmarin (*Ledum palustre*), ein mäßiges Kraut mit holzigen, zertheilten Stengeln, woran abwechselnde, zerstreute, linienförmige, oben dunkelgrüne, glänzende, unten braune Blätter, und büschelförmig gestellte, weiße Blumen am Ende der Zweige. Jede Blume hat einen kleinen, fünfzähligen Kelch, fünf große Blumenblätter, und einen einfachen, oben mit einem fünfstrahligen Stern versehenen Stempel. Frucht eine fünffächerige, fünfflappige, vielsamige Kapsel, deren Klappen sich unten neben dem Stiel öffnen. Die Pflanze wächst auf Torfmoor, hat einen betäubenden, Kopfschmerzen erregenden Geruch, und ist giftig.

2. Ordnung. Digynia. Mit zwei Griffeln.

Die Gartennelke (*Dianthus caryophyllus*), ein krautartiges Gewächs, mit aufrechtem, knotigem Stengel, woran linienförmige, rinnenförmig vertiefte, gegenüberstehende, weißgrüne, bereifte Blätter und gipfelfständige Blumen. Der Kelch ist röhrenförmig und hat an seinem Grunde mehrere schuppenförmige Blätter; die fünf Blumenblätter sind unten sehr schmal, erweitern sich aber nach oben in einen dreiseitigen, am Rande gezähnten, Lappen. Die Frucht ist eine einsächerige, vielsamige Kapsel, deren Samen am mittleren Mutterkuchen sitzen. Die Pflanze wird wegen ihrer schönen, wohlriechenden, buntgefärbten Blumen in Gärten gezogen und stammt eigentlich aus Italien, wo sie wild wächst.

3. Ordnung. Trigynia. Mit drei Griffeln.

Der Sternmier (*Stellaria alsine*), ein kleines, saftiges Kraut, mit niederliegenden Zweigen und gegenüberstehenden, ovalen, zugespitzten Blättern. Die kleinen, weißen Blumen stehen am Ende der Zweige, haben fünf Kelchblätter, und fünf tiefgetheilte, weiße Blumenblätter. Frucht eine vielsamige Kapsel, die mit sechs Klappen aufspringt und die Samen am mittleren Mutterkuchen trägt. Ueber-

all gemein auf Höfen, an Wegen, selbst auf der Straße. Die frischen Blätter fressen die Kanarienvögel gern.

4. Ordn. Tetragynia. Enthält keine wichtigen Pflanzen.

5. Ordn. Pentagynia. Mit fünf Griffeln.

Die Kuckucksblume (*Lychnis flos cuculi*) wird 1 bis 1½' hoch, hat einen gerade stehenden Stengel, mit gegenüberstehenden, schmalen Blättern und mehreren blutrothen Blumen am Ende. Jede Blume besteht aus einem bauchigen Kelch und fünf Blumenblättern, deren jedes in zwei schmale Hauptlappen gespalten ist, welche an ihrer Vereinigungsstelle noch einen schmalen, kürzeren Lappen (den Kranz, *corona*) an jeder Seite neben sich haben. Frucht eine einsächerige, viel-samige Kapsel, die mit 5 Zähnen aufspringt. Ueberall gemein auf Wiesen.

Der Mauerpfeffer (*Sedum acre*), ein kleines Kraut, mit dicken fleischigen Blättern und gelben Blumen am Ende der Zweige. Fünf fleischige Kelchblätter, fünf Blumenblätter und fünf einsächerige, viel-samige Kapseln, die am Grunde unter sich zusammenhängen. Gemein an Abhängen, neben dem Wege, an dürrer, sandigen und sonnigen Stellen.

Elfte Klasse. Dodecandria.

§ 150. In diese Gruppe stellte Linne alle Pflanzen, die mit dem Stempel auf demselben Fruchtboden mehr als zehn, aber weniger als zwanzig, Staubfäden haben. Hierher mehrere Ordnungen. Z. B.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Pistill.

Das Blutkraut (*Lythrum salicaria*), eine hohe, aufrechte Sumpfpflanze, mit herzförmig-lanzettlichen, gegenüberstehenden Blättern und ährenförmigem Blüthenstande. Jede Blume hat einen einblättrigen, zwölfzähligen Kelch, sechs unterständige Blumenblätter und zwölf Staubgefäße. Frucht eine zweisächerige, zweiflappige, viel-samige Kapsel, deren Samen am mittleren Mutterkuchen sitzen. Gemein in Bächen, an Gräben; wächst fast überall, sogar in Neu-Holland.

2. Ordnung. Digynia. Mit zwei Pistillen.

Der Odermennich (*Agrimonia eupatoria*) wächst an sonnigen Stellen, an Abhängen, Wegen; hat einen aufrechten Stengel mit ährenförmig gestellten Blumen und gefiederten Blättern; jedes Blättchen eiförmig und gezähnt. Die Blume hat einen unterständigen, mit hakenförmigen Borsten besetzten, fünfklappigen Kelch, und fünf nicht große, gelbe Blumenblätter, die auf dem Kelch sitzen. Die Frucht

besteht aus zwei Rüschen, die von dem harten, stacheligen Kelch eingeschlossen sind.

3. Ordnung. Trigynia. Mit drei Pistillen.

Die Wolfsmilch (*Euphorbia cyparissias*), ein kleines, aufrechtes, $\frac{1}{2}$ ' hohes, saftiges Kraut, mit vielen schmalen, linear-lanzettförmigen Blättern, aus welchen, wie auch aus den Stengeln, bei der Verletzung eine weiße, scharfe, etwas giftige Milch hervorquillt. Blumen am Ende, über breiten, abgerundeten Hüllblättern. Jede Blume hat einen gestielten Fruchtboden, an dessen Rande 4 bis 5 halbmondförmige Honiggefäße sitzen. Auf der Fläche desselben etliche meistens ungleich lange Staubfäden, und ein gestielter, dreifächeriger Fruchtknoten, welcher sich zu einer großen dreifächerigen, in jedem Fach ein schwarzes Samenkorn enthaltenden Kapsel ausbildet. Auf sonnigen Feldern, Viehweiden, an Wegen u. sehr gemein.

Die Garten-Reseda (*Reseda odorata*), ein einjähriges Kraut, mit ziemlich langen, lanzettförmigen, gegen das Ende etwas breiteren Blättern, und ährenförmig gestellten, wohlriechenden Blumen. Der Kelch ist mehrlappig, die Blumenblätter sind in viele fächerförmige Lappen getheilt, und die Frucht ist eine einfächerige, unregelmäßige, am Ende offene Kapsel, deren Samen an 3 peripherischen Mutterkuchen sitzen.

Zwölfte Klasse. Icosandria.

X § 151. In dieser Gruppe ist nicht mehr die Zahl der Staubfäden, sondern die Stellung derselben das Hauptmerkmal. Die hierher gehörigen Pflanzen zeigen nemlich mehr als zwanzig gleich lange, freie Staubfäden, die an dem Kelch befestigt sind. Ebenda sitzen auch die Blumenblätter; die Stempel aber ruhen auf dem Fruchtboden.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Stempel.

Die Gattung *Prunus* hat einen fünfstheiligen Kelch, fünf Blumenblätter, und eine fleischige, glatte, gestielte, einsamige Frucht, deren Same von einer holzigen, glatten Schale umgeben ist. Dahin die saure Kirsche (*Pr. cerasus*), ein mäßiger Baum, mit eiförmigen, zugespitzten, gezähnten, glatten Blättern, weißen Blumen in Büscheln, und rothbraunen, sauren Früchten. Stammt aus Klein-Asien und wird bei uns überall gezogen. Die Vogelkirsche (*Pr. avium*) hat größere, unten haarige Blätter, und süßschmeckende, mehr längliche Früchte. Von dieser Art stammen alle so vielfach verschiedenen, hell und dunkel gefärbten Abarten der süßen Kirschen. Eben

daher. — Auch die Pflaumen, der Schledorn, der Kirschlorbeer u. v. a. gehören hierher. Nahe verwandt ist die Gattung *Amygdalus*, wohin der Pfirsichbaum (*A. persica*); sie unterscheidet sich durch kurzgestielte, haarige Früchte, deren harte Samenschale auf der äußern Oberfläche sehr runzelig ist.

2. Ordnung. Di—Pentagynia. Mit 2—5 Griffeln.

Die Gattung *Pyrus* hat 5 Griffel, 5 Kelchlappen, 5 Blumenblätter, und eine vom angewachsenen Kelch bekleidete, zellige, saftige Frucht, inwendig mit 5 Fächern, und in jedem Fach 2 Samen. Dahin: der Apfelbaum (*P. malus*), ein hoher Baum mit unterhalb haarigen Blättern und kugelförmigen Früchten; und der Birnbäum (*P. communis*), mit glatten Blättern und kolbigen Früchten. Beide stammen aus Italien, Griechenland, Klein-Asien, und haben sich durch die Kultur zu den mannigfachsten Spielarten verändert.

3. Ordnung. Polygynia. Mit vielen Stempeln.

Die Rosengattung (*Rosa*) hat einen oberständigen, fünftheiligen Kelch, dessen Lappen fiederspaltig getheilt sind, 5 Blumenblätter und sehr viele Staubfäden. Die Frucht (Hainbutte oder Hanebutte) besteht aus dem fleischigen, becherförmigen Fruchtboden, an dessen innerer Fläche zahlreiche, beharte Achenien sitzen. Alle Arten dieser zahlreichen Gattung sind strauchartig, haben unpaarig gefiederte Blätter, mit eiförmigen, oft zugespitzten, am Rande gesägten Blättchen. Man zieht sie wegen ihrer schöngefärbten, wohlriechenden Blumen in Gärten, besonders die Centifolie oder Provinzrose (*R. centifolia*), deren Staubfäden sich allermehstens in Blumenblätter verwandeln, daher sie sehr stark gefüllt ist.

Die Himbeere (*Rubus idaeus*) hat die Kennzeichen der Rosen, aber die Fruchtknoten stehen über dem Kelch und bilden sich auf dem kegelförmigen Fruchtboden zu vielen, kleinen, einsamigen, eine zusammenhängende Frucht bildenden Beeren aus. Blätter unpaarig gefiedert, unten weiß. Wild in Wäldern und angebauet in Gärten.

Die Walderdbeere (*Fragaria vesca*) ist nur krautartig, hat zu drei gestellte, ovale, stark gezähnte Blättchen an jedem Blattstiel, einen büschelförmigen Blütenstand, einen doppelten zehntheiligen Kelch, 5 Blumenblätter und eine oberständige Frucht. Diese besteht aus dem weichen, saftigen, dicken, kugelförmigen Fruchtboden, der auf der Oberfläche Grübchen hat, in welchen die nackten Achenien liegen. Die Pflanze findet sich überall wild in Wäldern und vermehrt sich sehr stark durch Schößlinge, welche sie dicht über der Wurzel nach allen Seiten hin hervortreibt. Andere Arten mit größeren Früchten werden in unsern Gärten gezogen.

Dreizehnte Klasse. Polyandria.

§ 152. Die Kennzeichen dieser Gruppe stimmen mit denen der vorhergehenden überein, aber die vielen freien Staubfäden sitzen nicht am Kelch, sondern, wie die Stempel, auf dem Fruchtboden. Bei manchen Pflanzen ist Kelch und Blumenkrone nicht deutlich geschieden; oft sind beide gefärbt, oder beide grün.

1. Ordnung. Monogynia. Mit einem Griffel.

Die MohnGattung (*Papaver*) enthält krautartige, einjährige Gewächse, mit gezähnten, krausen oder gelappten Blättern und verzweigtem, aufrechtem Blütenstengel. Jede Blume hat einen zweiblättrigen Kelch, der nach dem Aufblühen abfällt, vier große Blumenblätter, und als Frucht eine große, fast kugelförmige Kapsel, die von der sternförmigen Narbe gekrönt ist. Die Mutterkuchen bilden breite Leisten inwendig am Rande der Kapsel, und tragen sehr viele Samen, welche aus kleinen Löchern unter der Narbe herausfallen, wenn die Kapsel reif ist. Bei uns kommen drei Arten, alle mit dunkel feuerrothen Blumen, besonders zwischen dem Getraide vor. *P. rhoeas* mit nackter Kapsel und abstehenden Haaren des Blumenstiels; *P. dubium*, auch mit nackter Kapsel aber angedrückten Haaren des Blumenstiels; und *P. argemone*, mit länglicher von steifen Borsten bekleideter Kapsel. Der Saft von *P. somniferum* ist das Opium.

Die weiße Wasserrose (*Nymphaea alba*) hat einen 4—5 blättrigen Kelch, viele Blumenblätter, und breite blattartige Staubgefäße. Die Frucht ist eine vielsächerige, saftige Kapsel, mit sternförmiger Narbe, und enthält in jedem Fach viele Samen, die vom Mantel umgeben sind. Die Pflanze wächst bei uns in Teichen, am Rande von Seen und Flüssen, hat große elliptische Blätter, die auf dem Wasser schwimmen, und eine dicke, fleischige, kriechende Wurzel, die im Schlamm steckt.

2. Ordnung. Trigynia. Mit drei Stempeln.

Der gemeine Rittersporn (*Delphinium consolida*) wächst zwischen Getreide, wird kaum 1' hoch, hat sperrige Äste, zertheilte Blätter, mit linienförmigen Lappen und dunkelblaue Blumen. Die Blume hat eine gefärbte, fünfblättrige Hülle, deren oberstes Blatt in einen langen, hohlen Sporn verlängert ist. Innerhalb der Hülle 4 Honigdrüsen, je zwei von gleicher Größe, die oberen in einen langen Fortsatz, welche beiden Fortsätze im Sporn stecken, verlängert; die mehr unteren, seitlichen hakenförmig nach vorn gebogen.

Die Frucht besteht aus mehreren (3—5) einsächerigen, länglichen Balgkapseln, die sich am Innenrande öffnen.

3. Ordnung. Pentagynia. Mit fünf Stempeln.

Die Akeley (*Aquilegia vulgaris*) hat fünf gefärbte Kelchblätter und fünf füllhornartige Blumenblätter, die im Grunde des Horns eine Honigdrüse tragen. Frucht besteht aus fünf Balgkapseln, die am Innenlande aufspringen. Die Pflanze ist ein ausdauerndes Waldgewächs mit zertheilten, rundlappigen Blättern und dunkelblauen Blumen. Man zieht sie auch in Gärten.

4. Ordnung. Polgyynia. Mit vielen Stempeln.

Die Hahnenfußgattung (*Ranunculus*) hat einen 3—5 blättrigen Kelch, welcher nach dem Aufblühen oft abfällt, und eine fünfblättrige Krone, deren Blätter am Grunde eine schuppenförmige Nektardrüse tragen. Auf dem kugel- oder halbkugelförmigen Fruchtboden sitzen viele Achenien. Die Arten dieser Gattung sind giftig, besonders der giftige *R. (R. sceleratus)*, mit glatten Blättern, Wurzelblätter dreitheilig gesielt, die Lappen wieder dreilappig, abgerundet, Stengelblätter in drei schmale, linienförmige Lappen gespalten; Kelch haarlos; Fruchtboden lang, kegelförmig. Wächst auf Wiesen an feuchten Stellen, in halbtrocknen Gräben u. dgl. ziemlich häufig.

Die Ruhblume (*Caltha palustris*) hat ganz das Ansehen eines Ranunkulus, aber der Kelch und die Nektardrüsen am Grunde der Blumenblätter fehlen. Frucht besteht aus mehreren Balgkapseln, die sich an der innern Naht öffnen. Blumen gelb, Blätter fast rund, stumpf gezähnt. Sehr gemein auf allen Wiesen.

Vierzehnte Klasse. Didynamia.

§ 153. Das Kennzeichen dieser Klasse bilden die zwei langen und zwei kurzen Staubfäden, welche mit dem Stempel in derselben Blume sitzen. Die hierher gehörigen Pflanzen sind alle stauben- oder krautartige Gewächse mit einblättriger, unterständiger Blumenkrone und gegenüberstehenden Stengelblättern. Sie zeichnen sich durch ihren Gehalt an aromatischen oder scharfen Arzneistoffen aus. Linne theilte sie nach der Form der Frucht in 2 Ordnungen.

1. Ordnung. Gymnospermia. Die Frucht besteht aus vier Achenien; die Blumenkrone ist deutlich zweilappig, der Rachen offen; die Stengelblätter stehen gegenüber, und die Blumen quirlförmig in den Blattachseln. Die Pflanz-

zen bilden eine große Familie, welche den Namen Lippenblumen (Labiatae) erhalten hat. 3. B.

Die Krause Münze (*Mentha crispa*), ein Kraut von $1\frac{1}{2}$ Höhe mit glänzenden, herzförmigen, krausen und rauhen Blättern, welche einen eigenthümlich riechenden Duft verbreiten; Blumen bläulich mit fünfzähligem Kelch, dessen Zähne gleiche Größe haben; Blumenkrone vierlappig, der obere Lappen breiter, am Ende ausgerandet. Die Staubgefäße aufrecht und auseinander stehend. In südlichen Gegenden, bei uns angebauet in Gärten. Wird zu Brustpulver und magenstärkendem Thee benützt.

Die weiße Taubnessel (*Lamium album*) hat einen fünfzähligen Kelch, dessen Zähne in eine feine Borste verlängert sind; die Blumenkrone hat eine weite bauchige Mündung, zwei Lippen, von welchen die untere breit, gespalten und jederseits mit zwei kleinen Zähnen versehen, die obere helmartig gewölbt ist. Staubbeutel in der oberen Lippe; Nüsschen undeutlich dreikantig. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt, zugespitzt und überall mit steifen Haaren bedeckt; die weißen Blumen stehen gegen 20 in den Achseln zweier Blätter. Gemein an Zäunen.

Der Meyeran (*Origanum majorana*) hat eine fünfklappige Blumenkrone, zwei etwas schmalere Lappen bilden die Ober-, die anderen drei die Unterlippe. Die Blumen stehen in je vier Aehren und haben unter sich ein behaartes Stängelblatt, welches die Blume fast ganz verdeckt. Blätter eiförmig, glatt, gestielt. Blumenährchen fast kugelförmig. Aus Palästina, bei uns in Gärten, einjährig. Wird als Gewürz, besonders zu Würsten, gebraucht, daher auch Wurstkraut.

2. Ordnung. Angiospermia. Die Frucht ist eine zweifächerige, vielkammerige Kapsel, in welcher die Samen an dem aus der verdickten Scheidewand bestehenden, mittleren Nutzfächer sitzen. Die Blumenkrone ist in unregelmäßige, Lippen bildende, Lappen getheilt, und die Unterlippe verschließt häufig den Eingang, daher man diese Familie Maskenblumen (Personatae) genannt hat. Dahin:

Das Löwenmaul (*Antirrhinum majus*), eine hohe Staude mit lanzettförmigen, gegenüberstehenden Blättern und ährenförmigem Blüthenstande. Blumen langgestreckt, am Grunde stumpf, mit zwei deutlichen, geschlossenen Lippen; roth, mit gelblichem Rande. Süd-Europa. Bei uns in Gärten.

Der Fingerhut (*Digitalis purpurea*) ähnelt der Vorigen in Form, Größe und Blüthenstand, aber die lange am Grunde spitze Blumenkrone ist vorn offen und in 4 ungleiche Lappen getheilt;

der Mutterkuchen bildet keine Scheidewand, sondern ist frei. Blume hellblutroth, inwendig weißlich, dunkel gefleckt. Auf Bergen, z. B. am Brocken nach Eisenburg hin; bei uns in Gärten. Giftig, als Arzneimittel von Bedeutung, besonders gegen Herzkrankheiten.

Fünfzehnte Klasse. Tetradynamia.

§ 154. Vier lange und zwei kurze Staubfäden, welche mit dem einfachen Stempel sich in derselben Blume befinden, bilden nach Linne den Charakter dieser Klasse. Die hierher gehörigen Pflanzen sind durchgehends krautartige, meistens nur einjährige Gewächse, mit abwechselnden ganzen oder fiederspaltigen Blättern und oft ährenförmig gestellten Blüthen am Ende der Triebe. Jede Blume hat einen vierblättrigen Kelch und vier freie Blumenblätter. Die Früchte sind Schoten, bald langgestreckte, viel-samige; bald kürzere, eiförmige. Hier-nach bildete Linne zwei Ordnungen. Die Pflanzen bilden zugleich auch eine große Familie, die man wegen der kreuz-weis gestellten Blumenblätter Kreuzblumen (Cruciferae) genannt hat.

1. Ordnung. Siliculosa. Mit kleinen, eiförmigen, meistens wenig-samigen Schötchen. Dahin:

Die Kresse (*Lepidium sativum*), eine $1\frac{1}{2}$ hohe Pflanze, mit länglichen, viel-spaltigen Blättern und kleinen, weißen Blumen. Das Schötchen ist zusammengedrückt, herzförmig, und enthält in jedem Fache ein Samenkorn. Man sät sie aus in Gärten und ist die jungen Pflanzen als Salat. Die Samen keimen sehr schnell und lassen sich in feuchtem Löschpapier, das um Flaschen gewunden ist, zur Entwicklung bringen.

Das Taschenkraut (*Capsella bursa pastoris*) hat ein dreieckiges, länglich herzförmiges, oben tief ausgeschnittenes Schötchen, dessen lahnförmige Klappen keinen Flügel bilden. Die Pflanze ist überall gemein, wird $1\frac{1}{2}$ hoch, hat sperrige Aeste, fiederspaltige Blätter, und blüht das ganze Jahr hindurch.

2. Ordnung. Siliquosa. Mit längeren, rundlichen oder eiförmigen, viel-samigen Schoten. Dahin:

Der Kohl (*Brassica oleracea*), mit drehrunder, langer Schote, auf welcher der Griffel als ein kurzer Fortsatz stehen bleibt; Samen in einer Reihe, aber abwechselnd an beiden Rändern befestigt. Die vielfachen Abarten dieser aus dem südlichen Europa stammenden Pflanze werden in allen Gärten gebauet, und als Gemüse gegessen. Der

Rapp- oder Rübsamen (*Br. napus*) hat eine spindelförmige Wurzel, glatte, bereifte Blätter, die oberen herzförmig und den Stengel umfassend, und die unteren leierförmig. Gemein an Wegen und auf Feldern; wird angebaut wegen der ölhaltigen Samen, aus welchen das Rüben- oder Rappöl gewonnen wird. Die Rübe, oder teiltower auch märkische Rübe (*Br. rapa*) hat eine dickere, fleischige Wurzel, nicht bereifte, leierförmige, rauhe Wurzelblätter und glatte, ungetheilte Stengelblätter. Wegen der essbaren Wurzeln bauet man sie an, am besten im losen Sandboden.

Der Rettig oder das Radische (*Rhaphanus sativus*) hat eine dickere, bauchige, gegliederte, runde, inwendig mit leeren Nebenfächern versehene Schote; große, rauhe, leierförmige Blätter und weiße Blumen. Die fleischige Wurzel wird gegessen.

Der Senf (*Sinapis*) hat eine nicht sehr lange, mit Längsstreifen versehene, geschnäbelte Schote. Der weiße S. (*S. alba*) hat sehr kurze, haarige Schoten; der schwarze S. (*S. nigra*), längere, nackte. Beide werden gebauet, besonders in südlichen Gegenden, und liefern das gleichnamige Gewürz. Der schwarze S. ist schärfer und wird besonders zu Blasenpflastern benützt.

Sechszehnte Klasse. Monadelphia.

§. 155. Die gleich langen Staubfäden sind unter sich am Grunde verwachsen, und bilden einen Ring oder Cylinder um die Griffel. Die Ordnungen, hier, wie in den beiden folgenden Klassen, nach der Zahl der Staubgefäße.

1. Ordnung. Pentandria. Mit fünf Staubgefäßen.

Der Reiherschnabel (*Erodium cicutarium*), ein kleines Kraut, mit mehrmals fiederspaltigen Wurzelblättern und aufrechtem doldenförmigem Blüthenschaft. Jede Blume mit 5 Kelchblättern, 5 blutrothen Blumenblättern und zehn Staubfäden, von welchen aber nur fünf Staubbeutel tragen. Frucht fünf Nüsschen, die mit langen Fortsätzen an der Achse fest sitzen, und sich von dieser ablösen, wenn sich der Fortsatz spiralförmig aufrollt. Gemein auf allen Feldern, blühet zeitig im Frühjahr.

2. Ordnung. Decandria. Mit zehn Staubgefäßen.

Die Gattung der Kranichschnabel (*Geranium*) hat ganz die Kennzeichen der vorigen, aber die zehn Staubfäden tragen alle Staubbeutel. Man hat bei uns viele Arten, unter welchen sich mehrere durch einen eigenthümlichen Geruch auszeichnen; z. B. *G. robertianum*, Blüthenschaft mit zwei kleinen, rothen Blumen, Blätter dreitheilig oder fünfteilig, jedes Blättchen dreilappig gefiedert; Blumenblätter ohne Ausschnitt, Kelchblätter mit einer Granne. Gemein in allen Gebüschen; stinkt wie Fuchslöschung.

3. Ordnung. Polyandria. Mit vielen Staubgefäßen.

Hierher die Familie der Malvengewächse (*Malvaceae*), bei welcher die vielen Staubfäden einen dichten Cylinder bilden, aus dessen Spitze die Griffel, deren Anzahl sehr verschieden ist, hervorragen. Der Kelch ist fünfklappig, meistens mit Hüllblättern am Grunde (äußerer Kelch); die Blumenkrone fünfblättrig, Blätter am Grunde zusammenhängend. Die Frucht besteht theils aus vielen einsamigen in einen Kreis um den Fruchtboden gestellten Achenien, theils aus einer mehrklappigen, mehrfächerigen, viel-samigen Kapsel. 3. B.

Die Bauerröse (*Althea rosea*), mit fünf- oder mehrklappigem, äußerem Kelch, vielen Griffeln und vielen einsamigen Achenien in einem Ringe. Eine aufrechte, mehrjährige Staude, mit großen, rauhen, fünfklappigen Blättern, und großen ährenförmig gestellten, meistens rothen Blumen. In Gärten, stammt aus Griechenland und der Türkei. Eine bei uns einheimische, kleinere Art, der Eibisch (*A. officinalis*), hat filzige Blätter, wovon die unteren herzförmig, die oberen länglich eiförmig, undeutlich dreiklappig sind, und fleischfarbige Blumen. Wächst auf Wiesen, und enthält, besonders in der Wurzel, viel Schleim; daher man diese, wie auch die Blätter, zum Brustthee benützt.

3 X Die Baumwollpflanze (*Gossypium herbaceum*) hat einen dreiblättrigen, gezähnten, äußeren Kelch und einen einblättrigen becherförmigen, inneren; Frucht eine dreiklappige, dreifächerige Kapsel; Samen von weicher Wolle eingehüllt. Die Pflanze ist eine mäßige Staude mit sperrigen Ästen, fünfklappigen Blättern, deren Mittelnerve einen Drüsenfleck hat, und gelben Blumen mit violettem Fleck am Grunde jedes Blattes; sie wächst in Ostindien wild und wird auch angebauet, da die wollige Hülle des Samens die bekannte Baumwolle liefert.

Siebenzehnte Klasse. Diadelphia.

§. 156. Die gleich langen Staubgefäße sind in zwei Bündeln mit einander verwachsen. Die Anzahl der Staubgefäße giebt die Kennzeichen der Ordnungen.

1. Ordnung. Hexandria: Mit sechs Staubgefäßen.

Das gemeine Rauchkraut (*Fumaria officinalis*) hat einen zweiblättrigen, hinfälligen Kelch; eine vielblättrige, rachenförmige Blumenkrone, deren oberes Blatt am Grunde in einen stumpfen Sporn ausläuft. Die Frucht schötchenförmig, einsächerig, einsamig. Die Pflanze wächst bei uns auf Kornfeldern, hat einen etwas niederliegenden Stengel, dreimalgefiederte Blätter, deren feilsförmige

Blättchen wieder getheilt sind, und einen ährenförmigen Blüthenstand; die Blumen sind fleischfarben, mit dunklerer Mündung.

2. Ordnung. Decandria. Mit zehn Staubgefäßen.

Diese Ordnung bildet eine sehr große Familie, die unter dem Namen der Hülsenpflanzen (Leguminosae) oder Schmetterlingsblumen (Papilionaceae) bekannt ist. Es sind theils baum-, theils krautartige Gewächse, oft mit rankenden Stengeln, und allermeist einfach gefiederten, seltener gefingert gefiederten Blättern. Die Blumen stehen in den Blattachseln, oder am Ende, und bilden Trauben, Knöpfe, oder stehen paarweis. Jede hat einen einfachen, fünfzähligen Kelch und fünf Blätter, von welchen je 2 gleiche Gestalt und Größe haben. Das fünfte, unpaare, oberste Blatt ist größer und steht meistens aufrecht: man nennt es Segel (vexillum); die beiden folgenden sind häufig beilsförmig gestaltet und heißen Flügel (alae), die beiden untersten verwachsen meistens zu einer Rinne, die den Namen Kiel (carina) erhält. In dieser liegen Stempel und Staubfäden. Die letzteren bilden einen Cylinder um jenen, und hängen theils alle, theils bis auf einen, unter sich zusammen; dieser eine ist immer der oberste. Die Frucht ist eine zweiflappige Hülse, in welcher die großen Samen an einer Naht sitzen. Viele Pflanzen dieser Familie sind wichtig; z. B.

Die Bohnen (Phaseoli), allermeist rankende Pflanzen, mit abwechselnden, gedreiten, herzförmigen Blättern und traubenförmigen Blumen, deren Kiel mit den Staubfäden und dem Stempel spiralförmig aufgerollt ist. Hülsen lang, groß; Samen nierenförmig. Man bauet bei uns zwei Arten: die Schneide- oder Schminkbohne (Ph. vulgaris), mit rankendem Stengel und gezweigten Blumenstielen, Stützblättchen kürzer als der Kelch, abstehend; — und die Zwerg- oder Brechbohne (Ph. nanus), mit aufrechtem, glattem Stengel und Stützblättchen, die über den Kelch hinausragen. Beide mit weißen Blumen. Eine dritte Art mit feuerrothen Blumen und geflecktem, größeren Samen (Ph. multiflorus), die aus Süd-Amerika stammt, zieht man als Zierpflanze in Gärten.

Die Erbse (Pisum sativum) hat auch rankende Stengel und zweipaarig gefiederte, in eine Ranke auslaufende Blätter. Blumenstiele vielblumig, in den Blattachseln, mit weißen Blüthen. Same kugelig. Ueberall angebauet seit langer Zeit, daher man das eigentliche Vaterland der Erbse nicht mehr kennt.

Die Kieherbse (Lathyrus odoratus), wie die Vorige rankend, mit achselständigen, zweiblumigen Blüthenstielen und in Ranken auslaufenden Blättern. Blumen dunkelroth und weiß, wohlriechend, mit breitem Segel und ungleich langen Kelchzähnen. Aus Spanien, bei uns als Zierpflanze in Gärten.

Die Wickengattung (*Vicia*) hat einen fünfzähligen Kelch, dessen beide oberen Zähne kürzer sind, und einen dünnen dicht unter der Narbe mit einem Haarschopf versehenen Griffel. Hülse langgestreckt, vielsamig. Man bauet bei uns 2 Arten; die Saatwicke (*V. sativa*), mit rankig gefiederten Blättern und achselständigen zweiblumigen Blüthenstielen; Blättchen mit Dolchspitzen, unten verkehrt herzförmig, oben länglich eiförmig, Hülse haarig; — und die Saubohne (*Vicia faba*); mit aufrechtem, dickem Stengel und nicht rankig gefiederten Blättern; Blättchen eiförmig, glatt. Blumen zu drei; Hülse haarig, besonders inwendig; Samen groß, nierenförmig. Stammt vom kaspischen Meere.

Die Linse (*Ervum lens*), mit gleichzähligem Kelch und aufrechtem, überall haarigem Griffel. Hülse wenig. (2–5.) samig, Samen zusammengedrückt. Blumen je zwei, den Blättern gegenüberstehend, weiß; stammt aus dem südlichen Europa.

Die große Gattung des Klee's (*Trifolium*) hat nicht rankende Stengel, gedreite Blätter und einen rundlichen, knopfförmigen Blüthenstand. Kelchzähne ungleich, die oberen kürzer; Hülse vom Kelch oder der Blumenkrone verdeckt, höchstens viersamig. Unter den vielen Arten ist *Tr. repens*, mit weißer, stehenbleibender Blumenkrone, doldenförmigen Blüthenknospen, viersamigen Hülse, verkehrt eiförmigen, leicht gezähnten Blättern und kriechendem Stengel, eine der gemeinsten. Ueberall auf Stoppelfeldern und zwischen dem Getreide.

Achtzehnte Klasse. Polyadelphia.

§. 157. Die vielen, gleich langen Staubfäden stehen mit den Stempeln auf demselben Fruchtboden und sind in mehrere Bündel verwachsen. Hierher allermeistens ausländische Gattungen; z. B.

Der Kakaobaum (*Theobroma cacao*), ein mäßiger Baum von 15 Fuß Höhe, mit großen, breiten, ovalen, zugespitzten Blättern und einzelnen Blüthenbüscheln zerstreuet an den Zweigen. Jede Blume mit fünftheiligem Kelch, fünf länglichen, rosenrothen Blumenblättern, fünf fruchtbaren Staubfäden mit fünf unfruchtbaren abwechselnd und fünftheiligem Griffel. Die Frucht eine dicke, langgestreckte, beiderseits zugespigte, fünffächerige Kapsel mit großen Samen in einem Brei. Aus den Samen bereitet man die Chocolate. Der Baum wächst im heißen Amerika (besonders Mexiko) wild, wird aber auch dort angebauet in schattigen Wäldern.

Die Drangengattung (*Citrus*) hat einen drei- bis fünfzähligen Kelch, 5 Blumenblätter und viele in mehrere Bündel verwachsene Staubfäden; die Frucht ist mehrfächerig, saftig, enthält in

jedem Fach 2—3 Samen, und wird von einer lederartigen drüsenreichen Haut bekleidet. Zwei Arten sind besonders wichtig: der Pomeranzenbaum (*C. aurantium*), mit geflügelten Blattstielen und kugeligen, in der Längsachse zusammengedrückten Früchten; und der Citronenbaum (*C. medica*), mit ungeflügelten Blattstielen und länglich eirunden, an jedem Pol zugespitzten Früchten. Beide stammen aus Asien, werden seit langer Zeit in Italien und Süd-Europa angepflanzt, aber auch bei uns in Treibhäusern gezogen.

Einheimisch ist aus dieser Klasse nur die Gattung des Johanniskrauts (*Hypericum*), mit fünfklappigem Kelch, fünf Blumenblättern und 3—5 Staubfadenbündeln; Frucht 3—5-fächerig, mit vielen Samen am mittleren Mutterkuchen. Gemein ist *H. perforatum*, mit gegenüberstehenden, oval lanzettförmigen, gelb punctirten Blättern und gelben Blumen in den Blattachseln und am Ende. An Wegen, auch in Gebüsch, besonders an sonnigen Stellen.

Neunzehnte Klasse. Syngenesia.

§. 158. Die Antheren der fünf Staubgefäße sind in einen Ring verwachsen, welcher von den an der Blumenkrone festgewachsenen Fäden getragen wird und den einfachen, oben in 2 spirallig eingerollte Narben getheilten, Griffel umgiebt.

Es bildet diese ganze Klasse eine einzige Familie, die unter dem Namen der zusammengefügten Blumen (*Compositae*) bekannt ist. Sie hat den größten Umfang unter allen, indem der zwölfte Theil aller bekannten Pflanzen und über 300 Gattungen hierher gehören. Folgendes sind ihre gemeinsamen Merkmale: — Es sind allermeistens Kräuter, seltener Sträucher, noch seltener Bäume, mit abwechselnden oder gegenüberstehenden zerschlissenen Blättern und vielen Blüthen auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden. Dieser ist allermeistens halbkugelig, bisweilen kegelförmig gewölbt, und hat kleine Grübchen, in welchen die einzelnen Blumen sitzen; zwischen diesen stehen noch kleine Hüllblättchen, eins für jede Blume, auf dem Fruchtboden, welche Spreublätter (*paleae*) heißen. Die Blüthen haben einen unterständigen Fruchtknoten, der sich zu einer einfachen Weichfrucht (*caryopsis*) entwickelt; ihr Kelch ist theils blättrig, theils borstig, theils haarig, theils federförmig, bleibt auf der Spitze des reifen Samens stehen, und bildet die Samenkrone (*pappus*). Die Blumenkrone ist einblättrig, röhrig, theils regelmäsig fünfklappig, theils in einen zungenförmigen Lappen verlängert. Nach der Stellung auf dem Fruchtboden unterscheidet man die mittleren als Scheibenblumen (*flores discoidales*), die seitlichen als Randblumen (*flores marginales*) oder Strahlenblumen (*flores radiantes*), wenn sie zungenförmig gebildet sind. Der gemeinschaft-

liche Fruchtboden hat eine, aus mehreren übereinanderstehenden Blätterreihen (Schuppen, squamae) zusammengesetzte, Hülle, welche anthodium, calyx communis oder periclinium genannt wird.

Sinne theilt diese Klasse in 4 Ordnungen.

1. Ordnung. Aequalis. Die Scheiben- und Randblumen haben gleiche Gestalt und gleichen Bau. Aus allen entwickeln sich reife Samen.

a. Alle Blumenkrönen regelmäßig fünfklappig. Cynareae.

Die Distelgattung (*Carduus*) hat eine borstig haarige Samenkrone und Hüllenschuppen, die in steife Stacheln auslaufen. Fruchtboden borstig. Unter mehreren bei uns einheimischen Arten ist *C. nutans*, mit herablaufenden am Rande dornigen Blättern und hängenden Blumentöpfen, deren Hüllenschuppenstacheln sehr groß, weitabstehend und lanzettförmig sind, eine der gemeinsten. Auf Feldern, an Wegen &c.

Die Klette (*Arctium lappa*) hat den knopfförmigen Blütenstand der Vorigen, aber die Hüllenschuppen haben hakige Stacheln, die Blätter sind groß, breit, ohne Stacheln, aber filzig. Ueberall gemein an Wegen, Zäunen &c.

b. Alle Blumenkrönen zungenförmig. Cichoreae.

Der Löwenzahn oder die Butterblume (*Leontodon Taraxacum*) hat einen unzgetheilten Schaft, dessen Blütenboden von einer vielblättrigen Hülle umgeben ist. Der Boden ist nackt, und die Samen haben eine große, gestielte, haarige Krone; Blätter entspringen aus der Wurzel und sind länglich, schrotzählig. Ueberall gemein.

Die Cichorie (*Cichorium Intybus*) hat einen verzweigten Stengel, mit himmelblauen Blütenknöpfen in den Blattachseln, deren Hülle aus einer doppelten Blätterreihe besteht. Fruchtboden mit Spreublättern, Same mit ähnlicher, aus kleinen Blättchen gebildeter Krone. Ueberall gemein an Wegen; wird wegen der großen fleischigen Wurzel, die man geröstet und gemahlen unter den Kaffee mischt, auch angebauet, und wächst am liebsten im leichten Sande.

2. Ordnung. Supersua. Scheibenblumen regelmäßig fünfklappig, Randblumen bald ebenso, bald zungenförmig, bloß weiblich. Alle geben reife, vollkommene Samen.

a. Alle Blumen regelmäßig, fünfklappig.

Der Rainfarren (*Tanacetum vulgare*), eine staudenartige Pflanze mit doppeltfiederspaltigen Blättern, deren Lappen gezähnt sind. Blumen am Ende in Asterdolden, gelb; Hüllblättchen dachziegelartig, rund. Randblumen klein, meist dreiklappig, Fruchtboden nackt. Samenkrone sehr klein. Gemein in Gebüschen, an Gräben, Flüssen &c.

Der **Beremuth** (*Artemisia Absinthium*) hat einen aufrechten ästigen Stengel mit weißgrauen, dreimal fiederspaltigen Blättern; Blumenknöpfe rundlich, nickend; Fruchtboden nackt, Hülle dachziegelförmig schuppig. Samenkorne fehlt. Nicht selten an Wegen, auf Rehrichthäusen u. s. w.

b. Mit großen, zungenförmigen Strahlblumen. *Radiatae*.

Die **Gartenaster** (*Aster chinensis*), eine einjährige Staude mit wenigen sperrigen Zweigen, die am Ende einen großen, flachen Blumenkopf tragen. Blumenhülle schuppig, blattförmig; Fruchtboden nackt; Randblumen verschieden farbig, bläulich oder roth, bisweilen weiß; Blätter länglich lanzettförmig, gezähnt, sitzend, die oberen spatelförmig. Aus China, bei uns in Gärten als Zierpflanze.

Das **Gänseblümchen** oder **Tausendschön** (*Bellis perennis*) hat einen kegelförmigen, nackten Fruchtboden, eine flache, schuppige Blüthenhülle, weiße Strahlblumen mit rothen Spigen und gelbe Scheibenblumen. Blätter spatelförmig, entspringen aus der Wurzel; ein aufrechter Blüthenschaft. Ueberall gemein auf Viehweiden.

Die **Chamille** (*Matricaria Chamomilla*) hat einen kegelförmigen, hohlen, nackten Fruchtboden und eine flach ausgebreitete, schuppige Blüthenhülle, deren Blättchen vertrocknen; Randblumen weiß und herabhängend. Blätter zweimal fiederspaltig mit linienförmigen Lappen. Häufig auf Stoppelfeldern; wird als Heilmittel benutzt.

Die **Schafgarbe** (*Achillea millefolium*) ist eine aufrechtstehende, 1' hohe Pflanze; mit gefurchem Stengel und zweimal fiederspaltigen Blättern, deren Lappen zugespitzt sind. Blüthenknöpfe in Asterschrauben am Ende des Stengels; jeder mit flachem, von Spreublättern bedecktem Fruchtboden und schuppiger Hülle; Randblumen gering an Zahl, alle weiß. Gemein an Wegen, überall.

3. Ordnung. *Frustranea*. Hat Zwitter Scheibenblumen die Samen tragen, und unfruchtbare, weibliche Randblumen. Dahin:

Die **Kornblume** oder **Tremse** (*Centaurea cyanus*), mit kugelförmiger, schuppiger Hülle, deren Blättchen am Rande in schwarze Zähne auslaufen; borstigem Fruchtboden und borstiger Samenkorne. Randblumen röhrig und geschlechtslos, alle blau gefärbt. Blätter schmal, lanzettförmig, wie die sperrigen Stengel wollig. Ueberall zwischen dem Getreide.

4. Ordnung. *Necessaria*. Mit bloß männlichen, regelmäsig fünflappigen, röhrenförmigen Scheibenblumen und weiblichen, zungenförmigen Strahlblumen, welche allein Samen tragen. Dahin:

Die Ringel- oder Todtenblume (*Calendula officinalis*), mit nacktem, flachem Fruchtboden, vielblättriger Hölle und großen, flachen, lahn- oder halbmondsförmigen, am Rande dornigen Samen. Blumen dunkel rothgelb, Blätter einfach, ungetheilt, länglich herzförmig, zugespitzt. Wird als Bierpflanze in Gärten, besonders aber auf Kirchhöfen, angebauet, und zum Schmuck der Leichen benugt.

Zwanzigste Klasse. Gynandria.

§. 159. Staubfäden und Pistill sind bei den Pflanzen dieser Abtheilung in eine Säule verwachsen, welche auf dem Fruchtknoten ruhet, und an der die Narbe, und darüber oder daneben die Staubbeutel befestigt sind.

1. Ordnung. Monandria. Mit einem Staubgefäß.

Diese Abtheilung bildet eine große Familie monokotyledonischer Gewächse, die mit dem Namen der Saleppflanzen oder Orchideen (*Orchideae*) bezeichnet wird. Alle sind krautartige Pflanzen mit knolligen oder gefingerten Wurzeln, scheidenförmigen, allermeist ungetheilten, ovalen oder lanzettförmigen Blättern, und aufrechtem Blüthenschaft, an welchem die Blumen eine Kehre bilden. Jede Blume hat unter sich ein Stüßblatt, dann folgt der unterständige Fruchtknoten, und dieser trägt die unregelmäßige, sechsblättrige, gefärbte, rachenförmige Blumenhülle; drei kleinere Blätter bilden die Oberlippe, und von diesen biegt sich das mittlere über das in eine Säule verwachsene Pistill und Staubgefäß wie ein Helm; die anderen drei bilden die Unterlippe, besonders das mittlere große, oft merkwürdig gestaltete, meistens in mehrere Lappen getheilte und gespornte. Die Frucht ist eine langgestreckte, einfächerige Kapsel, in welcher die sehr kleinen, vom Mantel umgebenen Samen an 3 peripherischen, streifenförmigen Mutterkuchen festliegen. Die eigentliche Heimath dieser sehr großen Familie ist das tropische Klima, unter welchem sie, besonders in feuchten Waldungen, oft als Schmarogerpflanzen, außerordentlich gedeihen. Manche dieser sind außerordentlich schön. Eine derselben (*Epidendron Vanilla*) liefert das angenehme Gewürz Vanille, welches die Samenkapsel ist, die einheimischen wachsen vorzugsweise auf Wiesen und Torfmoor; z. B.

Das Knabenkraut oder der Salep (*Orchis latifolia*) hat eine aus zwei länglichen Knollen bestehende Wurzel; große, breite, braungefleckte Blätter; einen hohlen Schaft und hell blutrothe Blumen. Die Unterlippe ist groß, breit, dreilappig, mit abwärts gebogenen Rändern und einem kurzen, abgerundeten Sporn am Grunde.

Gemein auf allen Wiesen, heißt auch, wiewohl mit Unrecht, Kuckucksblume.

Bei *Ophrys ovata* haben die oberen Blumenblätter fast gleiche Größe, aber das mittlere untere (Unterlippe) ist sehr lang, breit, gabelförmig gespalten und hat keinen Sporn; die Pflanze hat eine aus vielen, dicken Fasern bestehende Wurzel, zwei große, eiförmig kreisrunde Blätter und einen aufrechten Blüthenschaft, mit vielen grünen Blumen. Häufig in Gebüsch.

Der Frauenschuh (*Cypripedium calceolus*) bildet nach Linne eine besondere Ordnung, da er zwei Staubfäden hat, gehört aber in diese Familie. Die gelbe Unterlippe ist groß, breit, bauchig, oben mit länglicher Oeffnung, wie ein Holzschuh; die übrigen Blumenblätter sind grade, lanzettförmig, groß, und haben eine braunrothe Farbe. Stengelblätter breit, eiförmig, zugespitzt; Wurzel faserig. In Gebirgsgegenden des mittleren Deutschlands.

2. Ordnung. Hexandria. Mit sechs Staubgefäßen. Dahin:

Die Osterluzei (*Aristolochia clematitis*), eine krautartige Pflanze, mit abwechselnden, ziemlich großen, herzförmigen Blättern, und einigen Blumen in den Blattachseln; jede auf einem besonderen Stiel, mit unterständigem Fruchtknoten, und einfacher, einblättriger, tulpenförmiger, am Grunde bauchig erweiterter, gelber Blumenhülle. In dieser Erweiterung steckt die Narbe, mit sechs Zwillingsstaubbeuteln in ihrem Umfange. An Zäunen, auch in Gärten zu Lauben.

Einundzwanzigste Klasse. Monoecia.

§. 160. Linne rechnete hierher alle Pflanzen, bei welchen die Staubgefäße und Stempel nicht auf demselben Fruchtboden, sondern in ganz verschiedenen Blumen stehen, die verschiedenen, männlichen und weiblichen, Blumen aber von demselben Stamm getragen werden. Im Deutschen pflegt man sie einhäusige Pflanzen zu nennen. Die Ordnungen setzte Linne nach der Anzahl der Staubfäden fest. Folgende Familien stehen hier:

1. Fam. Nesselpflanzen (*Urticeae*). Krautartige Pflanzen oder Sträucher und Bäume, mit abwechselnden oder gegenüberstehenden Blättern und Blumen in den Blattachseln; beide läppchenförmig oder gehäuft, mit 4 — 5 lappigem Kelch, ohne Blumentrone, und so viel Staubgefäßen als Kelchlappen. Frucht ein trockenes oder fleischiges Achenium. Dahin:

Der Brennnessel (*Urtica urens*), krautartig, mit läppchenförmigem Blüthenstande, Kelch 4 lappig, 4 Staubgefäße um ein be-

cherförmiges Honiggefäß; weiblicher Kelch 2- bis 4-blättrig; Nüßchen vom Kelche umhüllt. Blätter gegenüberstehend, elliptisch, stark gezähnt, mit starken, steifen, brennenden Haaren besetzt. Ueberall gemein.

Der Maulbeerbaum (*Morus nigra*), großer Baum, mit herzförmigen, meist dreilappigen Blättern. Männlicher Kelch 4-lappig, mit 4 Staubfäden, weiblicher mit einfachem Fruchtknoten, worauf zwei Narben; Frucht eine einsamige Beere, deren viele dicht gedrängt auf demselben Fruchtboden stehen, schwarz. Bei uns angepflanzt zur Kultur des Seidenwurmes; stammt aus China.

2. Fam. Laubhölzer (Amentaceae), große Bäume, mit einfachen, aber abwechselnden, breiten Blättern, und kästchenförmigen Blüthen in den Blattachseln. Staubfäden unbestimmt. Die Frucht eine große einsamige Nuß, die in dem später zu einem holzigen Nüßchen (*cupula*) veränderten Hüllblättern figen bleibt, und theils ganz (Buche), theils zur Hälfte (Eiche) von ihm umgeben wird; oder ein Zapfen, unter dessen holzigen Schuppen ein oder zwei kleine geflügelte Achenien stecken (Birken).

Die Eichengattung (*Quercus*) hat lange, gedehnte männliche Kästchen, deren Blumen aus einem blattartigen Kelche bestehen, der strahlig getheilt ist, und viele Staubfäden umschließt; weibliche Hülle einfach, mit Schuppen besetzt. Frucht eine große Nuß, am Grunde von dem grade abgeschnittenen, außen schuppigen Nüßchen umgeben. Man hat bei uns 2 Arten: *Q. robur* mit größeren, gelappten Blättern, und größeren, ungestielten Nüssen; *Q. pedunculata*, mit kleineren, noch tiefer gelappten Blättern und der Reihe nach an einem längeren Stiel festliegenden Früchten.

Die Haselnuß (*Corylus avellana*), ein holziger Strauch, mit ziemlich runden, unregelmäßig gezähnten Blättern. Männliche Blumen in großen Kästchen, Staubfäden 4—8 unter Schuppen. Weibliche Blumen zu 8 oder 4, jede mit lappigem größerem tief getheiltem Involukrum und 2 blutrothen Narben. Frucht eine einsamige Nuß, zur Hälfte vom häutigen großlappigen Nüßchen umgeben. Ueberall in Wäldern, und angepflanzt in Gärten.

Die Buche (*Fagus sylvatica*), ein großer Baum, mit aufrechtem, glattem Stamm und fast horizontalen Zweigen. Blätter eiförmig, ganzrandig; männliche Blumen ohne Hüllblätter, mit fünf-lappigem Kelch und mit vielen Staubfäden; weibliche Blumen je 2, außer dem Kelch von einem vierblättrigen weichtacheligen Involukrum umgeben; jede mit dreikantigem Fruchtknoten, worauf 3 Narben. Die Frucht besteht aus 2 dreieckigen Nüßchen, die ganz von dem nunmehr harten, holzigen Nüßchen umschlossen sind.

Die Hainbuche oder Weißbuche (*Carpinus betulus*), ein

mäßiger Baum mit eiförmigen, gezähnten Blättern. Blumen in Räschen, männliche größer, unter Schuppen, mit 10 – 20 Staubfäden; weibliche mit größeren, gespaltenen Schuppen, und unter jeder 2 Fruchtknoten mit gabeliger, rother Narbe. Frucht eine gefurchte Nuß, von dem großen, dreilappigen schuppenförmigen Räschen leicht eingehüllt.

Die Birke (*Betula*) ist baumartig, mit dünnen, sehr schlanken Stämmen und aufrechten Zweigen; Blumen in Räschen, unter jeder Schuppe der männlichen mehrere kleinere Schüppchen mit einer Zwillinganthere; weibliche Räschen holzig, unter jeder Schuppe drei geflügelte Nüssen. Die Weißbirke (*B. alba*) hat aufrechte Zweige und eiförmige, spize, doppelt gezähnte Blätter; die Hängebirke (*B. pendula*) hat dünne am Ende herabhängende Zweige, mehr dreiseitige Blätter, und längere, zugespitzte Schuppen der weiblichen Räschen.

Die Erle oder Eller (*Alnus glutinosa*) hat ganz die Kennzeichen der Birke, aber unter den Schuppen der männlichen Räschen stehen vier vierlappige Schüppchen, jedes mit vier Staubfäden; weibliche Schuppen mit zwei Fruchtknoten, woraus eine zweifächerige, in jedem Fach einsamige Kapsel. Der Baum liebt feuchte Standorte, daher in Brüchen, hat einen graden Stamm und fast keilförmige, unten in den Achseln der Rippen haarige, jung klebrige Blätter.

3. Fam. Nadelhölzer oder Zapfenbäume (*Coniferae*). Ebenfalls große Bäume, mit gradem, hohem Stamm, und allermeist quirlförmig gestellten Zweigen. Blätter rundlich, schmal, nadelförmig, oder breiter, lanzettlich, lederartig. Blumen in Räschen; männliche bloß aus Staubbeutel bestehend, weibliche aus dicken flachen offenen Fruchtknoten (Schuppen), welche hernach den harten, kegelförmigen Zapfen bilden. Dahin:

Die Gattung *Pinus*, kenntlich an den großen, kegelförmigen Zapfen, deren Schuppen dick und aufgeworfen sind, und an den in einen Bündel verwachsenen Staubfäden. Blätter sehr schmal, lang, dünn, spiz, haufenweis gestellt. Dahin: die Kiefer oder Föhre (*P. silvestris*), mit je zwei straffen unterhalb gewölbten Blättern und einzelnen Zapfen, deren Schuppen rautenförmig abgestuft sind. Ueberall als Waldbaum, besonders im Norden; liefert Bau- und Brennholz, Theer, Terpenthinöl, Colophonium und Pech. — Die Pinie (*P. pinea*) ebenfalls mit je zwei Blättern, die jung haarig sind, und sehr großen Zapfen, deren Schuppen am Ende abgerundet sind und stark vortreten. Süd-Europa; die Samen werden gegessen, die Zapfen von den Alten zu Bachantensäßen benützt. — Die Weymouthsfichte (*P. strobus*), mit je 5 sehr langen, dünnen Nadeln und großen, länglichen Zapfen. Aus Nord-Amerika, bei uns in Lustgärten.

Die Gattung *Abies* hat längere, gestrecktere, gleichmäßiger dicke Zapfen, mit dünneren, glatten abfallenden Schuppen. Die Blätter zerstreut, ohne bestimmte Ordnung, aber sehr dicht und zahlreich in Büscheln, allermeist etwas breiter. Samen reifen schneller. Dahin: die *Ceder* (*A. cedrus*), Blätter straff, spitz, büschelweis; Zapfen elliptisch, Schuppen angebrückt und abgestugt. Großer Baum, der ein ungeheures Alter erreicht und besonders auf dem Libanon wächst. Holz wohlriechend, zu Bleisfedern. — Der *Lärchenbaum* (*A. larix*), mit jährlich abfallenden, stumpfen, büschelweis gestellten Blättern und eiförmigem Zapfen, dessen Schuppen am Rande zurückgebogen und zerrissen sind. Süd-Europa; bei uns einzeln in Anpflanzungen. Holz sehr dauerhaft. — Die *Edel- oder Weisstanne* (*A. picea* s. *A. pectinata*) hat zweireihig gestellte, ziemlich breite, unten weiße Blätter, und aufrecht stehende Zapfen mit stumpfen, angebrückten Schuppen. Mehr südlich, bei uns nur einzeln angepflanzt. — Die *Nothtanne* (*A. excelsa*. *Pinus abies* Linn.), mit viereckigen, spizen, zweireihig zerstreut stehenden Blättern; Zapfen groß, hängend, mit breiten, flachen, abgerundeten Schuppen, die am Rande wie ausgeknagt erscheinen. Besonders im nördlichen Europa, Schweden, Finnland; liefert die höchsten und besten Mastbäume.

Zweiundzwanzigste Klasse. Dioecia.

§. 161. Die Pflanzen dieser Klasse haben mit denen der vorhergehenden große Aehnlichkeit, aber unterscheiden sich von ihnen dadurch, daß die verschiedenen Blumen auch auf verschiedenen Stämmen stehen, so nemlich, daß eine Pflanze nur männliche, die andere nur weibliche trägt. Linne theilte diese Klasse ebenfalls nach der Zahl der Staubgefäße in Ordnungen. Da die meisten mit in die Familien der vorigen Klasse gehören, so werden wir sie denen anreihen.

Zu den *Urticeen* gehört:

Der *Hanf* (*Cannabis sativa*), eine einjährige, staudenartige Pflanze, mit zusammengesetzten, fünffachen Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gezähnt sind. Blumen in den Blattachseln, die männlichen traubenförmig mit fünfblättriger, grüner Blumenhülle und 5 Staubfäden; weibliche gedrängt, unter Schuppen, ein einfacher Fruchtknoten mit 2 kolbigen Narben. Frucht ein Nüßchen. Ueberall angebaut, aus dem Stengel bereitet man den Hanf, der zu Reifen, Bindfaden, Tauen verarbeitet wird; die Samen geben Del.

Der *Hopfen* (*Humulus lupulus*), eine rankende, vieljährige Staude, mit großen, fünfklappigen, gezähnten, gegenüberstehenden

Blättern und achselständigen Blumen. Männliche in Trauben; Blumenhülle fünfblättrig, grün; fünf Staubgefäße. Weibliche Blumen bilden einen Zapfen, dessen Schuppen weich und blattartig sind; unter jeder Schuppe ein einfacher Fruchtknoten mit gabeliger Narbe. Same ein Nüßchen. Wild in Wäldern und Gebüsch, wird angebaut und zum Würzen des Bieres benutzt.

Zu den Zapfenbäumen gehören:

Der **Tarnsbaum** (*Taxus baccata*), ein mäßiger Baum mit dicht gedrängten Zweigen und zerstreut stehenden, schmalen, linienförmigen, zugespitzten Blättern. Männliche Blumen mit vierlappigem Kelch, 4 Blumenblättern und einem traubenförmigen Staubgefäßbüschel; weibliche mit schuppenförmigem Kelch, und einfachem Fruchtknoten, woraus sich eine einsamige, vom Kelch am Grunde umgebene, rothe, offene Beere bildet. Südlich, bei uns angepflanzt in Gärten, besonders früher, wo man den Baum pyramidenförmig zuzugte.

Der **Wachholder** oder **Knirkstrauch** (*Juniperus communis*), bei uns ein kleiner Strauch mit niedergebrückten Aesten, und zerstreuten, eckigen, sehr spitzen, stacheligen Blättern; im Norden Europa's mehr baumartig. Blumen in den Blattachseln, männliche zapfenförmig, die kugelförmigen Staubbeutel am Rande der Schuppen; weibliche ebenso, die unteren Schuppen leer, zwischen den beiden obersten ein Fruchtknoten mit 3 Narben, der sich zu einer 1—3samigen Beere ausbildet.

Eigenthümliche Familien dieser Klasse sind folgende:

1. Fam. **Weidenbäume** (*Salicineae*). Bäume mit einfachen, abwechselnden Blättern und achselständigen, kähnenförmigen Blüthen, deren Hüllen bloße, blattartige Schuppen sind. Die Früchte sind vielsamige, längliche, ein- oder zweifächerige Kapseln mit vielen, kleinen, von seidenartigen Haaren umgebenen Samen. Dahin:

Die **Weide** (*Salix*); männliche Kähnen unter jeder Schuppe mit 1—5 Staubfäden; weibliche mit einfachem Fruchtknoten, worauf 2 Narben; Kapsel eiförmig, Samen an den Klappen befestigt. Unter den vielen Arten dieser Gattung sind besonders häufig: die **weiße W.** (*S. alba*), mit lanzettförmigen, zugespitzten, gesägten, beiderseits seidenhaarigen Blättern und zweitheiligen Narben. Ueberall gemein an Wegen, Dörfern etc. — Die **Korbweide** (*S. viminalis*), mit sehr langen, linear lanzettförmigen, fast ganzrandigen Blättern, die auf der unteren Seite seidenhaarig sind. Die Kähnenschuppen behaart, Haare der weiblichen sehr lang. An den Ufern der Flüsse, Gräben etc. häufig. — Die **Trauerweide** (*S. babylonica*), mit sehr langen, zugespitzten, glatten Blättern und herabhängenden Zweigen. Südlich, bei uns angepflanzt, besonders an Gräbern.

Die Pappel (*Populus*) hat alle Kennzeichen der Weide, aber die Rägenschuppen sind gelappt, die männlichen mit 8 Staubfäden, die beiden Narben bisweilen zweilappig. Man kennt bei uns mehrere Arten, z. B. die italienische P. (*P. dilatata*), mit dreieckigen, spizen, gezähnten, beiderseits glatten Blättern, die breiter sind als lang. Zweige aufrecht, daher der ganze Baum lang gestreckt pyramidenförmig erscheint. Stammt aus dem nördlichen Italien, bei uns angepflanzt zu Aleen; die meisten hiesigen Bäume sind männliche. — Die Bitterpappel oder Espe (*P. tremula*), mit runden, spitzgezähnten, beiderseits glatten Blättern, und sehr schmalen, stark zusammengedrückten Blattstielen. Ebenfalls ein großer Baum mit mehrsperrigen Zweigen, oft buschig als Unterholz in Wäldern. —

2. Fam. Palmen (*Palmae*). Hohe Bäume, mit grade aufsteigendem, rauhem oder getäfeltem, unverzweigtem Stamm, welcher an seiner Spitze mehrere große, langgestielte, zusammengesetzte, theils gefiederte, theils fächerförmige Blätter trägt. Blättchen einfach, ungetheilt. Blumen in Kolben, Rispen oder Trauben mit sechsblättrigem Perigonium in 2 Reihen, sechs Staubgefäßen und allermeist drei Narben. Die Geschlechter sind nicht immer getrennt, viele Palmen haben die männlichen und weiblichen Blumen auf demselben Stamm, gehören also in die vorige Klasse, noch andere tragen die verschiedenen Blumen sogar in einer und derselben Traube (androgynischer Bau), wenige endlich, aber grade die wichtigsten und bekanntesten, sind wahrhaft diözisch, daher wir keinen Anstand nehmen, die Familie hierher zu stellen. Palmen finden sich nur zwischen den Wendekreisen, wachsen gemeinlich in der Nähe des Wassers, daher am Strande oder an Flußufern, und bilden keine dichten Wälder, sondern stehen einzeln, höchstens haufenweis, am liebsten zwischen dem Laubholz der Tropen. Amerika beherbergt die meisten. Wichtige Palmen sind:

Die Dattelpalme (*Phoenix dactylifera*), diözisch, Blüthen in Trauben zwischen den Blattstielen, Blätter gefiedert, vielsohlig; Stengel stachellos, Blättchen der Länge nach gefaltet; Frucht eine langgestreckte, cylindrische, einsamige Steinfrucht, die essbar und wohlschmeckend ist. Arabien und Nord-Afrika; der gewöhnlichste Fruchtbaum jener Gegend, und für die ärmere Klasse ein unentbehrliches Nahrungsmittel. Frucht etwas größer als eine Pflaume, frisch gelbroth, saftig. Der Baum wird über 200 Jahre alt, trägt im sechsten Jahre zuerst Früchte und ist dann wohl 12' hoch, ein alter gegen 60'.

Die Kokosnusspalme (*Coccos nucifera*), monözisch, und zwar androgynisch; sechs langgestielte Staubfäden. Frucht eine große, außer der holzigen Schale noch von einer dicken, faserigen Hülle umgebene Nuß, welche am Grunde drei Löcher hat. Kern hohl, innen voll Milchsaft. Ein hoher Baum, mit vielen (gegen 20), langen,

gefiederten Blättern und vielen Nüssen, deren jede 1' im Längsdurchmesser hat. Ueberall zwischen den Tropen angepflanzt, vorzüglich auf den Inseln der Südsee, und für die Bewohner derselben das wichtigste Nahrungsmittel.

Die *Delpalme* (*Elais guineensis*), ebenfalls monözisch, Blumen in Kolben, mit doppeltem 6-blättrigem Perigonium; männliche mit 6 verwachsenen Staubfäden, weibliche mit 3 Narben. Frucht eine saftige Steinfrucht von oben zugespitzter Form, die in ihrer Fleischhülle sehr viel fettes Del enthält. Man ist das Fleisch auf Brod gestrichen wie Butter, preßt das Del aus, und benugt es besonders zur Bereitung von Seife. Der Baum wird gegen 30' hoch, ist überall mit den kurzen, am Rande stacheligen Stielen der abgefallenen Blätter bedeckt, und trägt an der Spitze nur wenige, aber sehr lange, gefiederte, vielzählige Blätter. Guinea, von da nach West-Indien verpflanzt.

Dreihundzwanzigste Klasse. Polygamia.

§. 162. In dieser Klasse sollen, nach Linne, alle diejenigen Pflanzen stehen, welche neben männlichen oder weiblichen Blumen noch Zwitterblüthen auf demselben Stamm tragen. Er theilte sie dann nach der Anzahl der Staubgefäße, wie die früheren Klassen, in Ordnungen. Da indeß dieser Charakter vielen Abänderungen in den verschiedenen hierher gerechneten Pflanzengattungen unterliegt, so haben viele spätere Botaniker diese Klasse ganz eingezogen und die Pflanzen nach der Zahl der Staubfäden in eine der ersten dreizehn Klassen gebracht, andere dagegen haben nur wenige Pflanzen hier stehen lassen. Unter den von Linne aufgeführten einheimischen sind folgende bemerkenswerth.

Die *Ahorn*-gattung (*Acer*) enthält baumartige Pflanzen mit einfachen aber gelappten Blättern, und rispenförmig gestellten, gipfelförmigen Blumen, die aus einem fünfblattigen Kelch, einer fünfblattigen Krone, 8 Staubgefäßen, und einem einfachen, gespaltenen Griffel bestehen. Frucht ein doppeltes, großes, einseitig geflügeltes Nüßchen. Die Arten wachsen mehr in südlichen Gegenden, und werden bei uns in Anlagen angepflanzt; z. B. *A. platanoides*, mit fünfblattigen Blättern, deren Lappen ungleich tief gezähnt und unterhalb weißlich grün gefärbt sind; die jüngeren haarig. Blumen langgestielt, hängend. In Anlagen, an Wegen, ziemlich häufig. Manche Arten, wie der *Zuckerahorn* (*A. saccharinum*), enthalten einen süßen Zuckersaft, den man benugt.

Die Esche (*Fraxinus excelsior*), ebenfalls ein hoher Baum, mit einfachgefiederten Blättern, deren Blättchen lanzettförmig und gesägt sind. Blumen in Trauben, jede Blüthe bei dieser Art ohne Kelch und Krone, bei anderen Arten mit vierlappigem Kelch und vierblättriger Krone; zwei lange Staubgefäße, Fruchtknoten mit zwei Narben. Frucht eine einsamige Flügel Frucht, mit aufrechtem, gradem, am Ende schief ausgerundetem Flügel. Bei uns in Anlagen, Aleen angepflanzt, wild im südlichen Deutschland und Süd-Europa. Die Rinde enthält einen bitteren Stoff.

Die Meldengattung (*Atriplex*) enthält krautartige, allersmeist einjährige Pflanzen, mit gegenüberstehenden oder abwechselnden Blättern, und sperrigen, in den Blattachseln stehenden Zweigen. Blumen ebenfalls in den Blattachseln, die Zwitterblüthen mit fünf-lappiger Blumenhülle, 5 Staubfäden und einem Fruchtknoten mit gabeliger Narbe; die weiblichen mit zweien, schuppenförmigen, oft spießförmigen Hüllblättern. Frucht ein Nüsschen, von den fortwachsenden Hüllblättern umgeben. Sehr gemein ist *A. patulum*, mit gegenüberstehenden, dreieckig lanzettförmigen, fast spießartigen, gezähnten Blättern und weit abstehenden Zweigen. Hüllblätter auf der Fläche mit Stacheln, am Rande mit Zähnen. Eine andere Art, die Gartenmelde (*A. hortense*), mit dreieckigen, gezähnten, gleichfarbigen Blättern, und elliptischen, neßförmig geaderten Hüllblättern, wird in Gärten angebauet und als Gemüse gegessen.

Der Meldengattung ist im Aeußeren die Gattung des Gänsefußes (*Chenopodium*) sehr ähnlich, unterscheidet sich aber von ihr durch stets zwittrige Blumen, und den mit der Frucht sich nicht verändernden, fünf-lappigen Kelch. Bei Linne steht sie daher in der fünften Klasse.

Vierhundertzwanzigste Klasse. Cryptogamia.

X §. 163. Der Charakter dieser letzten Klasse des Linneischen Systemes besteht in dem Mangel aller deutlichen Blumen und der in ihnen vorhandenen Organe. Nichts desto weniger bilden alle Samen, die sich aber dadurch von den Samen der übrigen Pflanzen unterscheiden, daß sie bloß aus einem einfachen Bläschen bestehen, während bei den übrigen Eiweiß, Keim und Samenlappen sich unterscheiden lassen. Weil also diesen Pflanzen der Samenlappen fehlt, heißen sie auch *Akotoyledonen*, und ihre Samen richtiger Keimkörner (*spori*). Sie liegen selten frei in der Pflanze, meistens innerhalb größerer Säcke (*sporangia*), oder förmlicher Kapseln. Nach Linne zerfällt die Klasse in 6 Ordnungen.

1. Ordn. Farrenkräuter (Filices). Pflanzen mit deutlichen, zum Theil gegliederten, röhrigen, allermeist gesiederten oder fiederspaltigen Blättern, und Keimkörnern in Kapseln, welche haufenweis bei einander stehen, und in der Regel an der unteren Fläche des Blattes, bisweilen selbst an der Wurzel, oder an der Spitze des Stengels befestigt sind. Dahin:

Der Schachtelhalm (*Equisetum palustre*), mit grade aufrechtem, hohlem, gegliedertem Stengel und quirlförmig gestellten, dünnen, gegliederten, röhrigen, wie der Stengel gefurchten, fünfeckigen Blättern. An der Spitze eine Aehre, welche in vielen, kleinen, an gestielten Scheibchen befestigten Säcken die mit zwei kolbigen Fächchen (*Schleuderer*, *elateres*) versehenen Keimkörner enthält. Gemein in Sümpfen und Gräben, wird von Fischlern und Drechslern gesammelt und zum Poliren benutzt.

Der Bärlapp (*Lycopodium clavatum*), eine kleine Pflanze mit niedergebucktem verzweigtem Stengel und dicht gedrängten, schuppenförmigen, kleinen lanzettlichen Blättern. In den Achseln der letzten Stengelblätter sitzen nierenförmige einsächerige Kapseln, die sich mit einer Klappe öffnen und viele, sehr kleine, gelbe Keimkörner enthalten, welche in den Officinen als Streupulver unter dem Namen des *Heremehls* gebraucht werden. In Wäldern und auf Heiden, häufig.

Das gemeine Farrenkraut (*Aspidium*) hat einen kriechenden Wurzelstock und aufrechte fiederspaltige Blätter, an deren unterer Seite kleine runde mit einem Ringe umgürtete Kapseln haufenweis zerstreut stehen. Jeder Kapselhaufen (*sorus*) von einer dünnen Haut (*Schleier*, *indusium*) bedeckt. *A. filix mas* hat einen runden Schleier, 2mal gesiedertes Laub, dessen Fiederlappen länglich, aber stumpf, und am Rande mit stumpfen Zähnen versehen sind. Fruchthaufen neben der Mittelrippe, diese und der Blattstiel mit braunen, trocknen Spreublättern. — *A. filix femina* hat längliche Schleier, spitz dreifach gezähnte Fiederlappen und längliche Fruchthaufen. Beide sehr gemein in unseren Wäldern.

Das Adlerfarrenkraut (*Pteris aquilina*). Hat den Bau des Vorigen, dieselben Kapseln, aber die Fruchthaufen bilden einen schmalen, am Rande fortlaufenden Strich, mit dünnem, nach Innen offenem Schleier. Das Blatt ist doppelt gesiedert, und die Lappen sind, besonders am untern Theile, in längliche stumpfe Zähne getheilt. Der Durchschnitt des Stengels zeigt die schwarze Zeichnung eines doppelten Adlers, daher der Name. Gemein in Wäldern.

2. Fam. Laubmoose (*Musci frondosi*). Kleine Pflanzen mit dünnen, verzweigten Stengeln, woran kleine, schmale, zugespitzte, schuppenförmige Blätter. Die Keimkörner in gestielten, becherförmigen Kapseln, die theils zerstreut in den Blattachseln, theils an der

Spitze der Stengel stehen. Jede Kapsel von einem Deckel verschlossen, und allermeist am Rande mit 4, 8, 16, 32 oder 64 Zähnen, sowohl in einfacher, als auch doppelter Reihe, versehen. Die Kapsel bedeckt, so lange sie geschlossen ist, eine häutige, dünne Mütze. Man kennt sehr viele Arten, z. B.

Das Torfmoos (*Sphagnum latifolium*). Kapselmündung ohne Zahnrand, Mütze am Grunde der Kapsel festgewachsen; Blätter eiförmig, stumpf, ganzrandig; Zweige lang, zugespitzt, schlaff. In Sümpfen und Torfmooren gemein.

Das große Waldmoos (*Polytrichum commune*), Kapselmündung mit 32—64 Zähnen, die durch eine Haut zusammenhängen. Stengel aufrecht, ungetheilt, Blätter ziemlich abstehend, am Rande und auf dem Rücken gezähnt. Kapsel stumpf viereckig, mit spitzem Schnabel des Deckels. Häufig in Wäldern, das größte deutsche Moos.

3. Ordn. Lebermoose (*Musci hepatici*). Sie haben die Kennzeichen der Vorigen, aber die Kapsel besteht aus mehreren (2 oder 4) Klappen und hat keinen Deckel. Das Laub ist dünner, breiter; bisweilen die ganze Pflanze ein bloßes zerlapptes Blatt.

Die hierher gehörigen Gattungen sind unwichtig und eben nicht sehr häufig, daher wir keine namentlich anführen können.

4. Ordn. Flechten (*Lichenes*). Diese Pflanzen haben gar keinen Stengel mehr, sondern bestehen bloß aus einem flachen, am Rande gelappten und getheilten Blatt, oder aus aufrecht stehenden ästigen, überall verzweigten Blättern. Auf der Mitte jener Blätter, oder an der Spitze dieser, stehen kleine napfförmige Vertiefungen oder halbkugelförmige Körper (Schüsselchen, *scutella*), in welchen die Keimkörner in einem lockeren Zellgewebe liegen. Die Flechten wachsen theils an Baumstämmen, theils auf nackten Felsen, selten auf der Erde, und finden sich besonders in kalten Regionen, daher bei uns in Gebirgsgegenden. Manche enthalten nährhafte Stoffe für Menschen und Thiere, z. B.

Das isländische Moos (*Cetraria islandica*), eine flache blattartige Flechte von oberhalb brauner, unten weißgelber Farbe, bei welcher die Schüsselchen auf der Mitte stehen. Sie wächst besonders auf Gebirgen, z. B. dem Brocken, doch auch in der Ebene, in Kieferwäldern, und ist dann mehr aufgerichtet und zerlappt. Man wendet das isländische Moos wegen seiner nährhaften Bestandtheile gegen Brustkrankheiten mit Erfolg an.

Das Rennthiermoos (*Coenomyces rangiferina*) ist eine aufrechte, vielfach getheilte, büschelförmige Flechte, mit halbkugeligen, gefärbten Schüsselchen am Ende. Die Flechte selbst hat eine weißlich graue Farbe und braune Schüsselchen; sie findet sich überall auf Heiden und in Kieferwaldungen an der Erde. Die Rennthiere nähren sich besonders von dieser und verwandten Arten.

5. Fam. Algen (Algae). Blatt- oder röhrenförmige, verzweigte oder einfache Wassergewächse von grüner, brauner oder rother Farbe, welche ihre Keimkörner theils in den Zellen der Blätter oder Röhren, theils in besondern, blasenförmigen Kapseln tragen.

Die Gattung der Lauge (*Fucus*) findet sich nur im Meere, hat einen verzweigten, mit lederartigen Blättern besetzten Stengel und blasenförmige Kapseln, die zum Theil unmittelbar am Rande der Blätter sitzen; so z. B. beim Blasen-Lang (*F. vesiculosus*), welcher an den norddeutschen Küsten häufig vorkommt, und aus langen, ziemlich breiten, lanzettförmigen, bräunlichen Blättern besteht. Andere Arten enthalten viel Schleim und sind essbar.

Die Bachconferve (*Conserva rivularis*) besteht aus einfachen, dünnen, geraden, sehr langen Fäden, die gegliedert sind. Jedes Glied dreimal so lang wie breit, inwendig Keimkörner enthaltend. Farbe dunkelgrün. Flokkenweis in klaren Bächen, an Steinen befestigt.

6. Fam. Pilze (Mycetes). Dicke, fleischige, zellige, oder dünne, fadenförmige, niemals grün, wohl aber schwarz, blau, roth, gelb oder braun gefärbte Körper, deren Keimkörner theils frei, theils in besonderen Schläuchen eingeschlossen, durch die ganze Masse oder auf der Oberfläche in einer besonderen Schicht (*hymenium*) abgelagert sind. Sie entstehen bei der Zersetzung thierischer oder pflanzlicher Materien in großer Menge an feuchten, dunkeln und schattigen Orten, besonders im Frühjahr und Herbst, auf und aus den abgefallenen Blättern, auf dem Mist u. dgl. Im Wasser selbst bilden sie sich nicht, nur an Körpern, die mit der Luft in Berührung stehen. Manche Pilze sind essbar, andere dagegen sind giftig und höchst gefährlich.

Einige, wie die Schwämme (*Fungi*), haben einen Stiel und eine obere, schirmförmige Ausbreitung, die man Hut nennt; Keimkörner an der unteren Seite des Huts. Dahin der Fliegen-schwamm (*Agaricus muscarius*), gelbweiß, mit purpurrother Oberfläche des Huts; die untere in strahlige Falten gelegt. Häufig in Kieferwäldern, sehr giftig. Der Champignon (*A. campestris*) ist überall weiß, nur die strahligen Falten an der Unterseite des Huts sind violettbraun. Auf Viehweiden; essbar.

Der Feuerschwamm (*Boletus foetentarius*) hat keinen Stiel, sondern der Hut sitzt mit dem breitgedrückten Rande an alten Baumstämmen, besonders an Apfelbäumen fest. Unterseite des Huts fein durchlöchert; Farbe gelbbraun. Wird zur Vereitung des Feuerschwammes benutzt.

Andere bestehen aus kugelförmigen Massen, in deren innerem Gewebe die Keimkörner liegen; Bauchpilze (*Gastromycetes*). Z. B. der Pövis (*Lycoperdon bovista*), von der Größe eines Hühner-

eies und drücker, mit zugespitzter Wurzelseite; Farbe milchweiß. Auf Biehweiden, plaszt reif oben in der Mitte auf und läßt die vielen, braunen Keimkörner wie Staub herausprühen. — Auch die eßbare Trüffel (*Tuber obtextum*) hat diese Form und ähnlichen Bau. Sie findet sich tief in der Erde, an alten Baumwurzeln.

Wieder andere Pilze bestehen aus einfachen oder verzweigten, gegliederten Fäden und tragen oft größere Blasen an der Spitze, in welchen die Keimkörner stecken; Fadenpilze (*Hyphomycetes*), z. B. der Schimmel (*Mucor*) auf eingemachten Sachen.

Noch andere endlich bestehen aus einem bloßen Pulver vieler unendlich kleiner Keimkörner, welches sich unter der Oberhaut lebender Pflanzen, die aber dadurch, wenigstens an dieser Stelle, getödet werden, bildet; Staupilze (*Coniomycetes*). Dieser Art ist z. B. der schwarze Brand (*Uredo*) in unseren Getreidearten.

Uebersicht

der erwähnten Gewächse nach dem natürlichen System.

I. Dicotyledoneae.

Gewächse, deren Stengel aus Rinde, Jahresring und Mark besteht, deren Blätter artikulirt sind und neßförmige Rippen haben. Ihre Blumen zeigen einen Kelch und meistens auch eine Krone; die Samen einen deutlichen Keim, mit zwei oder mehr Samenlappen. In den Organen herrscht die Zahl fünf oder vier.

Erste Klasse. Polypetalae.

Die Blumenkrone ist stets vorhanden und besteht aus mehreren Blumenblättern.

1. Ordnung. *Thalamopetalae*. Die Kronenblätter sitzen am Fruchtboden und ebenda die Staubgefäße.

Fam. *Ranunculaceae*. Kelch 4—5blättrig, hinfällig; 4—5 bisweilen in Rektarien verwandelte Kronenblätter; viele Staubgefäße, mehrere oder viele Stempel; Früchte theils Balgkapseln, theils Achenien.

Gatt. *Delphinium* 140, *Aquilegia* 141, *Helleborus*, *Caltha* 141, *Ranunculus* 141, *Adonis*, *Clematis*, *Thalictrum*, *Anemone*.

Fam. *Nymphaeaceae*. Kelch 3—5blättrig, Krone vielblättrig, ohne Rektarien; viele Staubgefäße mit blattförmigen Fäden.

Frucht eine mehrfächerige Kapsel. Wassergewächse mit schwimmenden Blättern, deren Rippen nicht neßförmig sind.

Gatt. Nymphaea 140, Nenuphar.

Fam. Papaveraceae. Kelch 2blättrig, hinfällig; Krone 4blättrig, regelmäsig; viele Staubgefäße, ein Fruchtknoten; Frucht eine längliche oder runde Kapsel, deren eingebogene Röhre die Plazenten bilden.

Gatt. Papaver 140, Chelidonium, Stacium.

fam. Fumariaceae. Kelch 2blättrig, hinfällig; Krone 4blättrig, unregelmäsig; Frucht der Vorigen, oft 1- bis 2samig; 6 monadelphische Staubgefäße.

Gatt. Fumaria 145, Corydalis.

Inf. Cruciferae (Tetradynamia), S. Seite 143.

Fam. Sterculiaceae. Allermeist Bäume; Kelch und Krone 5blättrig, die Blätter am Grunde verwachsen, ebenso mit den Staubgefäßen; diese monadelphisch, einige ohne, die anderen mit 2fächeriger Anthera; Frucht eine mehrfächerige, viel-samige Kapsel.

Gatt. Theobroma 147.

145 Fam. Malvaceae. Kräuter oder Stauden; Kelch doppelt, der innere, wie die Krone, 5blättrig, die Blätter unter sich und mit den Staubgefäßen verwachsen; diese sehr zahlreich, mit 1fächeriger Anthera; Frucht eine 3-5fächerige, viel-samige Kapsel, oder viele Achenien.

145 Gatt. Malva, Lavatera, Althaea 145, Gossypium 145, Sida.

121.9. Fam. Aurantiaceae. Bäume mit lederartigen, drüsigen Blättern; kleinem 5zähni-gem Kelch, 4-5 Kronenblättern und polyadelphischen Staubgefäßen; Frucht eine Orange. (S. 121, Nr. 9.)

Gatt. Citrus 147, Limonia.

Fam. Hypericeae. Stauden oder Sträucher mit gegenüberstehenden, drüsigen, weichen Blättern; Kelch und Krone 5blättrig, viele polyadelphische Staubgefäße; Frucht eine 3-5fächerige, viel-samige Kapsel.

Gatt. Hypericum 148.

Inf. Hippocastaneae. Bäume mit gegenüberstehenden, gefingerten Blättern; Kelch und Krone 5blättrig, unregelmäsig; 7-8 freie Staubgefäße; Fruchtknoten 3fächerig, mit je 2 Eichen.

Gatt. Aesculus 134.

Aceraceae. Bäume mit gegenüberstehenden, gelappten Blättern; Kelch und Krone 4-, 5-, oder 9blättrig, regelmäsig; 8, selten 5-12, freie Staubgefäße; Frucht aus 2 verwachsenen, geflügelten Achenien gebildet.

Gatt. Acer 158.

Lineae. Kräuter mit einfachen Blättern; Kelch und Krone 5blättrig, 5-10 Staubgefäße; Frucht eine 5-10fächerige, je 1samige Kapsel.

Gatt. Linum 132, Radiola.

Geranieae. Kräuter oder Stauden mit gelappten Blättern; Kelch und Krone 5blättrig, 10 Staubgefäße, bisweilen 3-5 ohne Antheren; 5 geschwänzte, an der verlängerten Achse aufhängende Achenien.

Reseda Gatt. *Erodium* 144, *Geranium* 144, *Pelargonium*.
 Fam. *Resedaceae*. Kräuter oder Stauden mit fiederspaltigen
 Blättern; Kelch und Krone unregelmäßig, viele Staubgefäße; Frucht
 eine offene Kapsel mit 3 peripherischen Plazenten.

Gatt. *Reseda* 138.

Fam. *Droseraceae*. Kräuter mit einfachen, oft haarigen Blättern; Kelch und Krone regelmäßig, 5-blättrig; 5—10 Staubgefäße; Frucht eine Kapsel mit 3—4 peripherischen Plazenten.

Gatt. *Parnassia* 152, *Drosera*, *Dionaea*.

Jonideae Fam. *Jonideae*. Kräuter; Kelch und Krone 5-blättrig, unregelmäßig; 5 Staubgefäße; Frucht eine 3-flappige Kapsel mit Plazenten an den Klappen oder im Grunde.

Gatt. *Viola* (Veilchen).

Fam. *Caryophyllaceae*. Kräuter oder Stauden mit gegenüberstehenden, einfachen Blättern; Kelch oder Krone 5-zählig; 10 Staubgefäße; Frucht eine 1—3-fächerige Kapsel mit zentraler Plazenta.

a. Kelch 5-blättrig.

Gatt. *Stellaria* 136, *Arenaria*, *Spergula*, *Cerastium*.

b. Kelch röhrig, 5-zählig.

Gatt. *Silene*, *Lychnis* 137, *Saponaria*, *Dianthus* 136.

2. Ordnung. *Calycopetalae*. Die Kronenblätter und Staubgefäße sitzen am Kelch.

Fam. *Sedaceae*. Kräuter mit dicken, fleischigen Blättern; 5 oder mehr Kelch- und Kronenblätter; 10, 12 oder mehr Staubgefäße; 5, 10—12 oder mehr Balgkapseln.

Sedum Gatt. *Sedum* 137, *Sempervivum*.

Verwandte Familien sind die *Cactaceae*, *Grossulariaceae*, *Philadelphaceae*, *Saxifragaceae*.

Portulacaceae Fam. *Portulacaceae*. Kleine saftige Kräuter; Kelch 3—5-lappig; Krone 3—5-blättrig, bisweilen fehlend; 3, 5, 10 Staubgefäße; Frucht eine mehrsamige Kapsel.

Gatt. *Montia* 128, *Portulaca*.

Fam. *Rosaceae*. Pflanzen aller Formen; Kelch verschieden, 5—10-lappig; Krone 4—5-blättrig. Viele Staubgefäße; Früchte drupae, achenia, baccae, poma (S. 121) Blätter abwechselnd mit Ohrblättchen.

A. Viele einzelne Früchte aus einer Blume.

a. Früchte einsamig; Achenien oder Beeren.

α. Kelch doppelt, 8—10-lappig.

Gatt. *Tormentilla*, *Potentilla*, *Geum*, *Fragaria* 139.

β. Kelch einfach, 5-lappig.

Gatt. *Rubus* 139, *Rosa* 139, *Agrimonia* 137.

b. Früchte mehrsamig, Balgkapseln.

Gatt. *Spiraea*.

B. Eine einzige, 1—mehrfächerige Frucht.

Gatt. *Pyrus* 139, *Prunus* 138, *Amygdalus* 139.

Myrtaceae Fam. Myrtaceae. Baumartige Pflanzen mit einfachen oft lederartigen Blättern; Kelch und Krone 5-zählig; zahlreiche polyadelphische oder freie Staubgefäße; Frucht eine mehrfächerige Kapsel oder Beere.

Gatt. Myrtus, Caryophyllus, Punica, Melaleuca, Metrosideros.
Fam. Onagrariae. Kräuter; Kelch und Krone 4-blättrig; 2, 4 oder 8 Staubgefäße, 1 Griffel mit 4 Narben; Frucht eine 4-fächerige vielstämige Kapsel.

Gatt. Oenothera 134, Epilobium, Circaea.

Fam. Salicariae. Kräuter mit gegenüberstehenden Blättern; Kelch einblättrig, röhrig, trägt die Kronenblätter (4—6) und darunter die (4—10) Staubgefäße; Frucht eine meist 2-fächerige Kapsel mit zentraler Plazenta.

Gatt. Lythrum 137, Peplis.

Fam. Leguminosae. Seite 146.
Verwandte Familien sind die Terebinthaceae, Rhamnaceae, Hederaceae, ~~Cornaceae~~.

Fam. Umbelliferae. Seite 151.
Fam. Haloragaceae. Wassergewächse mit lintenförmigen oder fein zerschlossenen Blättern; Blüthen ungestielt, in den Blattachseln; Kelch und Krone 4-blättrig, letztere bisweilen fehlend; 1—4 Staubgefäße; Frucht ein Achenium.

Gatt. Hippuris 125, Ceratophyllum, Myriophyllum, Trapa.

Zweite Klasse. Monopetalae.

Die röhrige, oder trichter- und glockenförmige Blumenkrone besteht nur aus einem Blatt; und ist am Rande in Lappen getheilt.

3. Ordnung. Calycanthae. Die Blumenkrone sitzt am Kelch, dieser ist mehr oder weniger mit dem Fruchtknoten verwachsen.

Hierher die nicht erwähnten Familien Cucurbitaceae, Campanulaceae, Lobeliaceae u. a.

Fam. Compositae. Blumen dicht gedrängt auf gemeinsamem Fruchtboden; 5 Staubgefäße, deren Antheren mit einander verwachsen sind; Frucht eine Karyopsis. — Syngenesia. S. Seite 143.

Fam. Dipsacae. Blumen dicht gedrängt auf gemeinsamem Fruchtboden; 4 freie Staubgefäße; Frucht eine Karyopsis.

Gatt. Dipsacus 128, Scabiosa, Asterocephalus.

Verwandte Familien sind die Globularineae und Valerianeae.

Fam. Caprifoliaceae. Kräuter oder Sträucher mit gegenüberstehenden Blättern ohne Ohrblättchen; Krone 5-lappig, regelmäßig und 5 Staubgefäße, oder röhrenförmig und 4 didynamische Staubgefäße; Frucht nicht aufspringend, eine Beere oder Kapsel mit wenigen Samen.

Gatt. Linnaea, Sambucus 152, Viburnum, Caprifolium, Lonicera.

Fam. Cinchonaeae. Bäume mit gegenüberstehenden Blättern,

5. Ordnung. Monoclineae. Staubgefäße und Stempel in derselben Blume.

Nicht erwähnte, hierher gehörige Familien sind die Laurineae, Thymeleae, Santaleae, Eleagneae.

Fam. Asarineae. Kräuter mit abwechselnden Blättern; Kelch röhrig, gefärbt, lappig; 6—10 Staubgefäße; Frucht 3—6-fächerig, je vielstamig, mit zentraler Plazenta.

Gatt. Aristolochia 152, Asarum.

Fam. Polygoneae. Kräuter mit Blattscheiden am Grunde der Blätter; Kelch kronenartig, 4—5-lappig; 6—10 Staubgefäße; Frucht ein Achenium.

Gatt. Polygonum 155, Rheum, Rumex. Fam. Chenopodieae. Kräuter; Kelch ungefarbt, 1—5 Staubgefäße; Frucht ein vom stehengebliebenen, bisweilen fleischigem Kelche umhülltes Achenium. Blätter abwechselnd, ohne Ohrblättchen.

Gatt. Chenopodium 159, Atriplex 159, Spinacia, Beta, Salsola, Salicornia.

Verwandte Familien sind die Scleranthaeae, Paronychieae, Amarantaceae.

6. Ordnung. Dielineae. Staubgefäße und Stempel in verschiedenen Blüten.

Fam. Euphorbiaceae. Kelch mehrlappig, Staubgefäße in unbestimmter Zahl, 2—3 verwachsene Stempel; Früchte 2—3-fächerig, je 1—2-samig, elastisch aufspringend.

Gatt. Euphorbia 138, Mercurialis, Ricinus, Phyllanthus, Buxus.

Fam. Urticeae. S. 152. Dahin noch Cannabis und Humulus 155, so wie die nicht erwähnten Gattungen Parietaria, Ficus, Antiaris, Artocarpus u. a.

Fam. Salicineae. S. 156.

Fam. Amentaceae. S. 153.

Fam. Coniferae. S. 154.

Dahin noch die diözischen Gatt. Taxus, Juniperus 156.

II. Monocotyledoneae.

Pflanzen, deren Stengel keinen Unterschied zwischen Rinde, Holzring und Mark zeigt, deren Blätter nicht artikulirt sind, und gewöhnlich einfache strahlige, oder parallele streifige Rippen haben; den Blumen fehlt die Krone und der Same hat nur einen Samenanlagen. In ihren Organen herrscht das Zahlengesetz drei.

Vierte Klasse. Perigonatae.

Die 6 Kelchblätter stehen in 2 Kreisen, und sind theils alle, theils nur die des innern Kreises kronenartig gefärbt.

7. Ordnung. Coronariae. Alle 6 Perigonblätter sind gefärbt.

A. Gynandrae. Von den 3—6 Staubgefäßen sind 1—2 verkümmert; Fruchtknoten unterständig.

Hierher die Familien Musaceae, Scitamineae.

Fam. Orchideae. S. 151. *Phalaenopsis*

B. Epigynae. Die 3—6 Staubgefäße sind alle fruchtbar; Fruchtknoten unterständig.

Fam. Irideae. 3 Staubgefäße, 1 Griffel mit 3-lappiger Narbe; Blume in 2-blättriger Spatha.

Gatt. Iris 126, Gladiolus, Crocus. *Parasitica*

Fam. Amaryllideae. 6 Staubgefäße, Griffel mit 3-knotiger Narbe; Blume in 1-blättriger Spatha.

Gatt. Galanthus, Leucoium, Narcissus, Amaryllis.

C. Hypogynae. Die 4—6 Staubgefäße sind alle fruchtbar und sitzen an den Perigonblättern; Fruchtknoten oberständig.

Fam. Liliaceae. Frucht eine 3-lappige, viel-samige Kapsel; Samen mit weicher, schwammiger Testa; keine Spatha; Zwiebelgewächse.

Gatt. Fritillaria, Lilium 133, Tulipa 133. *Calliophora*

Fam. Asphodeleae. Frucht eine rundliche Kapsel oder Beere, 3-fächerig; die Samen klein mit harter, schwarzer Testa.

a. Zwiebelgewächse ohne Stamm.

Gatt. Allium 133, Ornithogalum. Hyacinthus 133. *Ornithogalum*

b. Keine Zwiebel, aber ein Stamm.

Gatt. Aloë, Asparagus 133. *Asparagus*

Fam. Smilacaceae. Perigon glockenförmig, nicht tief getheilt, bisweilen nur 4-lappig; Frucht eine 3-fächerige Beere mit wenigen Samen, deren Testa weiß, weich und häutig ist.

Gatt. Majanthemum, Convallaria, Polygonatum, Ruscus, Smilax.

Fam. Melanthiaceae. Frucht besteht aus 3 mit der Naht aneinander gewachsenen Balgkapseln; Samen zahlreich, mit häutiger Testa.

Gatt. Colchicum 134, Veratrum. *Colchicum*

Fam. Juncagineae (Gatt. Scheuchzeria, Triglochin).

8. Ordnung. Tripetaloideae. Nur die drei oder 4 Perigonblätter des innern Kreises sind gefärbt, auch größer und mehr kronenartig; die des äußern Kreises bleiben grün.

A. Catogyneae. Fruchtknoten unterständig.

Fam. Bromeliaceae, Hydrocharideae.

B. Hypselogyneae. Fruchtknoten oberständig.

Fam. Parideae. Perigon 6—8-blättrig; Frucht eine 3—4 fächerige Beere; Samen mit schwarzer Testa.

Gatt. Paris 135.

Fam. Butomeae. Perigon 6-blättrig, 9 oder mehr Staubgefäße; 3, 6 oder mehr Stempel; Früchte Balgkapseln.

Gatt. Butomus. S. 135.

Fünfte Klasse. Bracteatae.

Das Perigonum ist grün oder wenigstens nicht schön gefärbt; es besteht oft noch aus 6, häufig nur aus 3, 2 oder 1 Blatt, oder fehlt ganz, und die Braktea vertritt seine Stelle. Fruchtknoten oberständig.

9. Ordnung. Spadicineae. Blütenstand ein einfacher oder verzweigter Kolben.

Palmen Fam. Palmae. S. 157. *Palmen u. A. arifolia*
Laurel Fam. Aroideae, Typhoideae, Potamophilae.
 Fam. Lemnaceae. S. 126. *Pimperutia*

10. Ordnung. Glumaceae. Blütenstand eine Aehre oder Rispe.

A. Mit mehrsamigen Früchten. Pleospermae.

Fam. Junceae, Restiaceae.

B. Mit einsamigen Früchten. Monospermae.

Fam. Cyperaceae.

Fam. Gramineae. S. 125. *Reis*

Dahin auch Oryza S. 133.

III. Acotyledoneae.

Pflanzen von verschiedener äußerer Form, zum Theil ohne Stamin, zum Theil ohne Blätter, stets ohne Blumen. Die Samen haben keinen Keim, also auch keine Samenlappen, sondern bestehen bloß aus einem Bläschen.

Sechste Klasse. Cryptogamicae
(Siehe Seite 159)

Artemisia 11. Ordnung. Filices. S. 160.

12. Ordnung. Musci.

Fam. Musci frondosi S. 160. *Lebermoos*

Fam. Musci hepatici S. 161. *Lebermoos*

13. Ordnung. Lichenes. S. 161.

14. Ordnung. Algae. S. 162.

15. Ordnung. Mycetes. S. 162. *Pilze*

Dritter Abschnitt.

M i n e r a l o g i e.

§ 164. Die Mineralogie ist die Naturgeschichte der anorganischen (§ 2) Naturkörper oder Mineralien. Sie zerfällt in zwei Abschnitte, insofern sich die Mineralien theils nach ihren Uebereinstimmungen und Verschiedenheiten im systematischen Verbande, theils nach ihrem räumlichen Verhältniß und ihrer Ausbreitung in der Erdrinde betrachten lassen. Der erste Abschnitt heißt Dryktognosie, der zweite Geognosie. Wie werden uns hier bloß mit dem ersten beschäftigen.

D r y k t o g n o s i e.

§ 165. Da die anorganischen Naturkörper keiner besonderen Werkzeuge, behufs ihres Entstehens und Bestehens, bedürfen, sondern so, wie wir sie noch jetzt in der Natur wahrnehmen, aus der Hand des Schöpfers hervorgingen, so können in einer vorläufigen Schilderung nur die Haupteigenschaften mit ihren Verschiedenheiten betrachtet werden.

§ 166. Die Haupteigenschaften der anorganischen Naturkörper, oder Mineralien, sind dieselben aller natürlichen Körper, und beziehen sich auf:

a) Die Gestalt derselben, oder die äußeren Umrisse, unter welchen sie in der Natur erscheinen.

b) Die Zusammensetzung, oder das Gefüge ihres Inneren, das sich oft schon an der äußeren Oberfläche, immer aber auf der Bruchfläche, verräth.

c) Die Härte oder den Grad des Zusammenhanges, welchen die Masse des Minerals besitzt.

d) Die Schwere, oder die Kraft, mit welcher es auf seine Unterlage drückt.

e) Die Farbe, mit welcher die Grade der Durchdringlichkeit des Lichtes, oder der Durchsichtigkeit, im genauen Zusammenhange stehen.

f) Die Kräfte, welche die Mineralien noch sonst besitzen, z. B. magnetische oder elektrische. Diese Eigenschaften heißen physikalische.

g) Die Bestandtheile, aus welchen die Mineralien zusammengesetzt sind. Diese untersucht die Chemie oder Scheidekunst, daher man solche Eigenschaften auch mit dem Namen der chemischen belegt.

§ 167. Alle die genannten Haupteigenschaften der Mineralien mit ihren verschiedenen Abstufungen im Zusammenhange betrachtet, geben die Kennzeichenlehre, oder allgemeine Mineralogie, mit welcher wir beginnen.

I. Kennzeichenlehre.

A. Von der Gestalt.

§ 168. Die Gestalt der Mineralien ist theils bestimmt, theils unbestimmt.

Die bestimmte Gestalt, d. h. diejenige, welche bei allen Individuen eines Minerals sich gleich bleibt, heißt auch die krystallinische. Krystallinische Körper, oder Krystalle, sind alle symmetrisch von Flächen, welche in Kanten und Ecken zusammentreffen, begränzte Körper; und jeder Krystall eines Minerals ist ein eben so wahres Individuum, wie die einzelnen Pflanzen und Thiere, aus welchen die Arten in der Botanik und Zoologie bestehen.

§ 169. Die Lehre von den Krystallen, oder die Krystallographie, ist der wichtigste Theil der systematischen Mineralogie, weil wir ohne Kenntniß derselben die Mineralien nicht unterscheiden können, daher hier einige allgemeine Eigenschaften der Krystalle anzuführen sind.

Jeder Krystall wird von Flächen, allermeist ebenen, mitunter gewölbten, begränzt. Wo diese Flächen aneinander stoßen, entstehen die Kanten, und wo Kanten zusammentreffen, bilden sich Ecken. Eine gerade Linie, welche zwei gegenüberstehende Ecken, Kanten oder Flächen verbindet, heißt Achse.

Nach der Anzahl und verhältnißmäßigen Größe der in den 3 Haupt=Dimensionen der Länge, Breite und Höhe liegenden Achsen lassen sich alle Krystalle unter vier Gruppen oder Systeme bringen.

1. Das tesserale System hat drei gleiche Achsen, daher auch gleichachsige genannt, welche sich rechtwinkelig durchschneiden.

2. Das pyramidale System hat ebenfalls drei sich rechtwinkelig schneidende Achsen, von welchen zwei gleich, die dritte größer oder kleiner ist; es wird auch das viergliedrige System genannt.

3. Das prismatische System; die drei sich rechtwinkelig schneidenden Achsen haben alle verschiedene Länge, daher das ein- und einachsige oder ungleichachsige System.

4. Das rhomboedrische System hat vier Achsen, drei gleiche liegen in einer Ebene und scheiden sich unter Winkeln von 60° , die vierte größere oder kleinere steht senkrecht auf dem Durchschnittspunkte; heißt auch das drei- und einachsige System.

Von den Achsen heißt die ungleiche Hauptachse, und die Figur, welche entsteht, wenn man einen Schnitt in der Ebene der anderen Achsen durch den Krystall legt, heißt Grundfläche oder horizontale Projektion.

Denkt man sich die Endpunkte der Achsen eines Systemes durch Linien verbunden, und die dadurch umschriebenen Räume mit Ebenen ausgefüllt, so entsteht der Grundkrystall, aus welchem sich alle anderen ableiten lassen; und zwar theils durch Abstumpfung, d. h. wenn an die Stelle einer Kante oder Ecke eine Fläche tritt; theils durch Zuschärfung, d. h. wenn eine Kante oder Ecke durch zwei Flächen weggeschnitten erscheint; theils durch Zuspitzung, wenn dasselbe durch drei oder mehrere Flächen bei der Ecke geschieht; theils endlich, wenn einzelne Flächen verschwinden, andere dafür wachsen. Trifft dieß die halbe Anzahl, so heißt der neue Krystall ein halbirter oder hemiedrischer, der ursprüngliche im Gegensatz homöedrisch.

Die Krystalle werden nach der Anzahl der Flächen benannt. Die kleinste Anzahl ist vier, ein solcher Krystall heißt Tetraeder; dann mit sechs Flächen, Hexaeder; acht Flächen, Oktaeder; zwölf Flächen, Dodekaeder; zwanzig Flächen, Icosaeder; vierundzwanzig Flächen, Icositetraeder; achtundvierzig Flächen, Tetrakontaoktaeder. Oft haben verschiedene Krystalle gleiche Flächenzahl, dann unterscheidet man sie nach der Form der Flächen. So giebt es Triangulardodekaeder, d. h. Zwölfflächner, deren Flächen Dreiecke sind; Rhomboïdaldodekaeder, dieselben mit verschoben vierseitigen (rhombischen) Flächen; Pentagonal-dodekaeder, dieselben mit fünfeckigen Flächen; Trapezoeder, wenn die Flächen viereckig aber unregelmäßig sind. Polyeder heißt jeder Krystall mit drei gleichen Achsen. Pyramide heißt ein von Dreiecken begränkter Krystall, bei welchem sich alle gleichen Spitzen in den Endpunkten der Hauptachse treffen; Prisma oder Säule ist jeder Krystall, dessen Kanten der Hauptachse parallel laufen; Tafel heißt er, wenn die Hauptachse sehr kurz und am Ende durch eine breite Fläche abgestumpft ist.

In der Regel sind die Krystalle nicht vollständig ausgebildet, besonders die Pyramiden und Säulen; diese kommen meistens in Verbindung vor, so daß eine Pyramide am Ende der Säule entsteht, während der Krystall mit dem anderen Ende der Säule feststeht. Haufen so feststehender Krystalle nennt man eine Druse.

§ 170. Zur unbestimmten Gestalt rechnet man alle nicht krystallinischen Formen; dergleichen sind die folgenden. Derb heißt jedes Mineral, das in großen, ganz unregelmäßigen, ja willkürlichen, eckigen, oft zufällig entstandenen Stücken vorkommt, z. B. ein Feldstein; sind die Stücke abgerieben an der Oberfläche, so nennt man sie Geschiebe (Gerölle). Eingesprengt, ein Mineral, das als kleinere Stücke oder Körner, die in anderen Fossilien liegen, vorkommt. Körnig, wenn diese Stücke frei sind, nicht in einem Bindemittel liegen, und scharfe Ecken haben. Kugelig oder sphärisch, wenn die Form kugelrund ist. Nierenförmig, wenn

daß Mineral eine längliche, gebogene, überall abgerundete und flache Form hat. Knollig, wenn unregelmäßig rundlich und mit Erhabenheiten auf der Oberfläche. Tropfsteinförmig oder stalaktisch, wenn das Mineral wie durch Auf- oder Abtröpfeln entstanden zu sein scheint. Baumsförmig oder dendritisch, wenn es sich wie ein Zweig mit kleinen Blättern, z. B. wie ein Moos, verbreitet. Gestrickt, wenn feine nadelartige Körper ein regelmäßiges Maschenwerk bilden. Angeflogen, wenn das Mineral als ein dünner Ueberzug erscheint. Porös, wenn es von Löchern und Gängen durchbohrt ist. Bläsigt, wenn es blasenförmige Aufreibungen bildet, oder runde, hohle Räume zerstreut in seinem Inneren hat. Abgedrückt, wenn die Form dadurch entstanden ist, daß das flüssige Mineral in Gruben und anderen Vertiefungen erkaltete. Gesahd dies zwischen Kry stallbrusen, so entstehen oft den Kry stallen ähnliche Körper, die man Asterkry stalle zu nennen pflegt.

B. Von der Zusammensetzung.

§ 171. Die Zusammensetzung, oder den Bau des Inneren der Mineralien, erkennen wir, wenn wir dieselben zerschlagen und die Beschaffenheit der Bruchflächen betrachten. Bei den kry stallinischen Mineralien bemerkt man bei dieser Untersuchung, daß ihre Masse überall nach unveränderlichen gradflächig parallelen Theilungsebenen zersprengbar ist, welche Durchgänge oder blättriger Bruch heißen. Die Anzahl derselben ist verschieden; sind ihrer mehrere, so neigen sie sich unter konstanten Winkeln gegeneinander, so daß, wenn man das Mineral nach den Parallellflächen derselben trennt, man stets dieselbe Grundgestalt, den Kern, erhält. Uebrigens sind die Durchgänge oft von verschiedenem Werth, insofern sich das Mineral nach dem einen dann leichter theilen läßt, als nach den anderen. Derjenige, in welchem die Trennung am leichtesten ist, heißt Hauptdurchgang, und geht meistens senkrecht gegen die Hauptachse.

Bei den unkry stallinischen, ja auch zum Theil bei kry stallinischen, Mineralien giebt es verschiedene Bildungen der Thei-

Lungs- oder Bruchflächen. So ist der Bruch eben, wenn die Bruchfläche keine großen Erhöhungen und Vertiefungen hat; uneben, wenn regelmäßige Erhöhungen und Vertiefungen da sind; muscheligen, wenn der ebene Bruch muschelige Vertiefungen und Erhabenheiten zeigt; splitterig, wenn sich die Bruchfläche als aus vielen feinen keilförmigen Theilchen zusammengesetzt zeigt; hakig, mit noch kleineren von der Bruchfläche losgerissenen Theilen, die eine umgebogene Spitze haben.

Bei vielen Mineralien bemerkt man außer den genannten Arten der Zusammensetzung noch eine dritte, welche man mit dem Namen der Absonderung bezeichnet, und darunter eine ursprüngliche schon vorhandene Trennung in bestimmt geformte Stücke versteht. Nichts desto weniger hängen diese Stücke genau zusammen und lassen sich nur gewaltsam trennen. Die Absonderung ist nun theils krystallinisch, wenn die zusammengefügt Partikelchen kleine Krystalle sind; theils unkrystallinisch, wo dies nicht der Fall ist.

Die krystallinische Absonderung kann sein: körnig, wenn die Absonderungsstücke ziemlich gleiche Dimensionen haben, also mehr oder weniger kugelförmig oder polyedrisch sind; schaalig, wenn die Absonderungsstücke in den Dimensionen der Länge und Breite bedeutend, der Dicke aber unbedeutend, also platten- oder tafelförmig, sind; stängelig, wenn die Absonderungsstücke die Dimensionen der Länge vorwaltend entwickelt zeigen, also prismatisch, theils mit, theils ohne Pyramidenflächen am Ende, gebildet sind. Gehen diese Prismen wie von einem Mittelpunkte aus, so nennt man die Absonderung strahlig (Strahlkies); im Uebrigen laufen die kleinen Krystalle parallel oder bunt durch einander (Arsenikkies).

Die unkrystallinische Absonderung zeigt dieselben drei Hauptformen, doch immer mit dem wesentlichen Unterschiede des Mangels wahrer Krystallisation an den einzelnen Theilen. Bei der körnigen sind die einzelnen Partikelchen kugelig, linsenförmig, dattelförmig, eckig oder erdig, wenn die Partikelchen sehr klein, staubig, sind, und sich leicht ablösen; bei der schaaligen, oder schieferigen, sind es flache, oft

etwas gebogene, meistens scharfkantige Platten; bei der stängeligen sind sie bald grade, kantig und ahmen (z. B. beim Basalt) Krystalle ganz genau nach, bald rundlich und dabei theils frumm, theils grade.

C. Von der Härte.

§. 172. Die Eigenschaften der Mineralien, welche sich auf die Cohäsion beziehen, pflegt man gemeinlich mit dem Ausdruck der Härte-Eigenschaften zu belegen. Werner unterschied fünf Arten: hart, was am Stahle Funken giebt; halbhart, was vom Messer Eindrücke annimmt; weich, was mit dem Messer leicht getheilt wird; sehr weich, was dem Druck des Fingernagels nachgiebt; und zerreiblich, was bei dem bloßen Wischen mit dem Finger sich abreibt. In neuerer Zeit hat Mohs eine genauere Skala der Härtegrade aufgestellt, welche auf dem Grundsatz beruhet, daß der härtere Körper den weicheren zu rizen vermag. Jedes folgende Glied dieser Skala hat die Fähigkeit, das vorhergehende zu rizen, und alle Mineralien, die von demselben Körper geritzt werden, haben mit dem vorhergehenden gleiche Härte, wenn er selbst sie nicht rizen kann; ist dies der Fall, so sind sie weicher. Die Skala ist folgende: 1) Talk, 2) Gyps, 3) Kalkspath, 4) Flußspath, 5) Apatit, 6) Feldspath, 7) Quarz, 8) Topas, 9) Saphir, 10) Diamant. Der Diamant, welchen kein anderer Körper, als nur sein eigenes Pulver, angreift, ist der härteste von allen. Der Kürze wegen bezeichnet man die Härtegrade nach den den Körpern vorstehenden Zahlen.

Außer diesen Graden bezeichnen noch andere Eigenschaften die Cohäsionsgrade. Wir nennen als solche die folgenden: Spröde heißt ein Mineral, das keine Biegung verträgt, sondern beim Druck zerspringt; milde heißt jedes Mineral, das sich mit dem Messer schneiden läßt; geschmeidig ist jedes Mineral, das sich biegen und drehen läßt, ohne zu zerbrechen; dehnbar, ein Mineral, das sich in dünne Dräthe ziehen und in feine Platten schlagen läßt; zähe, wenn die Dehnbarkeit sehr groß ist; biegsam heißt ein Mineral, was sich

biegen läßt und in der erhaltenen Form verbleibt; elastisch dagegen, wenn es nach der Biegung die alte Form wieder annimmt.

Viele Mineralien lassen sich durch bald härtere bald weichere Körper zerreiben; das Pulver, in welches sie dann sich auflösen, bekommt den Namen Strich; andere haben die Eigenschaft, in ihr lockeres Gefüge begierig Wasser zu saugen, darauf beruhet das Anhängen an der Zunge; noch andere haben eine so eigenthümliche Blätte, daß sie sich wie Fett anfühlen; und deshalb fettig genannt werden.

D. Von der Schwere.

§. 173. Die Kraft, mit welcher die Körper auf ihre Unterlage drücken, heißt ihre Schwere; sie ist am größten bei den Mineralien. Man bestimmt sie auf die Weise, daß man die Schwere eines Körpers als Einheit annimmt, und darnach die Schwere der übrigen berechnet. Das auf diese Weise gefundene Gewicht heißt das spezifische. Die allgemein angenommene Einheit ist das Wasser, dessen Gewicht man gleich 1,000 setzt; das schwerste Mineral ist das Platin, dessen Gewicht 21 mal so groß ist, wie das des Wassers. Die Methode, dieses Gewicht zu bestimmen, lehrt die Physik.

E. Von den Lichteigenschaften.

§. 174. Die Farben der Mineralien gehören theils dem Mineral an sich an, und haben in der ursprünglichen Mischung desselben ihren Grund, theils rühren sie von fremden Stoffen her, die nicht mit zum Wesen des Minerals gehören. Ersteres ist der Fall bei den metallischen Mineralien, letzteres bei den Erden und Steinen.

Die Farben an sich sind verschieden 1) nach dem Grade, und man unterscheidet in dieser Hinsicht: dunkel, wenn die Farbe ins Schwarze fällt; hoch, wenn die Farbe ganz rein ist; licht, wenn sie ins Weiße fällt, und blaß, wenn sie sehr schwach ist. 2) Nach der Beschaffenheit. In dieser Hinsicht unterscheidet man 8 Hauptfarben mit ihren verschie-

denen Abstufungen; sie sind: weiß, grau, schwarz, blau, grün, gelb, roth, braun; einige derselben sind reine, wie blau, gelb, roth, weiß und schwarz, andere gemischte, wie grau, grün und braun.

Die ursprünglichen Farben der Metalle sind, als unänderliche Kennzeichen, für dieselben charakteristisch; so weiß am Silber, Platin und Zinn, grau am Blei und gediegenem Eisen, schwarz an Eisenerzen und Manganerzen; blau kommt bei Metallen nicht vor; gelb am Gold und Messing, roth am reinen Kupfer, braun bei vielen Eisenerzen.

Die zufälligen Farben der Erden und Steine sind größtentheils durch beigemischte metallische Stoffe entstanden; rein sind alle Erden und Steine eigentlich weiß, oder krystallisirt wasserklar. So entsteht durch Eisenoryd gelb, roth, braun oder schwarz; durch Manganoryd schwarz, grau, roth oder blau; durch Kupferoryd blau und grün; durch Kobaltoryd roth; durch Chromoryde grün, gelb und roth; durch Schwefel gelb und roth; durch Kohle schwarz und braun. Hiernach ist es erklärlich, wie bei einem Mineral so verschiedene Farben vorkommen können, wie z. B. beim Quarz.

Viele Mineralien der letzteren Gruppe zeigen bei verschiedener Ansicht verschiedene Farben, welche Verschiedenheiten in der Brechung oder Zurückwerfung des Lichtes ihren Grund haben. Entstehen diese Farben bei der verschiedenen Betrachtung der Außenfläche in der Richtung des zurückgeworfenen Lichtes, so bezeichnet man die Veränderlichkeit mit dem Namen des Farbenspieles, wenn viele Farben zugleich, oder der Farbenwandlung, wenn einzelne aber verschiedene Farben nach einander erscheinen. Entstehen dagegen die verschiedenen Farben beim durchgehenden Lichtstrahl, so giebt dies nach der Anzahl derselben den Dichroismus, wenn 2, oder den Trichroismus, wenn 3 Farben sichtbar werden. Noch andere Mineralien, die wenig oder gar kein Licht durchlassen, spielen in Farben auf der Oberfläche; dies bezeichnet man als Opalisiren oder Irisiren; bei letzterem erscheinen alle Farben des Regenbogens, bei ersterem nur einige, besonders blau und gelb in verschiedenen Abstufungen.

Die eigenthümliche Stärke, mit welcher Mineralien das Licht von der Oberfläche zurückwerfen, bezeichnet man mit dem Namen des Glanzes; man unterscheidet folgende Grade: stark glänzend, wenn der Glanz in beträchtlicher Entfernung sichtbar ist; glänzend, wenn in einiger Entfernung sichtbar; weniger glänzend, nur ganz in der Nähe bemerkbar; schimmernd, wenn undeutlich glänzend; matt, wenn gar kein Glanz bemerkbar ist. — Als Arten des Glanzes unterscheidet man: Fettglanz, Glasglanz, Demantglanz, Perlmutterglanz, Seidenglanz, Wachsglanz, halbmatalischen Glanz und Metallglanz.

Die Grade der Durchsichtigkeit, oder des Vermögens der Mineralien, das Licht hindurch zu lassen, bezeichnet man durch 5 Abstufungen: 1) durchsichtig, wenn das Licht vollkommen und ungetrübt hindurch geht; 2) halbdurchsichtig, wenn die Gegenstände hinter dem Fossil getrübt erscheinen; 3) durchscheinend, wenn die Lichtstrahlen ganz schwach durchdringen; 4) an den Ranten durchscheinend; 5) undurchsichtig, wenn kein Licht hindurch bringt.

Alle Krystalle der drei letzten Systeme zeigen hinter sich die Gegenstände doppelt, doch mit geringerer Deutlichkeit, eine Eigenschaft, welche man die doppelte Strahlenbrechung nennt. Die prismatischen Krystalle haben zwei Achsen der doppelten Strahlenbrechung, d. h. zwei Richtungen, in welchen der betrachtete Gegenstand einfach erscheint; die pyramidalen und rhomboedrischen dagegen nur eine, welche mit der Richtung der Hauptachse zusammenfällt. Andere Mineralien saugen Licht ein und leuchten daher eine Zeit lang im Finstern, phosphoresciren.

F. Andere physikalische Kennzeichen.

§. 175. Außer den genannten, allen Mineralien zukommenden, Eigenschaften giebt es noch einige Kennzeichen, welche von untergeordneter Wichtigkeit sind, und meistens nur bei einigen Stoffen vorkommen. So nehmen alle Mineralien die Wärme auf, aber sie lassen dieselbe nicht im gleichen Grade

wieder fahren, leiten die Wärme also verschieden. Viele Mineralien können auch Elektrizität entwickeln oder elektrisch werden, die meisten durch Reibung, einige durch den bloßen Druck, z. B. Kalkspath, wieder andere durch Erwärmen (thermoelektrische), z. B. Turmalin, Borazit u. a. Endlich giebt es noch einige Mineralien, an welchen wir die magnetische Kraft beobachten, und die deshalb magnetische heißen. Es sind besonders Eisenerze, welche diese Eigenschaft besitzen, namentlich der Magneteisenstein oder natürliche Magnet.

G. Chemische Kennzeichen.

§. 176. Die meisten Mineralien sind aus mehreren Grundstoffen zusammengesetzt, obwohl sie unseren Sinnen als einfache Körper erscheinen. Die Art dieser Zusammensetzung, so wie die Stoffe, aus welchen sie zusammengesetzt sind, lehrt die Chemie, daher wir die Kennzeichen, welche von der Zusammensetzung aus einfachen Grundstoffen hergeleitet werden, chemische nennen.

Die einfachen Grundstoffe der Mineralien sind: die Metalle, die Metalloide, der Schwefel, der Phosphor, das Chlor, das Fluor, das Boron, der Kohlenstoff, der Stickstoff, der Wasserstoff und der Sauerstoff. Von diesen Stoffen finden sich nur die Metalle, der Schwefel und der Kohlenstoff rein oder gediegen; alle übrigen gehen beständig mit einander, oder mit den drei schon genannten Stoffen, Verbindungen ein. So sind zuerst die Metalloide, welche rein ganz das Ansehen der Metalle haben, sich aber eben durch ihre große Neigung, mit dem Sauerstoff Verbindungen einzugehen, und durch ihr geringes spezifisches Gewicht, was beständig unter 5,0 bleibt, von den ächten Metallen unterscheiden, beständig mit Sauerstoff verbunden oder oxydirt. Die Metalloide, welche in der Verbindung mit Sauerstoff allein vorkommen, nennt man Erden; die anderen, welche außer dem Sauerstoff immer noch mit einem anderen Stoffe verbunden sind, heißen Alkalien. Alkalien sind: Kali, Natron, Lithium und Ammonium; ley-

teres besteht bloß aus Stickstoff und Wasserstoff, und kann nicht metallisch dargestellt werden. Erden giebt es 10, nemlich: Kiesel-, Thon-, Kalk-, Baryt-, Talk- (auch Magnesia oder Bittererde genannt), Beryll- oder Süß-, Zirkon-, Strontian-, Cer- und Ytter-Erde. Die Erden finden sich übrigens ebenfalls theils unter sich, theils mit anderen Stoffen verbunden. Diese anderen Stoffe sind vorzugsweise Säuren, d. h. Verbindungen von Sauerstoff oder Wasserstoff mit anderen meistens schon oxydirten Körpern, besonders Kohlenstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Alkalien und Metalloryden, d. h. Verbindungen von Metall und Sauerstoff. Aus der Verbindung der Säure mit irgend einem schon oxydirten Körper entstehen dann neue Körper, welche den Namen Salze führen, und die weder den Charakter der Säure, als des einen Bestandtheiles, noch den des anderen Bestandtheiles, oder der Basis, wie man ihn in solchen Verbindungen zu nennen pflegt, an sich tragen. Nach der Verschiedenheit der Basis unterscheidet man also: Alkali-Salze, wo die Basis ein Alkali ist; Erden-Salze, wo die Basis eine Erde ist, und Metall-Salze, wo die Basis ein Metalloryd ist. — Endlich verbinden sich die Stoffe noch gerne mit Schwefel, am liebsten die Metalle; daraus entstehen metallähnliche Körper, welche man Sulphurete oder Schwefelmetalle (Kiese Bienen, Glanze) zu nennen pflegt. Auch mit dem Sauerstoff verbindet sich der Schwefel zu Schwefelsäure, eine der am meisten verbreiteten Säuren in der Natur, nächst dem sind die Phosphorsäure (Phosphor mit Sauerstoff), die Kohlensäure (Kohlenstoff und Sauerstoff), die Salzsäure (Chlor und Wasserstoff), die Salpetersäure (Stickstoff und Sauerstoff), die Flußsäure (Fluor und Wasserstoff), und die Borsäure (Boron und Sauerstoff) die gewöhnlichsten. Metallische Säuren sind besonders: die Arseniksäure, die Spießglanzsäure oder Antimonsäure, die Molybdänsäure und die Chromsäure.

II. System der Mineralien.

§. 177. Man theilt die Mineralien gemeiniglich in vier Gruppen, welche folgendermaßen bestimmt werden.

1. Salinische Gesteine (Salze). Es sind Verbindungen von Säuren und Basen, letztere theils alkalischen, theils erdigen, theils metallischen Ursprungs.

2. Erdige Gesteine (Steine). Reine Erden ohne Säure, theils einfache, theils mehrere, in der Regel mit färbenden Metalloryden verbunden.

3. Metallische Gesteine (Metalle oder Erze). Metalle allein, oder in Verbindung mit Sauerstoff oder Schwefel.

4. Brenzliche Gesteine (Brenze). Schwefel und Kohlenstoff, theils rein, theils mit anderen Substanzen vermischt.

Erste Klasse.

Salinische Gesteine.

§. 178. Die meisten derselben sind durchsichtig, andere nicht; viele zeigen bunte Farben, andere sind farbenlos. Das spez. Gewicht wechselt von 1,2 — 7,5. Die Härte liegt zwischen 1 und 6. Alle sind gesäuerte Mineralien, welche vorzugsweise im krystallisirten Zustande auf Gängen und Lagern vorkommen, in einzelnen Fällen aber auch als derbe Gebirgs-
gesteine große Gebirgsmassen bilden, immer aber in den mehr jüngeren Schichten unseres Erdkörpers angetroffen werden.

Erste Ordnung. Eigentliche Salze.

§. 179. Lösen sich im Wasser auf und erregen Geschmack auf der Zunge. Härte 1—2. Gewicht 1,2—3,7. Meistens krystallisirt, oder können doch als Krystalle aus dem Wasser anschließen. Finden sich in den jüngsten Erdschichten, und entstehen zum Theil noch jetzt durch Zersetzung anderer Mineralien oder organischer Körper, auch durch Verdunstung des Quellwassers, das sie aufgelöst enthält.

A. Einige enthalten alkalische Basis, z. B.

Das Steinsalz, weiß, kryst., in Würfeln. S. 2. G. 2,3. Ist salzsaures Natron, findet sich lagerweis im Flößgebirge (Muschelkalk, buntem Sandstein und Rauhen), von Thon und Gyps begleitet, z. B. bei Biligka; auch im Meere und in Quellen aufgelöst.

Der Salpeter, weiß, wasserhell, krystallisirt in unregelmäßigen sechsseitigen Säulen. Ist salpetersaures Kali und findet sich in Höhlungen und Klüften des Kalksteines; der sogenannte Mauer-salpeter ist salpetersaurer Kalk.

Das Glaubersalz. Geschmack kühlend, dann bitter, zerfällt an der Luft. Krystalle prismatisch. S. 1. G. 1,5. Ist schwefelsaures Natron, löst sich schwach im kalten Wasser auf; findet sich neben Steinsalz und in Salzquellen.

B. Andere enthalten erdige Basis, z. B.

Der Alaun, Geschmack süßlich zusammenziehend, herbe; Krystalle Oktaeder. S. 2. G. 1,7. Farbe bläulich weiß. Ist schwefelsaure Thonerde mit schwefelsaurem Kali. Findet sich im Flößgebirge mit Thon als Alaunschiefer (z. B. bei Freienwalde).

C. Noch andere enthalten metallische Basis (Vitriole).

Eisenvitriol, Krystalle haarförmig, prismatisch, Farbe grün. S. 2. G. 1,8. Geschmack herbe zusammenziehend. Im Thonschiefer und Eisenthon, entsteht bei der Zersetzung von Schwefelkies.

Kupfervitriol. Krystalle tafelförmig; Farbe blau. S. 2. G. 2,2. Entsteht ebenso aus Kupferkies.

Zinkvitriol. Krystalle undeutlich, zerfallen an der Luft, Farbe weiß. S. 1. G. 2. Auf Gängen mit Zinkerzen.

Zweite Ordnung. Salz-Steine.

§. 180. Lösen sich gar nicht (nur der Gyps etwas) im Wasser auf, sind durchsichtig bis durchscheinend, seltener undurchsichtig, meistens weiß, bisweilen bunt; deutlich krystallisirt. Härte 1—6. Gewicht 2,5—4,5. Bestehen aus Erden (vorzugsweise Kalkerde) in Verbindung mit Säuren, zum Theil mit beigemengten färbenden Metalloryden; manche finden sich verb in großen Lagern als ganze Gebirgsformationen.

A. Kalkerde haltige.

Gyps. Farblos oder gefärbt, durchsichtig, mit Perlmuttersglanz. Krystalle prismatisch, tafelförmig oder säulenförmig, mit

deutlichem Blätterdurchgang. §. 2. G. 2. Ist gewässerte schwefelsaure Kalkerde. Findet sich als Gebirgsstein im jüngeren Flözgebirge und in vielen Abänderungen, strahlig faserig, dicht, erdig; dergleichen sind Gaser-gyps, Fraueneis und Alabaſter.

Kalkſpath; durchscheinend bis durchſichtig, weiß oder bunt. §. 3—4½. G. 2,5. Kryſtalliſirt rhomboedriſch in Säulen und Doppelpyramiden, ſpißen ſechſſeitigen oder ſtachen dreieitigen; beſonders derb in großen Maſſen als Gebirgsgeſtein. Ist kohlenſaure Kalkerde. Abänderungen viele: Kreide, Marmor, Erbsenstein, Kalkſtein, bituminöſer Mergelſchiefer, Mergel u. dgl.

Flußſpath; kryſtalliſirt in Würfeln; durchſichtig oder halbdurchſichtig, farblos oder blau, grün, roth. §. 4. G. 3,3. Findet ſich auch blättrig, dicht und erdig, beſonders auf Gängen. Ist flußſaure Kalkerde.

Apatit; kryſtalliſirt in gleichſeitigen ſechſſeitigen Säulen, oder derb; undurchſichtig bis durchſichtig; Farbe blau, roth, gelb, braun; §. 5,0; G. 3,0—3,3. Bruch muſchelig, Fettglanz. In alten Gebirgen eingeprengt und auf Lagern. Ist phosphorſaure Kalkerde. Phosphoreſcirt.

B. Strontian- und baryterdige.

Schwerſpath hat tafelförmige, prismaſiſche Kryſtalle. §. 3½. G. 4,5. Farbe weiß, graulich. Findet ſich ſtrahlig, körnig, ſtengelig abgeſondert und dicht. Ist ſchwefelſaure Baryterde. Volgneſer Leuchtſtein.

C. Thon-, kalk- und kieſelerdige.

Sind unwichtig und finden keine beſondere Anwendung; viele undurchſichtig und ſchön grün oder blau gefärbt. Hierher u. a. B. razit, Datolith, Türkis, Lazulith u. dgl. Die Farben meiſtens metalliſchen Urſprungs.

Dritte Ordnung. Salz-Metalle.

§. 181. Löſen ſich nicht im Waſſer auf, ſind undurchſichtig oder an den Kanten durchscheinend, und weiß oder buntgefärbt. Härte 1½—5. Gewicht 2—7,5. Alle ſind deutlich kryſtalliſirt, doch meiſt prismaſiſch. Sie beſtehen aus geſäuerten Metalloryden und finden ſich auf Gängen, ſeltener in Lagern des älteren Flözgebirges.

A. Bleihaltige. Farbe weiß, gelb, grün und roth. §. 2½—4. G. 6,0—7,5. Bruch muſchelig, Glas- bis Demantglanz, deut-

liche Krystalle, Prismen oder Tafeln. Finden sich auf Gängen in Gesellschaft von Bleierz, und bestehen aus Bleioryd mit verschiedenen Säuren; weiß kohlenfauer, hellgrün phosphorsauer, roth chromfauer, gelb molybdänsauer u. s. w.

B. Kupferhaltige. Farbe dunkelblau oder grün. $\text{H. } 3\frac{1}{2}$ — 5. $\text{G. } 3,6$ — $4,3$. Strich gefärbt, aber heller; Glanz matt; deutliche Krystalle, oder strahlig abgesondert in Knollen und Nieren. Auf Gängen im älteren Gebirge. — Lasur, dunkel indigoblau, Krystalle rhombische Prismen und Pyramiden. Ist gewässertes, kohlenfaures Kupfer. — Malachit, spangrün, faserig, in Nieren; ist stärker gewässertes kohlenfaures Kupfer.

C. Eisenhaltige. Spathisenstein. Weiß oder gelblich, braun werdend an der Luft. Krystalle Rhomboeder. $\text{H. } 4$. $\text{G. } 3,9$. Ist kohlenfaures Eisenoryd.

D. Zinkhaltige. Galmei. Weiß oder gelb, auch braun und grün. $\text{H. } 4,5$. $\text{G. } 3,6$ — $4,6$. Krystalle rhomboedrisch. Ist kohlenfaures Zinkoryd; schmilzt vor dem Löthrohr zu Email. Findet sich auf Lagern, besonders in Schlesien. Aus diesem Erz wird das meiste Zinkmetall gewonnen.

E. Hornzerze. Farbe grau. $\text{H. } 1$ — 2 . $\text{G. } 5,5$. Krystalle ziemlich deutlich, octaedrisch. Hierher das salzsaure Silber und salzsaure Quecksilber; beide selten.

Zweite Klasse.

Er dig e G e st e i n e.

§. 182. Sie haben viele äußere Kennzeichen der vorigen, alle Härtegrade (1—10), aber verhältnißmäßig ein geringeres Gewicht (1,8—4,5); die meisten sind deutlich krystallisirt, wasserhell oder bunt gefärbt in allen Graden der Durchsichtigkeit, viele, besonders undurchsichtige, erscheinen derb als Gebirgssteine der ältesten Schichten unseres Erdkörpers. Chemisch bestehen alle aus Erden, theils rein, theils mit anderen oder Metalloxyden verbunden.

Erste Ordnung. Glimmer.

§. 183. Starker Glas- zum Theil Fettglanz, Durchsichtigkeit bei oft düsteren Farben, untergeordnete Krystallisation, aber deutliche Blätterdurchgänge, eine Härte von 1— $4\frac{1}{2}$ und

ein Gewicht von 1,8—4,3 zeichnen die Gruppe aus. In ihnen herrschen Talk- und Thonerde mit Metalloxyden vor.

Glimmer, Talk und Chlorit. Krystalle rhomboedrisch, Glas- bis halbm metallischer Glanz. ρ . 1—3. G . 2,3—3. Kommen meistens in tafelförmigen Krystallen mit stark entwickeltem Durchgange schon in den ältesten Gebirgen vor, sind in dünnen Lagen durchsichtig, in stärkeren nur durchscheinend, biegsam, oft elastisch. Farbe weiß, rauchbraun, grünlich, schwarz. Bestehen aus Kiesel-, Thon- und Talkerde mit etwas Eisenoxyd. Man kennt viele Formen. **B.** Krystallisirter Talk, wovon der blättrige Talk und der Talkschiefer Abänderungen sind, gemein biegsam, sehr fettig anzufühlen, durchscheinend; er enthält keine Thonerde. Der Glimmer oder Lepidolith dagegen enthält keine Talkerde, ist elastisch biegsam und findet sich nur selten krystallisirt in großen durchsichtigen Platten, Marienglas. **Chlorit**, gemein biegsam, undurchsichtig, fettig; Farbe grün; Perlmutterglanz; weicher als Glimmer. Als Gemengtheil und auf Gängen, seltener erdig oder schieferig (Chloritschiefer). — Abänderungen des Glimmers, die zum Theil als Gebirgsgesteine auftreten, sind: der Thonschiefer, Talkschiefer, Weichschiefer, Alaunschiefer und die schwarze Kreide.

Argillithe oder Thone. Es sind unkrystallinische Massen ohne Spur von Struktur; Bruch erdig und dicht, geringste Härtegrade. G . 0,6—2,8. Undurchsichtig, in allen Farben; theils mager, theils fettig anzufühlen. Bestehen ebenfalls aus Kiesel-, Thon- und Talkerde. Hierher eine Menge Fossilien. **B.** der Aluminat oder die reine Thonerde, die Porzellanerde, der Tripel, der Klebschiefer. — Der Feuerthon, die Wacke. — Der gemeine Thon, die Gelberde, der Bolus, die Bergseife, Talkerde, Grünerde, Meerschäum, der Speckstein oder die spanische Kreide u. a. m.

Zweite Ordnung. Spathe.

\S . 184. Dichte, undurchsichtige Gesteine von Fett-, Glas- oder Perlmutterglanz. Bunte, doch meist dunkle Farben. ρ . $3\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$. G . 2,0—3,7. Krystallisation meistens deutlich und prismatisch. Bestehen aus Kiesel-, Talk- und Thonerde, bisweilen mit etwas Talk und meistens färbenden Metalloxyden.

Diallage oder Schillerspath, grün, braun oder schwarz, undurchsichtig; metallartiger Glanz. ρ . verschieden. G . 2—3,4. Kiesel-, Talk- und Talkerde.

Zeolith, Farbe meist weiß, undurchsichtig. ρ . $3\frac{1}{2}$ —6. G .

25. Schmelzen im starken Feuer; enthalten Kiesel- und Thonerde mit Talk, Kali, Natron und Wasser. Kommen nur in geringer Verbreitung auf Gängen, in Klüften und Höhlen vulkanischer Gebirge vor. Es giebt viele Formen, z. B. Chabasit, Ichthyophthalm oder Albin, Mesotyp, Stilbit, Blätterzeolith, Leuzit, Analzim u. a. m.

Feldspath. Helle, zum Theil schillernde Farben, meistens röthlich oder gräulich; prismatische Krystalle, häufig Zwillinge. $\text{H. } 5-6$. $\text{G. } 2,0-2,8$. Besteht aus Kiesel-, Thon- und Kalkerde mit Alkalien, und findet sich in großer Verbreitung, besonders in den älteren Schichten, z. B. im Granit, Gneus, Porphyren u. v. a. Es giebt viele Formen, die zur Gruppe des Feldspaths gehören, z. B. Adular, Ekapolith, Pyralith, Spodumen, Nephelin, Prehnit u. a. m.

Augite oder Hornblendgesteine. Schwarz oder dunkelgrün, undurchsichtig. $\text{H. } 4-7$. $\text{G. } 2,7-3,5$, schwacher Glanz. Kiesel-, Kalk-, Thon- und Talkerde. Als Gemengtheil älterer Gebirge, z. B. des Hornfelsens, Grünsteins, u. a., nicht als Gebirgsstein, immer eingesprengt in kleineren Partien. Abänderungen zahlreich, z. B. Amphibol oder Hornblende, schwarz. $\text{G. } 3,9$. Prismatische Krystalle. — Augit, grün oder schwarz, Krystalle vierseitige Prismen mit Pyramide. $\text{G. } 3,5$. — Pistazit oder Epidot, hellgrün, an den Kanten zum Theil durchscheinend, geringere H. ; beide schmelzen vorm Löthrohr. — Asbest, faserig, biegsam, weich, weißgrün bis ins Grüne. — Serpentin, derb, fast erdig, sehr weich, grün.

Dritte Ordnung. Edelsteine. Gemmen.

§. 185. Helle, durchsichtige, deutlich krystallisirte Gesteine; Krystalle meist Polyeder oder Prismen; größte Härte (7—10). Gewicht 2—4,7. Kiesel-, Thon-, Talk- und Kalkerde, mit vielen färbenden Metalloryden; meistens krystallisirt. Auf Gängen in älteren Gebirgen, oder als Geschiebe, bisweilen derb als große Gebirgsgesteine, doch kommen so nur Quarz und Topas vor.

Schörl. Schwarz oder bläulich, durchsichtig. $\text{H. } 7\frac{1}{2}$. $\text{G. } 2,5-3,5$. Sechseckige Prismen mit dreiseitiger Pyramide. Turmalin, farbig, krystallisirt. Wird beim Erwärmen elektrisch. — Peridot, blau mit dichroitischem Farbenwechsel, leichter als voriger, selten krystallisirt, meist als Geschiebe. — Chrysolith, Olivin, Peridot. Schön grün. Prismatische Krystalle. $\text{H. } 6\frac{1}{2}-7$. $\text{G. } 3,4$. In Basalt-Gebirgen.

Beryll. Schön hellgrün, bisweilen weingelb. $\text{H. } 7\frac{1}{2}-8$. $\text{G. } 3$. Kieselerde mit Beryll- und Thonerde. Sechseckige Prismen, meist

ohne Pyramiden-Flächen. — **Emmalas**, dunkler grün, Prismen vierseitig. $\S. 7\frac{1}{2}$. — **Emerald**, heller, oft schmutzig grün, sechsseitige Prismen. $\S. 8$. Besonders schön in Südamerika.

Topas. Hell weingelb oder bläulich; prismatische Krystalle. $\S. 8$. G. 3,5. Als Gebirgsgestein am Schneckenfels in Sachsen, sonst auf Gängen in Klüften, besonders schön in Brasilien.

Quarz. Wasserhell und in allen Farben, sechsseitige Prismen mit sechsseitigen Pyramiden. $\S. 7$. G. 2,5 — 2,7. Reine Kieselerde mit färbenden Metalloryden. Findet sich krystallisirt auf Gängen und Klüften, derb als Gebirgsgestein, häufig als Geschiebe in nierenförmigen Stücken. Abänderungen sind: a) krystallisirte: wasserhell Bergkrystall, hellblau Amethyst, lauchgrün Prasem. b) Als Geschiebe in Knollen: grau Feuerstein, roth Carneol, grün Chrysopras, in wechselnden, grau, braun und weißen Streifen Onyx; halb durchsichtig, bunt Jaspis; schillernd gelb, grün und blau, halb durchsichtig Opal u. dgl. m.

Granate. Glas- oder Fettglanz, durchsichtig bis undurchsichtig, deutliche Krystallisation. $\S. 6-7\frac{1}{2}$. G. 3 — 4. Farben besonders Kaneel- oder blutroth. Kiesel-, Thon- und Kalkerde. Findet sich eingesprengt in älteren Gebirgen, auch in vulkanischen, besonders Basalt, und als Geschiebe. **Z. D. Staurolith**, braun, ungleichsechseckige Prismen, oft kreuzweis. — **Besuvian** oder **Idokras**, schmutzig grün oder braun, pyramidale Krystalle. — **Helvin**, schmutzig grün, Krystalle polyedrisch. — **Pyrop**, schön blutroth, als Geschiebe. — **Gemeiner Granat**, schmutzig kirschroth, große polyedrische Krystalle.

Zirkon, roth oder braun, durchsichtig, Krystalle vierseitige Doppelpyramiden. $\S. 7\frac{1}{2}$. G. 4,6. Besteht aus Zirkon- und Kieselerde. Als Geschiebe; der blutrothe heißt Hyacinth.

Korund, roth oder blau, durchsichtig, Krystalle deutlich, meist polyedrisch. $\S. 8-9$. G. 3,4 — 4,0. Kiesel-, Thon- und Kalkerde. — **Chrysoberyll**, gelblich grün, Krystalle vierseitige Prismen mit Pyramiden. $\S. 8\frac{1}{2}$. Süd-Amerika. — **Saphir**, eigentlich R., Schmirgel. Blau oder roth. Kryst. Rhomboeder. $\S. 9$. Blau Saphir, roth Rubin. — **Spinell**, weinroth, schwarz oder schmutzig grün. Kryst. Oktaeder. $\S. 9$. Ceylon.

Demant oder **Diamant**, roh graubraun bis wasserhell, geschliffen wasserhell mit lebhaftem Farbenspiel und Demantglanz. $\S. 10$. G. 3,5. Krystalle polyedrisch. Besteht aus reinem Kohlenstoff. Als Geschiebe in Brasilien und am Ural.

Dritte Klasse.

Metallische Gesteine.

§. 186. Der eigenthümliche Glanz, die lebhafteste Färbung verbunden mit Undurchsichtigkeit, geringerer Härte, aber bedeutender Schwere, unterscheiden diese Gruppe. Alle sind im Feuer schmelzbar, und lassen sich dadurch, selbst wenn sie mit anderen Stoffen verbunden sind, rein (gediegen) darstellen; doch kommen nur wenige, meistens die edlen Metalle, gediegen vor. Alle finden sich auf Gängen und Lagern in älteren Gebirgen, oder auch eingesprengt in jüngere Erdschichten. Man kennt gegenwärtig 29 verschiedene Metalle, die oxydirt, geschwefelt oder rein vorkommen.

Erste Ordnung. Metall-Oxyde.

§. 187. Sie haben meistens einen schwachen Metallglanz, bunt gefärbten Strich, die größte Härte (bis 7) und das geringste Gewicht (3,4—7,4). Alle bestehen aus Metall mit Sauerstoff verbunden.

Eisenoxyde finden sich in großer Ausbreitung in vielen Formationen der Erde; sie haben eine braune oder schwarze Farbe, eine ρ . von $5\frac{1}{2}$ — $6\frac{1}{2}$, G. 3,8—5,3, und einen bunten meist röthlichen Strich. Magneteisenstein, tief braunschwarz, krystallisirt in Oktaedern und derb; Eisenoxydul; stark magnetisch. — Rotheisenstein oder Eisenglanz, schmutzig blutroth mit grauem metallischem Glanz; Strich blutroth, rhomboedrisch krystallisirt, meist strahlich abgesondert in nierenförmigen Stücken; Eisenoxyd mit anderen Erzen. — Brauneisenstein, tief schwarzbraun mit metallischem Schimmer, Strich gelb, ebenso wie das vorige Erz abgesondert; Eisenoxyd mit Wasser. — Eisen findet sich gediegen nur in den Meteorsteinen.

Manganoxyde, schwarz oder braun, Strich eben so, zum Theil glanzlos, fast erdig; G. 4—4,8. ρ . $2\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$. — Schwarzer Braunstein, tief braunschwarz, Strich fuchseroth. ρ . $5\frac{1}{2}$. Manganoxyd mit Wasser. — Grauer Braunstein, schwarz, schwach metallisch glänzend, strahlich abgesondert. ρ . $2\frac{1}{2}$ —5. Manganoxyd. Schwarzeisenstein, Hartmangan, schwarz mit schwachem Metallglanz, ebenso abgesondert wie die Vorigen. Eisenoxyd mit Manganoxyd. Das Manganmetall, welches dem Eisen äh-

nelt, kommt, wegen seiner großen Verwandtschaft zum Sauerstoff, nicht gediegen vor.

Zinnstein, schwarz, Strich graulich, Krystalle quadratische Prismen mit Pyramidenflächen. $\text{Sp. } 6-7$. $\text{G. } 6,3-7$. Reines Zinnoryd. Das Zinnmetall, dessen Eigenschaften bekannt sind, kommt in der Natur am meisten in diesem oxydirten Zustande vor.

Zweite Ordnung. Metallkönige.

$\text{§. } 188$. Sie haben deutlichen Metallglanz und lichte metallische Farben. Krystalle nicht sehr deutlich, meistens unregelmäßige, drathförmige, hakige Gestalten. $\text{Sp. bis } 5$. $\text{G. } 5,7-21$. Finden sich nur auf Gängen, die edelsten auch als Geschiebe und im Flußsande.

Spießglanz, Antimon; undeutliche rhomboedrische Krystalle, Farbe zwischen Zinn und Blei. $\text{Sp. } 3\frac{1}{2}$. $\text{G. } 6,8$. Auf Gängen in Frankreich, aber selten; ist flüchtig im Feuer; wird zur Composition des Letternmetalls verwendet; findet sich auch geschwefelt.

Wismuth, undeutliche, tetraedrische Krystalle, Farbe zinnweiß, etwas röthlich. $\text{Sp. } 2\frac{1}{2}$. $\text{G. } 8-9$. Benützung zu Compositionen und in der Medicin.

Kupfer, selten krystallisirt in Würfeln, meist in eckigen, hakigen, plattenartigen Massen; Farbe hell braunroth; $\text{Sp. } 2\frac{1}{2}-3$. $\text{G. } 8,4-8,9$; findet sich nicht häufig gediegen, meistens geschwefelt.

Quecksilber, flüssig in Tropfen in den Höhlungen des Gesteins, gefriert bei -31° Reaum., silberweiß; $\text{G. } 15,0$; flüchtig im Feuer; findet sich nur an wenigen Stellen, z. B. bei Idria und in Peru; wird zur Spiegelbereitung und zum Vergolden benützt.

Silber findet sich krystallisirt in Oktaedern oder in unregelmäßig geformten, gestrickten, haar- oder nadelförmigen, auch hakigen Massen auf Gängen in älteren Gebirgen; Farbe schmutzig grau, gereinigt weiß; $\text{Sp. } 2\frac{1}{2}-3$, $\text{G. } 10,0$ bis $10,5$.

Gold findet sich nur gediegen in Körnern, Dräthen oder kleinen Platten, seltener in oktaedrischen Krystallen auf Gängen, oder als Geschiebe im Flußsande. Farbe gelb. $\text{Sp. } 2\frac{1}{2}-3$, $\text{G. } 12,0-20$. Das Gold ist sehr zähe und läßt sich in äußerst dünne Blättchen schlagen, dann schimmert das Licht grün hindurch.

Platin, unregelmäßig geformt, in Körnern von grauer Farbe; rein weiß, zwischen Silber und Blei. $\text{Sp. } 4-4\frac{1}{2}$, $\text{G. } 16,0-21,0$. Ebenfalls hämmerbar und schweißbar, wie das Eisen. Südamerika und am Ural.

Dritte Ordnung. Schwefelmetalle.

§. 189. Auch in dieser Gruppe ist der Metallglanz und das metallische Ansehen sehr deutlich, oft stärker als in der vorigen. $\text{H. } 1 - 6\frac{1}{2}$, G. im Allgemeinen geringer, wechselt von 3,5 — 8,2. Alle bestehen aus Metall mit Schwefel in verschiedenen Graden gemengt. Die Meisten sind deutlich krystallisirt, Manche strahlig abgesondert in Kugeln und Knollen. Sie finden sich auf Gängen in älteren und eingesprengt in jüngeren Formationen. In der Metallurgie heißen diese Fossilien Kiese, Blenden und Glanze.

Schwefeleisen, Schwefelkies. Messinggelb, an der Luft braun anlaufend, frisch mit starkem Metallglanz. Krystalle polyedrisch, oder strahlig abgesondert in Kugeln und Knollen. $\text{H. } 3\frac{1}{2} - 6\frac{1}{2}$, $\text{G. } 4,4$ bis 5,4. Findet sich auf Gängen, Lagern und eingesprengt in verschiedenen Formationen, besonders jüngeren. Manche Erze zerlegen sich leicht an der Luft, und bilden dann Eisenvitriol. Ist Eisen mit Schwefel.

Schwefelkupfer. Krystallisation untergeordnet, meistens in derben Stücken. Farbe wechselnd zwischen schwarz, braun, gelb, roth; bisweilen irisirend. $\text{G. } 4,4 - 5,1$; $\text{H. } 3 - 4$. — **Buntkupfererz,** rothbraun, läuft an der Luft regenbogenfarben an. Ist Kupfer, Schwefel und Eisenoryd. — **Kupferkies,** krystallisirt in quadratischen Tetraedern, aber auch derb, besonders mit Bleiglanz. Farbe schön gelb, heller als Eisenkies. Ist Schwefelkupfer mit Schwefeleisen. — **Fahlerz,** krystallisirt in Polyedern, besonders Tetraeder; stahlgrau gefärbt mit unebenem Bruch. Ist Schwefelkupfer mit Eisen, Arsenik und Spießglanz.

Arsenikkies, prismatische Krystallisation, ziemlich deutlich; Farbe frisch silberweiß, an der Luft grau werdend. $\text{H. } 5 - 6$. $\text{G. } 5,7 - 7,4$. Besteht aus Schwefeleisen und Arsenik. — Das Arsenikmetall hat eine weißgraue Farbe, ein G. von 5,8, eine H. von 3,5, ist flüchtig, und riecht dabei wie Knoblauch; es findet sich in der Natur auch gediegen, aber meist entweder an Sauerstoff oder an Schwefel gebunden. Mit ersterem bildet es die sehr giftige weiße arsenige Säure; man gebraucht es zu Compositionen und in der Medicin.

Kobaltkies (Speißkobalt), Krystalle oktaedrisch, auch stalaktische Formen, Farbe zinnweiß, grau angelauten, Bruch uneben. $\text{H. } 5,5$. $\text{G. } 6,5$. Auf Gängen, besteht aus Kobalt, Arsenik und etwas Schwefeleisen. — Das Kobaltmetall findet sich meist mit Arsenik verbunden, hat eine bleigraue ins Röthliche gehende Farbe, einen

grobkörnigen Bruch, und eine Schwere von 8,7. — Liefert Smalte (Glas) und Zaffer (Dryd), erstere blau, letzterer gelb gefärbt.

Bleiglanz, Krystallfirt in polyedrischen Formen, Farbe bleigrau. \S . 2,5; \S . 7,4—7,6. Höchst gemein auf Gängen, besteht aus Schwefel und Blei, bisweilen mit etwas Silber. — Das Bleimetall findet sich in der Natur kaum rein, sondern vorzugsweise in diesem geschwefelten Zustande.

Spießglanz, prismatische Krystalle, meist strahlig abgesondert, Farbe dunkel bleigrau. \S . $1\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$; \S . 4,2—5,8. Ist Spießglanz mit Schwefel, und außerdem noch Silber, Gold und Tellur enthaltend. Das Spießglanzmetall findet sich ebenfalls rein, besonders aber geschwefelt und oxydirt; es ist zäher als Blei, aber leichter; man braucht es zu Compositionen.

Nothgültigerz, findet sich krystallfirt in sechsseitigen Prismen mit Pyramiden, oder strahlig abgesondert. Farbe dunkel bleigrau, gegen das Licht gehalten blutroth durchscheinend, Strich roth. \S . 5,8—6,5. Auf Gängen, besonders im Harz. Ist Schwefel und Silber.

Zinnober. Krystalle undeutlich, meist strahlig abgesondert, Farbe dunkelgrau mit schwachem Metallschimmer, Strich schön roth. \S . 7—8. Ist Schwefel und Quecksilber. Findet sich auf Gängen im Zweibrückschen und wird als Farbestoff benützt.

Vierte Klasse.

Brenzliche Gesteine. Brenze.

\S . 190. Fett- oder Glasglanz, undeutliche Krystallisation, düstere, gelbe, braune oder schwarze Farben, \S . 1—2 $\frac{1}{2}$, \S . 1,0—3,6, und die leichte Verbrennlichkeit im Feuer mit eigenthümlichem Geruch charakterisiren diese Gruppe. Einige sind elementar, wie der Schwefel, andere bestehen aus Kohlenstoff, Pflanzenresten und Erdöl oder Bitumen, dessen eigenthümlichen Geruch manche besitzen. Sie finden sich auf Gängen oder als Gebirgsformation in großen Lagern. Hierher nur wenige Mineralien.

Schwefel, Farbe gelb oder roth, starker Glasglanz. \S . 1—2 $\frac{1}{2}$, \S . 1,9—3,6. Brennt im Feuer mit blauer Flamme und riecht dabei. Findet sich auf Gängen prismatisch krystallfirt entweder rein, oder mit Arsenik verbunden als Pyment in der zweiten, und als Realgar oder Sandarack in der ersten Schwefelmischung.

Erdöl, Erdpech, Asphalt, hat eine braune Farbe, ist flüßig,

leichter als Wasser und riecht stark; quillt aus der Erde, besonders in Palästina am todtten Meer.

Kohlen, schwarz oder braun. Glasglanz oder erdig, nicht krystallisirt. Härte sehr verschieden, bis 2, Gew. 1,2—1,5. Bestehen aus Kohlenstoff, Erdpech und verbrannten Vegetabilien. — Die Steinkohle ist schwarz, glänzend, nie erdig, fest, und findet sich als große Lager mit Gyps und Thonschiefer wechselnd im älteren Flößgebirge. — Die Braunkohle ist braun, glanzlos, erdig, hat oft noch Holzstruktur, und findet sich mit Sand und Mergel abwechselnd im jüngeren Flößgebirge. Beide werden als Brennmaterial benutzt.



D r u c k f e h l e r .

- C. 14 Zeile 11 v. o. ließ hoxntgen st. haarigen.
 — 35 — 12 v. o. — ist st. in.
 — 43 — 14 v. o. und 10 v. u. ließ die st. der.
 — 96 — 17 v. o. ließ Inneren st. inneren.
 — 121 — 15 v. o. — einer st. eine.
 — 160 — 2 v. u. — Drdn. st. Fam.
 — 162 — 1 und 16 v. o. ließ Drdn. st. Fam.

